

ΓΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

# ΑΛΓΕΒΡΑ

Η ΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ

ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΣ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΑΤΗ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1906

Πᾶν ἀντίτυπον μὴ φέρον τὴν ἰδιόχειρον ὑπογραφήν μου θεωρεῖται  
ἐκ τυποκλοπίας προερχόμενον.

A handwritten signature in cursive script, likely reading "S. K. Lebedev", written in dark ink on aged, textured paper. The signature is underlined with a single horizontal stroke.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ τῆς στοιχειώδους ἀλγέβρας ἀναπτύσσεται καὶ θεμελιούται ἡ ἀλγεβρα κατὰ τρόπον ὅπως νέον, συμφώνως πρὸς τὴν σημερινὴν τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης κατάστασιν.

Ἀρχόμενος ἀπὸ τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἐκθέτω τὰς γενικὰς τῶν τεσσάρων πράξεων ιδιότητες καὶ δεικνύω, ὅτι πᾶσαι αὗται αἱ ιδιότητες εἶνε ἀναγκαῖα ἀκολουθήματα δύο μόνον ιδιοτήτων, τὰς ὁποίας διὰ τοῦτο καλῶ ἀρχικὰς ἢ πρωτεύουσας ιδιότητες. Ἐξαρτῶνται δὲ ἀπὸ τῶν δύο τούτων αἱ ἄλλαι κατὰ τρόπον τοιοῦτον, ὥστε καὶ πᾶσα ἄλλη πρᾶξις, εἴτε ἀριθμητικὴ εἴτε γεωμετρικὴ, ἂν ἔχη τὴν ἑτέραν τῶν ιδιοτήτων τούτων, ἔχει καὶ πάσας τὰς ἐξ αὐτῆς πηγαζούσας (τοιαῦται πρᾶξεις εἶνε, ἡ εὕρεσις τοῦ μεγίστου κοινοῦ διαιρέτου καὶ τοῦ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν, ἡ πρόσθεσις τῶν γραμμῶν, κτλ.).

Μετὰ δὲ ταῦτα δεικνύων τὴν ἀνάγκην τῆς προσαρτήσεως καὶ ἄλλων νέων ἀριθμῶν, θέτω ὡς ὄρον, ἢ ὡς ἀρχὴν, ὅτι καὶ οὗτοι, οἷα σδήποτε φύσεως καὶ ἂν εἶνε, πρέπει νὰ ἔχωσι τὰς αὐτὰς δύο ἀρχικὰς ιδιότητες, ὅτε θὰ ἔχωσι καὶ τὰς ἄλλας, τὰς ἐξ αὐτῶν ἐπομένους. Ἐκ δὲ τῆς διατηρήσεως τῶν ἀρχικῶν τούτων ιδιοτήτων εὐρίσκονται ἀμέσως ὡς ἀναγκαῖα ἀκολουθήματα οἱ ὅρισμοί τῶν πράξεων ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν τούτων.

Διὰ τοῦ τρόπου τούτου ὄχι μόνον βλέπει τις τὸ σύστημα τῶν ἀριθμῶν βαθμηδὸν ἀναπτυσσόμενον, ἀλλὰ καὶ ἐννοεῖ, πῶς τὰ διάφορα τῶν ἀριθμῶν εἶδη, κοινὴν ἔχοντα τὴν γένεσιν, συνδέονται πρὸς ἀλληλα ἀναποσπάτως καὶ συναποτελοῦσιν ἓν ὅλον τέλειον καὶ ἀρμονικόν· συνάμα δὲ λαμβάνει καὶ σαφῆ ἰδέαν τοῦ σκοποῦ, δι' ὃν γίνεται.

Οἱ πάσης αἰτιολογίας καὶ βάσεως στερούμενοι, ὅπως αὐθαίρετοι καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀσύνδετοι ὅρισμοί, δι' ὧν ὠρίζοντο μέχρι τοῦδε οἱ ἀριθμοὶ καὶ αἱ ἐπ' αὐτῶν πράξεις, δὲν εὐχαριστοῦσι τὸν μαθητὴν, ὅστις δικαίως ἀπορεῖ, διατὶ οὕτω καὶ οὐχὶ ἄλλως ὠρίζονται ἕκαστα. Διατὶ λόγου χάριν τὸ γινόμενον δύο ἀρνητικῶν ἀριθμῶν ὠρίζεται ὡς θετικόν; Ἐκ τοῦ ὅτι οἱ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ σημαίνουσι τι ἐναντίον τοῦ ὑπὸ τῶν θετικῶν

σημαινομένου (οἷα κέρδος καὶ ζημία, περιουσία καὶ χρέος, καὶ τὰ ὅμοια), εἶνε ἀδύνατον νὰ ὀρισθῆ καὶ εὐρεθῆ τὸ γινόμενον δύο ἀρνητικῶν ἀριθμῶν· διότι πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ εἴπωμεν, ὅτι ὅ δραχμαὶ ζημίας ἐπὶ 8 δραχμὰς ζημίας πολλαπλασιαζόμεναι δίδουσι 40 δραχμὰς κέρδους; Ὡστε ἡ αἰτία, διὰ τὴν ὁποίαν ὀρίζομεν τὸ γινόμενον τριουτοτρόπως, κεῖται βαθύτερον καὶ εἶνε ὅλως ἄσχετος πρὸς τὰς ἐφαρμογὰς τῶν ἀριθμῶν, αἵτινες θὰ ὑπῆρχον καὶ ἂν ἄλλως ὠρίζετο ὁ πολλαπλασιασμός. Ὅμοίως ἐκ μόνης τῆς σημασίας, ἢν ἔχουσι τὰ κλάσματα  $\frac{1}{5}$  καὶ  $\frac{2}{3}$ , εἶνε ἀδύνατον νὰ εὐρεθῆ τὸ γινόμενον αὐτῶν· εἶνε ἀνάγκη νὰ δώσωμεν νέον ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ἢ νὰ εὐρύνωμεν τὸν ἀρχικὸν αὐτοῦ ὄρισμὸν. Ἄλλ' ὁ ἀρχικός, ὁ φυσικὸς ὄρισμὸς τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶνε ἡ ἐπανάληψις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ πολλάκις (τῆς δὲ διαιρέσεως ὁ μερισμὸς εἰς ἴσα μέρη)· καὶ ὅμως δίδομεν ἐν τοῖς κλάσμασι τριουτόν ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ὥστε συγχέονται ὁ πολλαπλασιασμός καὶ ἡ διαίρεσις· διότι, ἵνα ἐπὶ παραδείγματος τοῦτο δεῖξωμεν, ὁ πολλαπλασιασμός τοῦ 12 ἐπὶ  $\frac{1}{4}$  οὐδὲν ἄλλο εἶνε ἢ αὐτόχρομα διαίρεσις τοῦ 12 διὰ

4. Τίς ἀνάγκη λοιπὸν ἀναγκάζει ἡμᾶς νὰ δίδωμεν τοὺς ὄρισμοὺς τούτους; <sup>(1)</sup>

Ἄλλὰ καὶ ἂν παραδεχθῶμεν τοὺς ὄρισμοὺς τούτους, πάλιν μένει ἡ ἀπορία, πῶς, ἀφοῦ οὐδὲν συνδέει τὰ διάφορα εἶδη τῶν ἀριθμῶν, ἀλλ' ἕκαστον συγκροτεῖται χωριστὰ καὶ αὐθαίρετως, πῶς καὶ ὑπὸ τίνος δυνάμεως πάντα ταῦτα συναρμολογούνται καὶ ἀποτελοῦσιν ἐν ὅλῳ, οὐτινος εἶνε φανερὰ ἡ ἁρμονία καὶ ἡ ἀπλότης; Ταῦτα πάντα ἐξηγοῦνται καὶ ἡ ἄλγεβρα θεμελιούται ἐπὶ ἀσφαλῶν καὶ ἀπλοσταίων βάσεων, ἐὰν παραδεχθῶμεν τὴν ἐπομένην

(1) Ὁ συνήθης ὄρισμὸς τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν κλασμάτων: ὅτι τὸ γινόμενον γίνεται ἐκ τοῦ πολλαπλασιαστέου ὅπως ὁ πολλαπλασιαστής γίνεται ἐκ τῆς μονάδος: ἔχει πλὴν τοῦ αὐθαίρετου καὶ τοῦτο τὸ ἐλάττωμα· ὅτι δὲν ἐξηγεῖ πῶς γίνεται ὁ πολλαπλασιαστής ἐκ τῆς μονάδος. Ἡ ἀρχικὴ καὶ φυσικὴ γένεσις τῶν ἀριθμῶν ἐκ τῆς μονάδος εἶνε ἡ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως (ἀριθμὸς εἶνε πλῆθος μονάδων)· ἀλλ' ἐν τῷ ὀρισμῷ τὸ γίνεσθαι ἔχει θεβαίως ἄλλην σημασίαν· διότι τὰ κλάσματα δὲν γίνονται ἐκ τῆς μονάδος 1 μόνον διὰ τῆς ἐπαναλήψεως, ἀλλ' ἀπαιτοῦσι καὶ τὴν διαίρεσιν αὐτῆς· ἀλλ' ἂν θεωρήσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς ὡς γινόμενους ἐκ τῆς μονάδος διὰ διαιρέσεως καὶ ἐπαναλήψεως, ὑπάρχουσι ἄπειροι τρόποι γενέσεως τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἐκ τῆς μονάδος, εὐρίσκονται δὲ καὶ πολλοί, καθ' οὓς ὁ ὄρισμὸς ἐφαρμοζόμενος ἄγει εἰς ἄτοπα ἐξαγόμενα. Ὅτι δὲ οἱ τὸν ὄρισμον τοῦτον καὶ ἐπὶ τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν ἐκτείνοντες καὶ ἐφαρμόζοντες εἰς μεγάλῃ-τερα περιπίπτουσιν ἄτοπα, ἐννοεῖται οἰκοθεν.

ἀρχήν. Ὅτι ἐπὶ πάντων τῶν ἀριθμῶν, τοὺς ὁποίους βαθμηδὸν ἐπινοοῦμεν καὶ προσαρτῶμεν εἰς τὸ σύστημα, πρέπει νὰ διατηρῶνται αἱ δύο ἀρχικαὶ ιδιότητες, τὰς ὁποίας οἱ ἀκέραιοι ἔχουσι, καὶ ἀφ' ὧν αἱ λοιπαὶ ἀπορρέουσι. Τὸ ὀρθὸν καὶ σκόπιμον καὶ χρήσιμον τῆς ἀρχῆς ταύτης ἐννοεῖ πᾶς τις εὐκόλως. Καθὼς, ὅταν οἰκοδόμημά τι πρόκειται νὰ ἐπεκταθῆ, πρέπει νὰ διατηρήσῃ τὰς κυριωτάτας αὐτοῦ γραμμὰς καὶ τὸν ῥυθμὸν, ἵνα μὴ ἀποβῆ ἀτακτὸν τι καὶ δύσμορφον, οὕτω καὶ τὸ σύστημα τῶν ἀριθμῶν πρέπει εὐρυνόμενον νὰ διατηρῆ τὰς κυριωτάτας τῶν ιδιοτήτων αὐτοῦ. Ἡ ἀρχὴ αὕτη τῆς διατηρήσεως τῶν πρωτευουσῶν ιδιοτήτων παντὸς ὅ,τι γενικεύεται ἢ ἐπεκτείνεται, ἐφαρμόζεται οὐ μόνον εἰς τὸ σύστημα τῶν ἀριθμῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλα τῆς μαθηματικῆς μέρη. Δι' αὐτῆς εὐρον καὶ τοὺς ὀρισμοὺς τῶν κλασματικῶν δυνάμεων, δι' αὐτῆς προσέτι ὤρισα καὶ τοὺς λογαριθμους τῶν μικροτέρων τῆς μονάδος ἀριθμῶν. Αὕτη δὲ εἶνε καὶ ἡ πρώτη αἰτία τῆς ἀρμονίας τῶν μαθηματικῶν θεωριῶν πρὸς ἀλλήλας καὶ τῆς ἀπλότητος καὶ τῆς γενικότητος αὐτῶν.

Ὅτι ὁ τρόπος οὗτος τῆς θεμελιώσεως τῆς ἀλγέβρας εἶνε ὁ μόνος ὀρθός, μαρτυροῦσι δύο τινά· πρῶτον μὲν, ὅτι αἱ δύο ἀρχικαὶ ιδιότητες, τὰς ὁποίας λαμβάνω, ὀρίζουσιν ἐντελῶς τὸ σύστημα τῶν ἀριθμῶν καὶ οὐδεμίαν ἐπιτρέπουσιν αὐξήσιν αὐτοῦ πέραν τῶν μιγᾶδων ἀριθμῶν· δεύτερον δὲ ὅτι, ἂν μεταβληθῶσι κατὰ τι αἱ ιδιότητες αὗται, δύναται καὶ ἄλλο σύστημα ἀριθμῶν, διάφορον τοῦ κοινοῦ, νὰ διαπλασθῆ· καὶ ἐν γένει ἀναλόγως τῶν ιδιοτήτων, τὰς ὁποίας θέλομεν νὰ διατηρήσωμεν ἐφ' ἀπάντων τῶν ἀριθμῶν, μορφοῦται καὶ τὸ ἀριθμητικὸν σύστημα (ιδεῖ Εἰσαγ. ἀνωτέρας ἀλγέβρας).

Ἀφοῦ ἐν τῇ εἰσαγωγῇ ἀνεπτύχθη τὸ σύστημα τῶν θετικῶν καὶ τῶν ἀρνητικῶν συμμετῶν ἀριθμῶν καὶ προητοιμάσθη, οὕτως εἶπεῖν, τὸ ἀναγκαιὸν ὕλικόν πρὸς διάπλασιν τῆς ἀλγέβρας, ἐκτίθενται ἔπειτα εἰς τὰ δύο πρῶτα βιβλία ὁ ἀλγεβρικός λογισμὸς καὶ ἡ θεωρία τῶν πρωτοβαθμίων ἐξισώσεων, διότι ταῦτα καὶ μετὰ τὴν προσάρτησιν ἄλλων ἀριθμῶν οὐδαμῶς μεταβάλλονται. Τοῦτο καὶ εὐκολύνει τὴν σπουδὴν τῆς ἀλγέβρας καὶ ὀρθὸν μοι φαίνεται· διότι ταῦτα διδάσκονται ὑπὸ πολλῶν εἰς τὴν β' γυμνασιακὴν τάξιν, ὅτε ὁ μαθητὴς οὐδεμίαν ἔχει εἰσέτι γνῶσιν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν.

Ἡ διὰ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν συμπλήρωσις τοῦ ἀριθμητικοῦ συστήματος γίνεται εἰς τὸ Γ' βιβλίον. Ἐν αὐτῷ δεικνύεται ἡ ἀνάγκη τῆς προσαρτήσεως καὶ ἄλλων ἀριθμῶν, ὀρίζονται οἱ

ἀσύμμετροι καὶ αἱ ἐπ' αὐτῶν πράξεις καὶ ἔπειτα διὰ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν ἀποδεικνύεται ἡ ὑπαρξίς τῶν ριζῶν, τίθεται δὲ καὶ ἡ βάσις τῶν ἐφαρμογῶν τῆς ἀλγέβρας εἰς τὴν γεωμετρίαν, δεικνυμένου, ὅτι πᾶσα εὐθεῖα γραμμὴ δύναται νὰ μετρηθῆ καὶ νὰ παρασταθῆ ὑπὸ ἀριθμοῦ. Μετὰ δὲ ταῦτα εὐρίσκονται οἱ ὀρισμοὶ τῶν δυνάμεων, ὧν οἱ ἐκθέται εἶνε οἰοιδήποτε σύμμετροι ἀριθμοί, καὶ οἱ νόμοι οἱ ἐπὶ πασῶν τῶν δυνάμεων ἰσχύοντες.

Τοὺς ἀσύμμετρος ἀριθμοὺς ὠρίσα ὡς ἀριθμοὺς συγκειμένους ἐξ ἀπείρων τῶ πληθὸς μονάδων (δεκαδικῶν ἢ μὴ) καὶ τοιούτων, ὥστε ὁσαυδήποτε ἐξ αὐτῶν καὶ ἂν προστεθῶσι νὰ μὴ ὑπερβαίνωσιν ἀκέραιόν τινα. Τινὲς ὀρίζουσιν αὐτοὺς ὡς ὄρια τῶν συμμέτρων, ἀλλὰ τοῦτο δὲν εἶνε ὀρθόν· διότι, ἵνα παραδεχθῶμεν, ὅτι μεταβλητὸς τις ἀριθμὸς ἔχει ὄριον, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ἤδη τὸν ἀριθμὸν, ὅστις εἶνε ὄριον καὶ πρὸς ὃν προσεγγίζει ὁ μεταβλητὸς· ἀλλὰ καὶ ἡ γεωμετρία, ἣν ὡς ἐπίκουρον προσλαμβάνουσιν, οὐδὲν ὠφελεῖ· διότι ἐν ταῖς γεωμετρικαῖς αὐτῶν ἀποδείξεσι προϋποτίθεται, ὅτι πᾶσα γραμμὴ μετρεῖται καὶ παρίσταται ὑπὸ ἀριθμοῦ, ὅπερ εἶνε ἀδύνατον νὰ ἀποδειχθῆ, ἂν μὴ πρότερον ὑποθεθῶσι γνωστοὶ οἱ ἀσύμμετροι ἀριθμοί.

Τοὺς ὄρους τῶν προβλημάτων διέκρινα εἰς δύο διάφορα εἶδη, ἅτινα ἐκάλεσα ἐπιτάγματα καὶ περιορισμούς. Εἰς δὲ τὴν ἀλγεβρικὴν τῶν προβλημάτων ἔκφρασιν μετὰ τῆς ἐξισώσεως, ἣτις ἐκφράζει τὰ ἐπιτάγματα, προσλαμβάνω καὶ τοὺς περιορισμούς· διότι δι' ἀμφοτέρων τούτων καὶ πιστῶς ἐκφράζεται καὶ ὀρθῶς λύεται τὸ πρόβλημα.

Τὰ λεγόμενα σύμβολα τοῦ ἀπροσδιορίστου ( $\frac{0}{0}$ ) καὶ τοῦ ἀπείρου ( $\frac{1}{0}$ ) παρέλειψα ὅλως. Διότι, ἀποδειχθέντος, ὅτι ἡ διὰ τοῦ 0 διαίρεσις εἶνε ἀδύνατος καὶ ἄγει εἰς ἄτοπα ἐξαγόμενα, οὐδεὶς λόγος δύναται νὰ γίνῃ περὶ τοιαύτης διαιρέσεως. Οὐδὲ ἐπιτρέπεται νὰ ὑποθεθῆ ὁ παρονομαστής κλασματικοῦ τύπου ἴσος τῷ 0· διότι ἡ ὑπόθεσις αὕτη ἀπεκλείσθη ἤδη κατὰ τὴν διαίρεσιν, ἐξ ἧς προέκυψεν ὁ τύπος. Διὰ τοῦτο αἱ μηδενίζουσαι τὸν παρονομαστὴν ὑποθέσεις πρέπει νὰ γίνωνται πρὸ τῆς διαιρέσεως. Ὄταν δὲ ἐν προβλήματι ὁ κλασματικὸς τύπος, ὁ τὴν τιμὴν τοῦ ἀγνώστου παρέχων, ἔχῃ κοινόν τινα παράγοντα ἔν τε τῷ ἀριθμητῇ καὶ τῷ παρονομαστῇ, ὁ παράγων οὗτος πρὸ τῆς διαιρέσεως, ἐξ ἧς ὁ κλασματικὸς τύπος προέκυψεν, ἦτο κοινὸς εἰς ἀμφοτέρω τὰ μέλη τῆς ἐξισώσεως τοῦ προβλήματος, καὶ πᾶσα ἐπὶ τῶν δεδομένων ὑπό-

θεσις μηδενίζουσα αὐτόν, ἂν μὴ ἀπεκλείσθῃ ἤδη ἐν τῇ εὐρέσει τῆς αὐτῆς ἐξισώσεως, καταστρέφει τὴν ἐξίσωσιν καὶ ἐπομένως καθιστᾷ τὴν τιμὴν τοῦ ἀγνώστου ἄοριστον. Ἡ δὲ τιμὴ τοῦ ἀγνώστου, ἢ μετὰ τὴν ἐξάλειψιν τοῦ κοινοῦ παράγοντος εὐρισκομένη, (ἦν πολλοὶ νομίζουσιν ὡς τὴν μόνην λύσιν), ἔχει τοῦτο τὸ προτέρημα, ὅτι πρὸς αὐτὴν πλησιάζουσιν αἱ λύσεις τοῦ προβλήματος, ὅταν τὰ διδόμενα αὐτοῦ πλησιάζωσι πρὸς τὴν κατάστασιν ἐκείνην, ἣτις μηδενίζει τὸν κοινὸν παράγοντα.

Τὴν θεωρίαν τῶν λογαριθμῶν ἐξέθηκα κατ' ἴδιον ὁλως τρόπον. Αἱ πρὸς αὐτοὺς ἄγουσαι ὁδοὶ μέχρι τοῦδε ἦσαν δύο. Καὶ ἡ μὲν πρώτη, ἢ διὰ τῶν προόδων (οἱ ἦς καὶ εὐρέθησαν τὸ πρῶτον οἱ λογάριθμοι) ἔχει τὸ ἐλάττωμα, ὅτι δι' αὐτῆς δὲν ὀρίζονται ἀκριβῶς πάντων τῶν ἀριθμῶν οἱ λογάριθμοι, ἀλλὰ μόνον τῶν ὀλίγων ἐκείνων, οἵτινες εἶνε ὄροι τῆς γεωμετρικῆς προόδου ὅσον δ' ὀλίγον καὶ ἂν διαφέρωσιν ἀπ' ἀλλήλων δύο ἐφεξῆς ὄροι αὐτῆς, ὑπάρχουσι πάντοτε μεταξὺ αὐτῶν ἄπειροι ἀριθμοί. Ἡ δὲ δευτέρα, ἢ διὰ τῶν ἐκθετῶν, εἶνε δύσβατος καὶ μακρά· διότι εἶνε ἀνάγκη πρῶτον νὰ ὀρισθῶσιν αἱ δυνάμεις, αἱ ἀσύμμετρον ἔχουσαι ἐκθέτην, ὅπερ ἀπαιτεῖ τὴν θεωρίαν τῶν ὀρίων καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν θεωρήματα· ἔπειτα πρέπει νὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν δυνάμεων τούτων μένουσιν ἀληθεῖς αἱ ἀρχικαὶ ιδιότητες τῶν δυνάμεων· μετὰ δὲ ταῦτα πρέπει νὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι ἡ ἐξίσωσις  $a^x = \beta$ , ἐξ ἣς ὀρίζονται οἱ λογάριθμοι, ἔχει λύσιν καὶ νὰ δειχθῇ, πῶς εὐρίσκεται ἢ πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ εὐρεθῇ ἡ λύσις αὕτη, ὅπερ ἀπαιτεῖ τὴν γνῶσιν τῶν συνεχῶν κλασμάτων καὶ τῶν ιδιοτήτων αὐτῶν. Ὅταν δὲ τὴν μακρὰν ταύτην ὁδὸν διανύσῃ ὁ μαθητῆς, τότε μόνον φθάνει εἰς τὸν ὄρισμὸν τῶν λογαριθμῶν. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἔννοια τοῦ ὀρίου καὶ τῆς ἐπ' ἄπειρον προσεγγίσεως ἔχει φύσει ἀσαφές τι καὶ σκοτεινόν, δύσκολον εἶνε κατὰ τὴν μακρὰν ταύτην ὁδὸν νὰ διατηρηθῇ, ἐν νεαρᾷ μάλιστα διανοίᾳ, ἢ διαύγεια τῶν ἐννοιῶν, ἣτις εἶνε ἡ πρώτη τῆς μαθηματικῆς ἀρετῆ· εὐκολώτατα δὲ ἀποκτῶσι πάντα ταῦτα χροιάν τινα ἀβεβαιότητος καὶ ἀσαφείας, ἣτις ἀντίκειται εἰς τὴν μαθηματικὴν ἀκρίβειαν.

Ἄλλ' ἡ θεωρία τῶν ἀσυμμέτρους ἐκθέτας ἔχουσῶν δυνάμεων, ὡς καὶ ἡ τῶν συνεχῶν κλασμάτων, καὶ δύσκολος εἶνε καὶ περιττὴ ὁλως διὰ τὴν στοιχειώδη μαθηματικὴν· συμπεριλαμβάνοντο δὲ μέχρι τοῦδε ἐν τοῖς στοιχείοις χάριν τῶν λογαριθμῶν.

Ταῦτα ἀναλογιζόμενος ἐζήτησα καὶ εὗρον ἄλλον ὄρισμὸν τῶν δεκαδικῶν λογαριθμῶν, ὅστις οὐδεμίαν τῶν θεωριῶν τούτων

προύποθέτει, ἀλλ' ἀπλῶς στηρίζεται ἐπὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ· κατὰ τὸν ὄρισμὸν τοῦτον ὁ λογάριθμος ἀκεραίου ἀριθμοῦ ἐκφράζει (πλὴν ἑνὸς) τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων αὐτοῦ καὶ τῶν δεκαδικῶν δυνάμεων αὐτοῦ. Ἡ θεμελιώδης ιδιότης τῶν λογαρίθμων εὐρίσκειται ἐκ τοῦ ὄρισμοῦ τούτου ἀπλούστατα καὶ στηρίζεται ἐπὶ τῆς στοιχειώδους ιδιότητος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, καθ' ἣν τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν ἔχει τόσα ψηφία, ὅσα ἔχουσιν ὁμοῦ οἱ παράγοντες ἢ ἓν ὀλιγώτερον. Ἡ δὲ εὔρεσις τῶν λογαρίθμων γίνεται κατὰ τὸν νέον ὄρισμὸν μόνον διὰ πολλαπλασιασμοῦ. Τοιοῦτοτρόπως ἀποβαίνει ἡ θεωρία τῶν δεκαδικῶν λογαρίθμων καὶ συντομωτέρα καὶ ἀπλουστέρα.

Τοὺς ἄλλους ὄρισμοὺς τῶν λογαρίθμων καὶ τὰ διάφορα λογαριθμικὰ συστήματα ἐξέθηκα διὰ βραχέων ἐν παραρτήματι· τοῦτο δὲ χάριν τῶν θελόντων νὰ σπουδάσωσι τὴν ἀνωτέραν μαθηματικὴν· διότι διὰ τοὺς ἄλλους φαίνονται μοι ταῦτα ὄλως περιττά.

Ἐντὶ τῶν συνεχῶν κλασμάτων παρέλαβον τοὺς συνδυασμοὺς καὶ τὰ περὶ αὐτούς· διότι καὶ χρησιμώτερα εἶνε ταῦτα καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως φαίνονται μοι μᾶλλον συντελοῦντα.

Τὰ διὰ μικρῶν στοιχείων τυπωθέντα, ὡς καὶ ἐκεῖνα, ὧν προετάχθη ἀστερίσκος, δύνανται νὰ παραλείπωνται, ἐὰν ὁ χρόνος δὲν συγχωρῇ τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν.

*Ἐν Ἀθήναις, τῇ 1 Ἰουνίου 1882.*

**I. N. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ**



Georges D. Papacostas.

έλεγε 1910.

*Γεωργίου Παπακώστα 1904*

## ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

#### ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

##### ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

##### Προκαταρκτικαί έννοιαι.

1. Έάν συγκρίνωμεν πλήθος έξ όμοίων πραγμάτων συγκείμενον (ή τών όποίων παραβλέπομεν τας διαφοράς) πρός έν τών πραγμάτων τούτων, σχηματίζομεν τήν έννοιαν του άριθμου.

Άριθμός άρα είναι έννοια, δι' ής έκφράζομεν τήν σχέση πολλών όμοίων πραγμάτων πρός έν τούτων, όταν θεωρώμεν αυτά μόνον ώς πρός τò πλήθος.

2. Το έν τών πραγμάτων, πρός ό συγκρίνεται τò πλήθος, λέγεται μονάς.

3. Οι άριθμοί αποτελούσι σειράν άπειρον άρχομένην άπό του ενός, έν ή έκαστος γίνεται έκ του προηγουμένου τη προσθήκη μιās μονάδος.

Διά τούτο ό άριθμός δύναται νά θεωρηθῆ ώς άθροισμα πολλών μονάδων, ήτοι ώς αποτελούμενος υπό τῆς μονάδος πολλακίς επαναλαμβανομένης.

4. Ίσοι λέγονται δύο άριθμοί, όταν έκάστη μονάς του ενός έχη αντίστοιχον μίαν του άλλου, και τανάπαλιν.

Άνισοι δέ, όταν μονάδες τινές του ενός δέν έχωσιν αντίστοίχους είς τόν άλλον τότε ό πρώτος λέγεται μείζων του δευτέρου, ή ότι έχει περισσότερας μονάδας ή ό δεύτερος.

5. Ἐκ τοῦ ὀρίσμοῦ τῆς ἰσότητος δύο ἀριθμῶν γίνεται φανερόν, ὅτι αὕτη ἔχει τὰς ἐπομένους ιδιότητες.

α') Οἱ τῶ αὐτῶ ἴσοι ἀριθμοὶ εἶναι καὶ ἀλλήλοις ἴσοι.

β') Ἐὰν εἰς ἑκάτερον τῶν ἴσων ἀριθμῶν προστεθῆ μία μονάς, οἱ προκύπτοντες ἀριθμοὶ εἶναι ἴσοι· καὶ γενικῶς, ἐὰν εἰς ἴσους προστεθῶσιν ἴσοι ἀριθμοί, οἱ προκύπτοντες εἶναι ἴσοι.

Τὰς ιδιότητας ταύτας ὀνομάζομεν ἀρχικὰς ιδιότητις τῆς ἰσότητος.

6. Τὸ σημεῖον, δι' οὗ παριστῶμεν τὴν ἰσότητα, εἶναι τόδε =· γράφεται δὲ μεταξὺ τῶν δύο ἴσων ἀριθμῶν.

7. Οἱ δύο ἀριθμοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων γράφεται τὸ σημεῖον =, λέγεται, ὅτι ἀποτελοῦσιν ἰσότητα, ἑκάτερος δὲ αὐτῶν λέγεται μέλος τῆς ἰσότητος.

8. Τὸ σημεῖον, δι' οὗ παριστῶμεν τὴν ἀνισότητα, εἶναι <· γράφεται δὲ ὁ μικρότερος ἀριθμὸς πρὸς τὴν κορυφὴν τῆς γωνίας·

$$\text{ὡς} \quad 8 < 9, \quad 12 > 7.$$

9. Πάντα τὰ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς ζητήματα ἀνάγονται εἰς τὰ τέσσαρα στοιχειώδη, πρόσθεσις, ἀφαίρεσις, πολλαπλασιασμὸν καὶ διαίρεσις.

10. Ὄταν σκεπτώμεθα ἐπὶ τινῶν ἀριθμῶν, τοὺς ὁποίους δὲν θέλομεν νὰ ὀρίσωμεν, ἢ οἱ ὅποιοι εἶναι ἀγνωστοί, παριστῶμεν αὐτοὺς διὰ τῶν γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου. Οὕτω τὰ γράμματα,

$$\alpha, \quad \beta, \quad \gamma, \quad \delta, \quad \text{κτλ.}$$

παριστῶσι τυχόντας ἀριθμούς.

### Πρόσθεσις.

11. Ἡ πρόσθεσις εἶναι πράξις, δι' ἧς δοθέντων δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν, εὐρίσκεται ἄλλος, ὅστις ἀποτελεῖται ἐκ πασῶν τῶν μονάδων, ἀς ἔχουσιν οἱ δοθέντες.

Ὁ ἀριθμὸς οὗτος λέγεται ἄθροισμα τῶν δοθέντων. Εὐρίσκεται δέ, ἂν εἰς τὸν πρῶτον προστεθῆ ὁ δεύτερος, εἰς τὸ εὔρεθὲν ἄθροισμα ὁ τρίτος, εἰς τὸ εὔρεθὲν νέον ἄθροισμα ὁ τέταρτος, καὶ οὕτω καθεξῆς.

12. Τὸ ἄθροισμα ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν εἶναι ἀριθμὸς ἐντελῶς ὀρισμένος· διότι εἶναι δεδομέναι αἱ ἀποτελοῦσαι αὐτὸ μονάδες. Ἐκ τούτου συνάγεται ἡ ἐπομένη θεμελιώδης ιδιότης τῆς πρόσθεσεως.

13. Καθ' οἰανδήποτε τάξιν καὶ ἂν ἐκτελεσθῆ ἡ πρόσθεσις πολλῶν ἀριθμῶν, πάντοτε εὐρίσκεται τὸ αὐτὸ ἄθροισμα.

Διὰ τοῦτο τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν, ὡς τῶν α καὶ β, παρίσταται

διὰ τοῦ  $\alpha + \beta$ , ἢ διὰ τοῦ  $\beta + \alpha$  (διὰ μὲν τοῦ  $\alpha + \beta$  δηλοῦμεν, ὅτι εἰς τὸν  $\alpha$  πρέπει νὰ προστεθῇ ὁ  $\beta$ , διὰ δὲ τοῦ  $\beta + \alpha$  δηλοῦμεν τὸναντίον, ὅτι εἰς τὸν  $\beta$  πρέπει νὰ προστεθῇ ὁ  $\alpha$ )· καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  παρίσταται ἀδιαφόρως διὰ τῶν

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta, \quad \eta \quad \alpha + \gamma + \delta + \beta, \quad \eta \quad \delta + \beta + \alpha + \gamma, \quad \text{κτλ.}$$

ἐνθα ἡ τάξις τῶν ἀριθμῶν δηλοῖ καὶ τὴν σειρὰν τῶν πράξεων.

Τὸ ἄθροισμα ἐγκλείεται συνήθως εἰς παρένθεσιν, ὅταν ἐπ' αὐτοῦ πρόκειται νὰ γίνῃ καὶ ἄλλη πράξις ὡς

$$(\alpha + \beta) + \gamma, \quad (\alpha + \beta + \gamma) + \delta, \quad \text{κτλ.}$$

14. Ἐκ τῆς εἰρημένης θεμελιώδους ιδιότητος τῆς προσθέσεως πηγάζουσιν ἀμέσως αἱ ἐπόμενοι.

15. Ἐν παντὶ ἄθροισματι δύναται νὰ ἀντικατασταθῶσι δύο ἢ περιορισότεροι προσθετέοι ὑπὸ τοῦ εὐρεθέντος ἄθροίσματος αὐτῶν.

Ἔστω ὡς παράδειγμα τὸ ἄθροισμα

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon.$$

Λέγω, ὅτι οἱ προσθετέοι  $\beta$  καὶ  $\delta$  δύναται νὰ ἀντικατασταθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἄθροίσματος αὐτῶν  $(\beta + \delta)$ .

Διότι τὸ αὐτὸ ἄθροισμα εὐρίσκομεν, καὶ ἂν προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς ὡς ἐξῆς

$$\beta + \delta + \alpha + \gamma + \epsilon.$$

ἐὰν δέ, ἐκτελοῦντες τὰς σεσημειωμέναις πράξεις, περιορισθῶμεν εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν δύο πρώτων ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν

$$(\beta + \delta) + \alpha + \gamma + \epsilon.$$

Ἡ αὐτὴ πρῶτασις δύναται καὶ ὡς ἐξῆς νὰ ἐκφρασθῇ.

16. Ἐν παντὶ ἄθροισματι δύναται οἷοςδήποτε τῶν προσθετέων νὰ ἀντικατασταθῇ ὑπὸ ἀριθμῶν ἐχόντων αὐτὸν ἄθροισμα.

Ἦτοι ὁ προσθετέος  $(\beta + \delta)$  δύναται νὰ ἀντικατασταθῇ ἐν τῷ ἄθροισματι  $(\beta + \delta) + \alpha + \gamma + \epsilon$  ὑπὸ τῶν  $\beta$  καὶ  $\delta$ .

17. Ἐἴτε εἰς ἄθροισμα προσιεθῇ ἀριθμὸς, εἴτε εἰς ἓνα τῶν προσθετέων τοῦ ἄθροίσματος, τὸ αὐτὸ προκύπτει ὀλίγον ἄθροισμα.

Διότι προσθέτοντες τὸν  $\epsilon$  εἰς τὸ ἄθροισμα  $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ , εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon$$

ἢτοι τὸ  $\alpha + \epsilon + \beta + \gamma + \delta$ , ἢ  $(\alpha + \epsilon) + \beta + \gamma + \delta$

ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι τὸ αὐτὸ προκύπτει ἄθροισμα, καὶ ἂν προσθέσωμεν τὸν  $\epsilon$  εἰς ἓνα τῶν προσθετέων, οἷον εἰς τὸν  $\alpha$

18. Ἐπιπέπλομα προστίθεται εἰς ἄπιπέπλομα, καὶ ἂν προστεθῶσι τὰ μέρη ἀμοιτέρων τῶν ἐπιπέπλομαίων.

Διότι ἔστωσαν τὰ δύο ἐπιπέπλομα

$$(α + β + γ) \quad \text{καὶ} \quad (δ + ε + ζ + η)$$

λέγω, ὅτι τὸ ἄπιπέπλομα αὐτῶν εἶναι τὸ

$$α + β + γ + δ + ε + ζ + η$$

καὶ ὄντως, ἀντικαθιστῶντες ἐν αὐτῷ τοὺς προσθετέους α, β, γ, ὑπὸ τοῦ ἐπιπέπλοματος αὐτῶν  $(α + β + γ)$ , εὐρίσκομεν

$$(α + β + γ) + δ + ε + ζ + η$$

ποιοῦντες δὲ τὸ αὐτὸ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους προσθετέους εὐρίσκομεν

$$(α + β + γ) + (δ + ε + ζ + η)$$

τούτῃστι τὸ ἄπιπέπλομα τῶν δύο δοθέντων ἐπιπέπλομαίων.

19. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ. Εἰς τὰς ἀποδείξεις τῶν προτάσεων τούτων (15, 16 17 καὶ 18) καὶ ὁ ὀρισμὸς τῆς προσθέσεως καὶ ὁ τρόπος, καθ' ὃν ἐκτελεῖται ἡ πρόσθεσις, εἶναι ἀδιάφορα· ἀρκεῖ μόνον τὸ ὅτι ὑπάρχει πλήρης ἀδιαφορία πρὸς τὴν τάξιν, καθ' ἣν λαμβάνονται ἀλλεπαλλήλως οἱ ἀριθμοὶ ἐν τῇ πράξει· ὥστε καὶ πᾶσα ἄλλη πράξις τὴν αὐτὴν ἀδιαφορίαν ἔχουσα πρὸς τὴν τάξιν τῶν ἀριθμῶν. ἐφ' ὧν ἐκτελεῖται, ἔχει ἀναγκαιῶς καὶ τὰς ὑπὸ τῶν προτάσεων τούτων ἐκφραζομένης ιδιότητος.

### Ἀφαιρέσεις.

20. Ἡ ἀφαίρεσις εἶναι ἡ ἀντίστροφος τῆς προσθέσεως πράξις· ἐν αὐτῇ δίδονται δύο ἀριθμοί, α καὶ β, καὶ ζητεῖται τρίτος, ὅστις προστιθέμενος εἰς τὸν β, νὰ διδῇ ἄπιπέπλομα τὸν α, ἥτοι νὰ εἶναι  $α = β + γ$ .

Ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς λέγεται διαφορὰ τῶν δεδομένων· τούτων δὲ ὁ μὲν α λέγεται μειωτέος, ὁ δὲ β ἀφαιρετέος.

21. Ἡ διαφορὰ δύο ἀριθμῶν παρίσταται διὰ τοῦ σημείου — γραφομένου μεταξὺ τῶν δύο ἀριθμῶν καὶ πρὸ τοῦ ἀφαιρετέου, οὕτως: α - β ὥστε ἡ προηγουμένη ἰσότης γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς  $γ = α - β$ .

22. Ἐπειδὴ ἡ μεταξὺ μειωτέου καὶ ἀφαιρετέου καὶ διαφορᾶς σχέσις εἶναι σχέσις προσθέσεως, διότι  $α = β + γ$ , ἔπεται, ὅτι πᾶσαι αἱ γενικαὶ καὶ ἰδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως εὐρίσκονται ἐκ τῶν ἰδιοτήτων τῆς προσθέσεως καὶ ἐκ τῶν τῆς ἰσότητος.

Τούτων αἱ πρωτεύουσαι εἶναι αἱ ἐπόμεναι.

1) Ἐὰν προστεθῇ ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον, ἡ διαφορὰ μένει ἀμετάβλητος.

2) Ἀριθμὸς ἀφαιρεῖται ἀπὸ ἀθροίσματος, καὶ ἂν ἀφαιρεθῆ ἀπ' ἐνὸς τῶν προσθετέων.

3) Εἴτε τὸ ἀθροισμα πολλῶν ἀριθμῶν ἀφαιρέσωμεν διὰ μᾶς ἀπὸ ἄλλου, εἴτε αὐτοὺς τοὺς ἀριθμούς, τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλον, ἢ αὐτὴ προκύπτει διαφορά ἤτοι  $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$ .

Τὰς ἀποδείξει· τούτων ἀπλουστάτας οὐσας, παραλείπομεν.

### Πολλαπλασιασμός.

23. Πολλαπλασιασμός ἀριθμοῦ  $\alpha$  ἐπὶ ἕτερον  $\beta$  εἶναι ἡ πρόσθεσις τόσων ἀριθμῶν ἴσων τῷ  $\alpha$ , ὅσας μονάδας ἔχει ὁ  $\beta$ · ὁ ἐκ τῆς προσθέσεως ταύτης προκύπτων ἀριθμὸς λέγεται γινόμενον· οἱ δὲ δοθέντες, παράγοντες· καὶ ὁ μὲν  $\alpha$  λέγεται πολλαπλασιαστέος, ὁ δὲ  $\beta$  πολλαπλασιαστής.

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦτον, ὁ πολλαπλασιασμός τοῦ ἀριθμοῦ 6 ἐπὶ τὸν 4 σημαίνει τὴν εὐρεσιν τοῦ ἀθροίσματος  $6+6+6+6$  ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι τὸ γινόμενον σύγκειται ἐκ τοῦ πολλαπλασιαστέου, καθ' ὃν τρόπον σύγκειται ὁ πολλαπλασιαστής ἐκ τῆς μονάδος.

24. Τὸ γινόμενον τοῦ ἀριθμοῦ  $\alpha$  ἐπὶ τὸν  $\beta$  παρίσταται ὡς ἐξῆς·  
 $\alpha \times \beta$ , ἢ  $\alpha.\beta$ , ἢ καὶ ἀπλῶς  $\alpha\beta$   
 τὴν τελευταίαν ὁμως παράστασιν δὲν δυνάμεθα νὰ μεταχειρισθῶμεν, ὅταν ἀμφοτέροι οἱ παράγοντες εἶναι ἀριθμοί· οὕτω τὸ γινόμενον τοῦ 7 ἐπὶ τὸν 5 ἀνάγκη νὰ σημειῶται  $7 \times 5$ , ἢ 7.5, καὶ ὅχι διὰ τοῦ 75· διότι τότε συγχέεται τὸ γινόμενον μετὰ τοῦ ἀριθμοῦ 75.

25. Δεδομένων πολλῶν ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν τὸ γινόμενον αὐτῶν πολλαπλασιάζοντες τοὺς δύο πρώτους, ἔπειτα τὸ γινόμενον αὐτῶν ἐπὶ τὸν τρίτον, καὶ καθεξῆς, μέχρις οὗ ληφθῶσι πάντες οἱ ἀριθμοί.

26. Ἐν τῇ ἀριθμητικῇ ἀποδεικνύεται, ὅτι καὶ ἐν τῷ πολλαπλασιασμῷ ἡ τάξις, καθ' ἣν λαμβάνονται οἱ πολλαπλασιαστέοι ἀριθμοί, εἶναι ἀδιάφορος πρὸς τὸ ἐξεχόμενον· ἤτοι καθ' οἵανδήποτε τάξιν καὶ ἂν ἐκτελεσθῆ ὁ πολλαπλασιασμός δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν, πάντοτε εὐρίσκεται τὸ αὐτὸ γινόμενον.

Διὰ τοῦτο τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν, ὡς τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , παρίσταται διὰ τοῦ  $\alpha.\beta$  ἢ διὰ τοῦ  $\beta.\alpha$ · (διὰ τοῦ  $\alpha.\beta$ , ὅταν ὁ  $\alpha$  πρόκειται νὰ πολλαπλασιασθῆ ἐπὶ τὸν  $\beta$ , διὰ δὲ τοῦ  $\beta.\alpha$ , ὅταν ὁ  $\beta$  πρόκειται νὰ πολλαπλασιασθῆ ἐπὶ τὸν  $\alpha$ ).

Καὶ τὸ γινόμενον πολλῶν ἀριθμῶν, ὡς τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , παρίσταται ἀδιαφόρως ὡς ἐξῆς·  $\alpha.\beta.\gamma.\delta$ , ἢ  $\beta.\alpha.\gamma.\delta$ , ἢ  $\delta.\beta.\gamma.\alpha$ , κτλ.  
 ἐγκλείεται δὲ καὶ τὸ γινόμενον εἰς παρένθεσιν, ἐὰν πρόκειται νὰ γίνῃ ἐπ' αὐτοῦ καὶ ἄλλη πρᾶξις· ὡς  $(\alpha.\beta) + (\gamma.\delta)$ ,  $(3.5) + 7$ .

27. Ἐκ τῆς εἰρημένης θεμελιώδους ιδιότητος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ πηγάζουσιν ἀνεγκλίως αἱ ἐπόμενοι, αἵτινες εἶναι ὅλως ὅμοιοι πρὸς τὰς ἐν τῇ προσθέσει εὐρεθείσας.

28. Ἐν παντὶ γινομένῳ δύναται νὰ ἀντικατασταθῶσι δύο ἢ περισσότεροι παράγοντες ὑπὸ τοῦ εὐρεθέντος γινομένου αὐτῶν (ἐδ. 15).

Ἡ αὐτὴ δὲ πρότασις ἐκφράζεται καὶ ὡς ἐξῆς·

Ἐν παντὶ γινομένῳ δύναται ὁ τυχῶν παράγων νὰ ἀντικατασταθῇ ὑπ' ἀριθμῶν ἐχόντων αὐτὸν γινόμενον (παράβλ. ἐδ. 16).

29. Ἐἴτε γινόμενον πολλαπλασιάσῃ ἀριθμὸς εἴτε ἓνα παράγοντα τοῦ γινομένου, τὸ αὐτὸ προκύπτει ὀλικὸν γινόμενον (παράβλ. ἐδ. 17).

30. Γινόμενον ἐπὶ γινόμενον πολλαπλασιάζεται, καὶ ἂν πολλαπλασιασθῶσι πάντες οἱ παράγοντες ἀμφοτέρων τῶν γινομένων (παράβλ. ἐδ. 18). ἦτοι  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\delta \cdot \epsilon) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$ .

31. Αἱ προτάσεις αὗται ἀποδεικνύονται, ὡς ἀπεδείχθησαν καὶ αἱ πρὸς αὐτὰς ὅμοιοι ἐν τῇ προσθέσει ἐκ τῆς αὐτῆς θεμελιώδους ιδιότητος, ἀρκεῖ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ἐκείναις νὰ τραπῶσι τὰ ὀνόματα πρόσθεσις, ἄθροισμα κτλ. εἰς τὰ, πολλαπλασιασμός, γινόμενον κτλ.

Διὰ τοῦτο καὶ παρελείψαμεν τὰς ἀποδείξεις αὐτῶν.

32. Ἡ πρόσθεσις καὶ ὁ πολλαπλασιασμός συνδέονται διὰ τῆς ἐπομένης γενικῆς ιδιότητος.

Ἄθροισμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἀριθμὸν καὶ ἂν ἕκαστον τῶν μερῶν αὐτοῦ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν καὶ προστεθῶσι τὰ γινόμενα.

Τοῦτο ἐκφράζει ἡ ἰσότης  $(\alpha + \beta + \gamma) \delta = (\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta) + (\gamma \cdot \delta)$ . Λέγεται δὲ ἡ ιδιότης αὕτη ἐπιμεριστική.

Ἐνεκα τῆς πρώτης ιδιότητος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ δύναται ἡ ἐπιμεριστικὴ ιδιότης νὰ ἐκφρασθῇ καὶ ὡς ἔπεται·

Ἀριθμὸς πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἄθροισμα ὁσωνδήποτε ἄλλων, καὶ ἂν πολλαπλασιασθῇ ἐφ' ἕκαστον τῶν προσθετέων καὶ προστεθῶσι τὰ γινόμενα.

ἦτοι  $\delta \cdot (\alpha + \beta + \gamma) = (\delta \cdot \alpha) + (\delta \cdot \beta) + (\delta \cdot \gamma)$ .

33. Ἐκ τῆς ἐπιμεριστικῆς ιδιότητος ἔπεται ἀμέσως ἡ ἐξῆς·

Ἄθροισμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἄλλο ἄθροισμα, καὶ ἂν ἕκαστον τῶν μερῶν τοῦ πρώτου πολλαπλασιασθῇ ἐφ' ἕκαστον τῶν μερῶν τοῦ δευτέρου καὶ προστεθῶσι τὰ προκύπτοντα γινόμενα.

Ἐστω τὸ γινόμενον  $(\alpha + \beta + \gamma) \cdot (\delta + \epsilon)$ .

Θεωροῦντες τὸ ἄθροισμα  $(\delta + \epsilon)$  ὡς εὑρεθὲν καὶ ἐφαρμόζοντες τὴν ἐπιμεριστικὴν ιδιότητα, εὐρίσκομεν

$$(\alpha + \beta + \gamma) \cdot (\delta + \epsilon) = \alpha \cdot (\delta + \epsilon) + \beta \cdot (\delta + \epsilon) + \gamma \cdot (\delta + \epsilon)$$

καὶ ἐὰν εἰς ἐκάστην παρένθεσιν ἐφαρμόσωμεν καὶ πάλιν τὴν αὐτὴν ιδιότητα, εὐρίσκομεν

$$(\alpha + \beta + \gamma) \cdot (\delta + \epsilon) = (\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta) + (\gamma \cdot \delta) + (\alpha \cdot \epsilon) + (\beta \cdot \epsilon) + (\gamma \cdot \epsilon).$$

34. Τὰ διπλάσια τῶν ἴσων ἀριθμῶν εἶναι ἴσα, καὶ τὰ τριπλάσια ὡσαύτως· καὶ γενικῶς τὰ ἰσάκεις πολλαπλάσια τῶν ἴσων ἀριθμῶν εἶναι ἴσα.

Ἐστω  $\alpha = \beta$ . ἐὰν προστεθῶσιν εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ἴσους ἴσοι ἀριθμοί, οἱ  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , ἔπεται (ἐδ. 5, β')  $\alpha + \alpha = \beta + \beta$ , ἥτοι  $2\alpha = 2\beta$ .

Ἐὰν δὲ τοῦτο γίνῃ πολλάκις, προκύπτει ἡ πρότασις.

Φανερόν δέ, ὅτι τῶν ἀνίσων τὰ διπλάσια εἶναι ἄνισα, καὶ τὰ ἰσάκεις πολλαπλάσια ὡσαύτως.

### Διαιρέσεις.

35. Ἡ διαιρέσις εἶναι πρᾶξις ἀντίστροφος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ· ἐν αὐτῇ δίδονται δύο ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  καὶ ζητεῖται τρίτος, ὅστις πολλαπλασιάζων τὸν  $\beta$  νὰ δίδῃ γινόμενον τὸν  $\alpha$ , ἥτοι νὰ εἶναι  $\alpha = \beta \cdot \gamma$ .

Ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς λέγεται *πηλίκον* καὶ παρίσταται διὰ τοῦ σημείου  $\frac{\alpha}{\beta}$  (ὅπερ ἀπαγγέλλεται  $\alpha$  διὰ  $\beta$ )· ὥστε ἡ προηγουμένη ἰσότης γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς  $\gamma = \frac{\alpha}{\beta}$ .

Ὁ  $\alpha$  λέγεται *διααιρετέος*, ὁ δὲ  $\beta$  *διαιρέτης*.

36. Ἐπειδὴ ἡ μεταξὺ διααιρετέου καὶ διαιρέτου καὶ πηλίκου σχέσις εἶναι σχέσις πολλαπλασιασμοῦ, διότι  $\alpha = \beta \cdot \gamma$ , ἔπεται, ὅτι πᾶσαι αἱ ιδιότητες τῆς διαίρεσεως δύνανται νὰ εὑρεθῶσιν ἐκ τῶν ιδιοτήτων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καὶ ἐκ τῶν τῆς ἰσότητος· τῶν ιδιοτήτων τούτων πρωτεύουσαι εἶναι αἱ ἐξῆς·

37. Τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται (ὅταν ὑπάρχη), ἐὰν ἀμφοτέροι πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν (παράβλ. 22, 1).

Διότι, ἐὰν εἶναι  $\alpha = \beta \cdot \gamma$ , θὰ εἶναι (34) καὶ  $\alpha \cdot \eta = (\beta \cdot \gamma) \cdot \eta = \beta \cdot \gamma \cdot \eta$ ,  
ἢ (28)  $\alpha \cdot \eta = (\beta \cdot \eta) \cdot \gamma$ .

Ἔστω πηλίκον τῆς διαίρεσεως τοῦ  $\alpha \cdot \eta$  διὰ τοῦ  $\beta \cdot \eta$  εἶναι πάλιν ὁ  $\gamma$ .

38. Γινόμενον διαιεῖται δι' ἀριθμοῦ, καὶ ἐὰν διαιεθῆ εἰς τῶν παραγόντων αὐτοῦ (ἐὰν διαιρῆται) διὰ τοῦ ἀριθμοῦ (παράβλ. ἐδ. 22, 2):

Ἐστω τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$ , καὶ ἄς διαιρῆται ὁ παράγων  $\beta$  διὰ τοῦ ἀριθμοῦ  $\rho$ , ἄς δίδῃ δὲ πηλίκον  $\pi$ · τότε θὰ εἶναι  $\beta = \rho \cdot \pi$ .

λέγω, ὅτι τὸ πηλίκον τοῦ  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$  διὰ τοῦ  $\rho$  εἶναι  $\alpha \cdot \pi \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$  διότι τοῦτο πολλαπλασιασθὲν ἐπὶ τὸν  $\rho$  δίδει

$(\alpha \cdot \pi \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon) \cdot \rho$ , ἢ  $\alpha \cdot (\pi \cdot \rho) \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$ , ἢ  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$ , τουτέστι τὸν διαιρετέον.

Ἐκ τῆς προτάσεως ταύτης ἐπεταί ἀμέσως, ὅτι γινόμενον διαιρεῖται δι' ἐνὸς τῶν παραγόντων αὐτοῦ, ἐὰν ἐξαλειφθῇ ὁ παράγων οὗτος.

39. Εἴτε διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ τοῦ γινομένου πολλῶν ἄλλων, εἴτε ἀλλεπαλλήλως διὰ πάντων τῶν ἀριθμῶν τούτων (τοῦτ' ἔστι πρῶτον διὰ τοῦ πρώτου, εἶτα τὸ εὐρεθὲν πηλίκον διὰ τοῦ δευτέρου καὶ καθεξῆς), ἐν καὶ τὸ αὐτὸ πηλίκον εὐρίσκομεν (πρβλ. ἐδ. 22, 3).

Ἄς διακριῆται ἀριθμὸς τις  $\alpha$  διὰ τοῦ γινομένου  $(\beta \cdot \gamma \cdot \delta)$  καὶ  $\alpha$ ς δίδῃ πηλίκον  $\pi$ · τότε εἶναι  $\alpha = (\beta \cdot \gamma \cdot \delta) \pi$  ἢ καὶ  $\alpha = \beta \cdot (\gamma \cdot \delta \cdot \pi)$ · ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι ὁ  $\alpha$  διὰ τοῦ πρώτου παράγοντος  $\beta$  διαιρεθεὶς δίδει πηλίκον τὸ  $(\gamma \cdot \delta \cdot \pi)$ · ἀλλὰ καὶ τοῦτο, διὰ τοῦ δευτέρου παράγοντος  $\gamma$  διαιρεθὲν, δίδει πηλίκον τὸ  $(\delta \cdot \pi)$ · ἐὰν δὲ καὶ τοῦτο διαιρεθῇ διὰ τοῦ τελευταίου παράγοντος  $\delta$ , εὐρίσκεται πηλίκον τὸ  $\pi$ .

40. Ἄντι νὰ διαιρέσωμεν ἄθροισμα δι' ἀριθμοῦ, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν ἕκαστον τῶν προσθετέων διὰ τοῦ ἀριθμοῦ (ἐὰν διαιρῶνται) καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ πηλίκα.

Ἄς ὑποθέσωμεν, ὅτι τὰ πηλίκα τῶν ἀριθμῶν  $\alpha, \beta, \gamma$ , διαιρουμένων διὰ  $\delta$ , εἶναι τὰ  $\pi, \rho, \sigma$ , ἥτοι ἔστω  $\alpha = \delta \cdot \pi$ ,  $\beta = \delta \cdot \rho$ ,  $\gamma = \delta \cdot \sigma$ · λέγω, ὅτι τὸ πηλίκον τοῦ ἀθροίσματος  $\alpha + \beta + \gamma$  διαιρεθέντος διὰ τοῦ  $\delta$  θὰ εἶναι  $\pi + \rho + \sigma$ .

διότι τοῦτο πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην  $\delta$  δίδει  $(\pi + \rho + \sigma) \cdot \delta$ , ἥτοι (ἐδ. 32)  $\pi \cdot \delta + \rho \cdot \delta + \sigma \cdot \delta$ , τουτέστι τὸν διαιρετέον  $\alpha + \beta + \gamma$ .

### Συμπέρασμα.

Ἐκ τῶν προηγουμένων πάντων συνάγεται, ὅτι αἱ γενικαὶ ιδιότητες τῶν τεσσάρων πράξεων πηγάζουσιν ἅπασαι ἐκ δύο ἰδιοτήτων τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ· τοῦτ' ἔστι πρῶτον ἐκ τῆς κοινῆς αὐτῶν ιδιότητος, καθ' ἣν τὸ ἐξαγόμενον εἰς ὃ ἄγουσιν, ἐπὶ ὅσωνδῆποτε ἀριθμῶν ἐφαρμολζόμεναι, μένει τὸ αὐτό, καθ' οἷανδῆποτε τάξιν καὶ ἂν λαμβάνωνται ἀλλεπαλλήλως οἱ ἀριθμοί· καὶ δεύτερον ἐκ τῆς συνδεούσης τὰς πράξεις ταύτας ἐπιμεριστικῆς ιδιότητος.

Διὰ τοῦτο αἱ ιδιότητες αὗται λέγονται θεμελιώδεις ἢ ἀρχικαὶ ιδιότητες τῶν τεσσάρων πράξεων.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

### Περὶ τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν.

41. Οἱ ἀριθμοί, οἵτινες γίνονται ἐκ τῆς μονάδος 1 διὰ τῆς ἐπαναληψίως αὐτῆς, δὲν ἐξαρκοῦσιν εἰς τὴν λύσιν τῶν ἀριθμητικῶν ζητημάτων· διότι ἡ ἀφαίρεσις καὶ ἡ διαίρεσις δύο τοιούτων ἀριθμῶν δὲν εἶναι πάντοτε δυνατά· καὶ διὰ τοῦτο πλεῖστα προβλήματα, καίπερ ὄντα ἀπλούστατα, δὲν δύνανται νὰ λυθῶσι διὰ τῶν ἀριθμῶν τούτων. Ἐὰν π. χ. προταθῆ νὰ μοιρασθῶσι 3 πήχεις ὑφάσματος εἰς 8 ἀνθρώπους, ἂν καὶ γίνεται τοῦτο ἐν τοῖς πράγμασιν εὐκολώτατα, εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ παρασταθῆ δι' ἀριθμοῦ τὸ μερίδιον ἑκάστου. Διὰ τοῦτο ἦτο ἀνάγκη νὰ ἐπινοηθῶσι καὶ ἄλλοι ἀριθμοὶ καὶ νὰ προσαρτηθῶσιν εἰς τοὺς ἐξ ἀρχῆς σχηματισθέντας, ὥστε ν' ἀποτελεσθῆ γενικώτερον σύστημα ἀριθμῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ καὶ αἱ δύο εἰρημέναι πράξεις νὰ εἶναι πάντοτε δυνατά. Ἐν τῷ παρόντι κεφαλαίῳ θὰ ἐξετάσωμεν, ἂν εἶναι δυνατόν διὰ τῆς προσαρτήσεως νέων ἀριθμῶν, εἰς τοὺς ἀριθμοὺς 1, 2, 3, 4... νὰ γίνῃ σύστημα ἀριθμῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ νὰ εἶναι δυνατὴ πᾶσα διαίρεσις.

42. Ἐπειδὴ εἰς τὸ νέον σύστημα θὰ δύναται πᾶς ἀριθμὸς νὰ διαιρηθῆ εἰς ὅσαδήποτε ἴσα μέρη, ἔπεται, ὅτι θὰ ὑπάρχῃ εἰς ἀριθμὸς (ἓνα δὲ καὶ μόνον παραδεχόμεθα), ὅστις δις λαμβανόμενος νὰ δίδῃ τὴν μονάδα 1· ὁμοίως θὰ ὑπάρχῃ εἰς ἀριθμὸς, ὅστις τρις λαμβανόμενος νὰ δίδῃ τὴν μονάδα 1· καὶ καθ' ἑξῆς· καὶ γενικῶς, θὰ ὑπάρχῃ εἰς ἀριθμὸς (καὶ εἰς μόνος), ὅστις μ. φορές λαμβανόμενος ( $\mu=2,3,4,\dots$ ) νὰ δίδῃ τὴν μονάδα 1.

Τοὺς ἀριθμοὺς τούτους παριστῶμεν διὰ τῶν σημείων

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{\mu}, \dots$$

καὶ θεωροῦμεν ὡς νέας μονάδας· ὀνομάζομεν δ' αὐτάς κλασματικὰς τὴν δ' ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχουσαν, ἀκεραίαν ὥστε ἐν τῷ νέῳ συστήματι ἔχομεν τὰς μονάδας

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{\mu}, \dots$$

Αἱ κλασματικαὶ μονάδες διὰ τῆς ἐπαναλήψεως γίνονται ἀκεραία· καὶ ὄντως κατὰ τὸν ὀρισμὸν αὐτῶν εἶναι·

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1, \quad \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1, \text{ κτλ.}$$

### Ορισμοί.

43. Ἀριθμὸς λέγεται τὸ σύνολον πολλῶν μονάδων.

Ὅπως  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1$ ,  $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + 1 + 1$ ,  $\frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ , εἶναι ἀριθμοί.

Τὸ νέον σύστημα τῶν ἀριθμῶν λέγεται κλασματικὸν καὶ οἱ νέοι ἀριθμοὶ αὐτοῦ κλασματικοί, οἱ δὲ προϋπάρχοντες 1, 2, 3, 4 .. λέγονται ἀκέραιοι.

Καὶ οἱ ἀριθμοὶ ἔχουσι τὴν ιδιότητα τῶν μονάδων· τοῦτ' ἔστι πολ-  
λάκις λαμβανόμενοι γίνονται ἀκέραιοι.

Παραδείγματος χάριν, ὁ ἀριθμὸς  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$  γίνεταί ἀκέραιος, ἐὰν  
ληφθῆ 2·3 φορές, ἤτοι ἐξάκις, διότι πᾶσαι αἱ μονάδες, ἐξ ὧν σύγ-  
κεῖται, γίνονται ἀκέραιοι ἀριθμοί.

44. Δύο ἀριθμοὶ λέγονται ἴσοι, ἐὰν ἰσάκις λαμβανόμενοι γίνωνται  
ἀκέραιοι ἴσοι ἄνισοι δέ, ἐὰν γίνωνται ἀκέραιοι ἄνισοι καὶ μεγαλήτερος  
λέγεται ὁ τὸν μεγαλήτερον ἀκέραιον δίδων, μικρότερος δὲ ὁ τὸν μι-  
κρότερον.

Παραδείγματος χάριν, οἱ δύο ἀριθμοί·

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \text{ καὶ } \frac{1}{4} \text{ εἶναι ἴσοι,}$$

διότι τετράκις ληφθέντες γίνονται ἀμφοτέρω 1.

Ὁμοίως οἱ ἀριθμοὶ  $\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$  καὶ  $\frac{7}{10}$  εἶναι ἴσοι διότι δεκάκις λη-  
φθέντες γίνονται ἀμφοτέρω 7.

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦτον ἀνάγεται ἡ ἰσότης τῶν κλασματικῶν ἀριθ-  
μῶν εἰς ἰσότητα ἀκεραίων (ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἀνισότης), ὥστε αἱ θε-  
μελιώδεις ιδιότητες τῆς ἰσότητος (5) διατηροῦνται.

45. Διὰ τὰ διατηρηθῶσι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν αἱ  
ἀρχικαὶ ιδιότητες τῶν πράξεων, πρέπει νὰ ὀρίσωμεν αὐτὰς ὡς ἐξῆς.

46. Ἡ πρόσθεσις καὶ ἡ ἀφαιρέσις ὀρίζονται ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἀκεραίων·  
ὡσαύτως καὶ ὁ πολλαπλασιασμός, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστῆς εἴη ἀκέρ-  
αιος, ἤτοι  $\alpha$ . 3 σημαίνει  $\alpha + \alpha + \alpha$  οἰοσδήποτε ἀριθμὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ  $\alpha$ .

47. Διὰ τὰ εὖρωμεν, πῶς πρέπει νὰ ὀρίσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν  
οἰοσδήποτε ἀριθμοῦ ἐπὶ κλάσμα, ἵνα διατηρήσωμεν τὰς ἀρχικὰς ιδιό-  
τητας τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς.

Ἄς παραστήσωμεν τὸ γινόμενον τοῦ τυχόντος ἀριθμοῦ  $\alpha$  ἐπὶ μίαν  
κλασματικὴν μονάδα, ἔστω ἐπὶ  $\frac{1}{5}$ , ὡς συνήθως διὰ τοῦ  $\alpha \cdot \frac{1}{5}$ .

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ γινόμενον τοῦτο ἐπὶ 5 καὶ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν πρώτην ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, εὐρίσκομεν·

$$\left(\alpha \cdot \frac{1}{5}\right) \cdot 5 \quad \eta \quad \alpha \cdot \left(\frac{1}{5} \cdot 5\right), \quad \eta \text{τοι } \alpha \cdot 1, \quad \eta \text{τοι } \alpha.$$

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι τὸ  $\alpha \cdot \frac{1}{5}$  εἶναι τὸ πέμπτον μέρος τοῦ  $\alpha$ · διότι πεντάκις ληφθὲν ἔδωκε τὸν  $\alpha$ .

Ὁμοίως ἀποδεικνύεται ἐν γένει, ὅτι τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \frac{1}{\mu}$  εἶναι τὸ  $\mu$ ον μέρος τοῦ  $\alpha$ .

Ἐκ τούτου συμπεραίνομεν, ὅτι, διὰ νὰ διατηρήσωμεν τὰς ἀρχικὰς τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ιδιότητας καὶ εἰς τὸ νέον σύστημα, πρέπει νὰ ὀρίσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν τοῦ τυχόντος ἀριθμοῦ ἐπὶ τὴν κλασματικὴν μονάδα  $\frac{1}{\mu}$  ὡς μερισμὸν τοῦ ἀριθμοῦ εἰς  $\mu$  ἴσα μέρη.

48. Ὁ δὲ πολλαπλασιασμὸς ἐν γένει πρέπει νὰ ὀρισθῆ ὡς πράξις, δι' ἧς δοθέντων δύο ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , εὐρίσκεται τρίτος συγκείμενος ἐκ τοῦ  $\alpha$  καὶ ἐκ τῶν μερῶν αὐτοῦ, καθ' ὃν τρόπον σύγκειται ὁ  $\beta$  ἐκ τῆς μονάδος 1 καὶ ἐκ τῶν μερῶν αὐτῆς.

Διότι, ἂν ὁ  $\beta$  σύγκειται ἐκ τῶν μονάδων

$$1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5},$$

τὸ γινόμενον θὰ εἶναι  $\alpha \cdot \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)$ ,

ἥτοι κατὰ τὴν ἐπιμεριστικὴν ιδιότητα

$$\alpha \cdot 1 + \alpha \cdot 1 + \alpha \cdot \frac{1}{2} + \alpha \cdot \frac{1}{5} + \alpha \cdot \frac{1}{5},$$

τοῦτ' ἔστι (47)  $\alpha + \alpha + \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{5} + \frac{\alpha}{5}$ .

49. Ἡ διαίρεσις ὀρίζεται ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ (35)· ὥστε ὁ ὀρισμὸς αὐτῆς μένει ὁ αὐτός.

50. Ἐκ τῆς ἀριθμητικῆς εἰζεύρομεν, πῶς ἐκτελοῦνται αἱ πράξεις τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν. Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν μόνον, ὅτι διὰ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν ὁ πολλαπλασιασμὸς καὶ ἡ διαίρεσις ἀπέβηλον τὴν πρώτην αὐτῶν σημασίαν, καθ' ἣν ὁ μὲν πολλαπλασιασμὸς ἦτο ἐπανάληψις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ πολλάκις, ἡ δὲ διαίρεσις, μερισμὸς ἀριθμοῦ εἰς πολλὰ μέρη ἴσα· καὶ πᾶς πολλαπλασιασμὸς δύναται νὰ θεω-



ρηθῆ καὶ ὡς διαίρεσις, καὶ ἀντιστρόφως πᾶσα διαίρεσις δύναται νὰ θεωρηθῆ καὶ ὡς πολλαπλασιασμός.

Τῷ ὄντι ὁ πολλαπλασιασμός ἀριθμοῦ ἐπὶ τὸ  $\frac{1}{3}$  σημαίνει διαίρεσιν αὐτοῦ διὰ τοῦ 3, καὶ ἡ διαίρεσις ἀριθμοῦ διὰ τοῦ  $\frac{1}{5}$  σημαίνει πολλαπλασιασμόν αὐτοῦ ἐπὶ 5 καὶ γενικῶς ἡ διαίρεσις διὰ τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν ἀριθμῶν  $\frac{\alpha}{\beta}$  ἢ  $\frac{\beta}{\alpha}$  σημαίνει πολλαπλασιασμόν ἐπὶ τὸν ἕτερον.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ.** Τῆς εἰσαγωγῆς τῶν κλασμάτων εἰς τὴν ἀριθμητικὴν σκοπὸς εἶναι, ὡς εἴπομεν, νὰ καταστήσῃ τὴν λύσιν παντὸς προβλήματος, εἰς τὴν διαίρεσιν δύο ἀριθμῶν ἀναγομένου, δυνατὴν, τοῦλάχιστον ἀριθμητικῶς· διότι ὑπάρχουσι καὶ προβλήματα, καὶ ἀπλούστιστα μάλιστα, ἅτινα λύονται μὲν ἀριθμητικῶς, ὧν ὁμως ἡ διὰ τῶν κλασμάτων λύσις ἔνεκα τῆς ἰδιαίτερας φύσεως τοῦ ἀγνώστου ποσοῦ εἰναι ἀπκράδεκτος· τοιοῦτον εἶναι τὸ ἐπόμενον.

Ἐὰν δι' 8 πλοίων πρόκειται νὰ μεταφερθῶσι 1500 ἄνθρωποι καὶ νὰ διανεμηθῶσιν ἐξ ἴσου εἰς αὐτά, πόσους πρέπει νὰ ἔχη ἕκαστον τῶν πλοίων;

Ἡ ἀριθμητικὴ λύσις εἶναι  $\frac{1500}{8}$  ἢ  $187\frac{1}{2}$ , διότι οὗτος ὁ ἀριθμὸς, καὶ οὗτος μόνος, πολλαπλασιασθεὶς ἐπὶ 8 δίδει τὸν 1500, πρόδηλον ὁμως, ὅτι τοῦτο εἶναι φύσει ἀδύνατον νὰ πραγματωθῆ, καὶ ἐπομένως ἡ λύσις τοῦ τεθέντος προβλήματος εἶναι ἀδύνατος ἐν τοῖς πράγμασιν. Ἐπειδὴ ὁμως ἡ ἀριθμητικὴ, χάριν τῆς γενικότητος, ἐργάζεται ἐπὶ ἀφηρημένων ἀριθμῶν, ἄπειρα δ' ἄλλα προβλήματα, εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν ἀναγόμενα, ἐπιδέχονται πράγματι τὴν κλασματικὴν λύσιν  $187\frac{1}{2}$ , διὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχη ἡ ἀριθμητικὴ γενικὸν τι σύστημα ἀριθμῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ νὰ δύνανται νὰ λυθῶσι δι' ἀριθμῶν πάντα τὰ ζητήματα. Ἄν δὲ ἡ εὐρισκομένη λύσις, ἥτις εἶναι ἡ μόνη δυνατὴ, εἶναι τῷ ὄντι ἐφαρμοσίμος εἰς τὰ πράγματα ἢ μή, τοῦτο ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἰδιαίτερας φύσεως τῶν ποσῶν, ἅτινα εἰσέρχονται εἰς τὸ πρόβλημα· συνήθως ὁμως ἀμέσως ἐκ τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ προβλήματος ἐννοοῦμεν, ἂν ἡ τοιαύτη ἢ τοιαύτη λύσις τοῦ προβλήματος εἶναι παραδεκτὴ ἢ μή. Ἄν, παραδείγματος χάριν, ἐζητεῖτο νὰ μοιρασθῶσι 1500 δραχμαὶ εἰς 8 ἀνθρώπους, ἡ λύσις  $187\frac{1}{2}$  προφανῶς εἶναι παραδεκτὴ. Διὰ ταῦτα ἡ ἀριθμητικὴ, πρὸς ἀνωμαλίαν ταύτην τῶν καθ' ἕκαστα προβλημάτων, πλάσσει γενικὸν τι σύστημα ἀριθμῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ πᾶν ζήτημα εἶναι δυνατὸν νὰ λυθῆ, τοῦλάχιστον δι' ἀριθμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περὶ τοῦ 0 ὡς ἀριθμοῦ.

51. Ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως δύο ἴσων ἀριθμῶν προκύπτει, ὡς γνωστόν, νέος τις ἀριθμὸς, ὁ ἀριθμὸς 0.

52. Ὁ ἀριθμὸς οὗτος προστιθέμενος εἰς ἀριθμὸν, ἢ ἀφαιρούμενος ἀπὸ ἀριθμοῦ οὐδὲν βλάπτει αὐτόν, πολλαπλασιαζὼν ὅμως πάντα ἀριθμὸν ποιεῖ αὐτὸν 0, τοῦτ' ἔστιν εἶναι

$$\alpha + 0 = \alpha, \alpha - 0 = \alpha, \text{ καὶ } \alpha \cdot 0 = 0. \alpha = 0.$$

Καὶ τὸ πηλίκον τοῦ 0 διαιρεθέντος δι' οἰοῦδήποτε ἄλλου ἀριθμοῦ εἶναι 0, ἥτοι  $\frac{0}{\alpha} = 0$ .

Εἰς τὰ ἐξυγόμενα ταῦτα φθάνομεν ἐφαρμόζοντες καὶ ἐπὶ τοῦ 0 τοὺς γνωστοὺς ὀρισμοὺς τῶν πράξεων καὶ τὰς ιδιότητας αὐτῶν.

53. Διὰ τοῦ 0 οὐδεὶς ἀριθμὸς δύναται νὰ διαιρεθῆ, τοῦτ' ἔστιν ἡ διὰ τοῦ 0 διαίρεσις εἶναι ἀδύνατος· καὶ ὄντως οὐδεὶς ἀριθμὸς τοῦ κλασματικοῦ συστήματος δύναται νὰ εἶναι πηλίκον τῆς τοιούτης διαίρεσεως· διότι πάντες, ἐπὶ 0 πολλαπλασιαζόμενοι, δίδουσι γινόμενον 0.

54. Οὐδὲ εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῆ τὸ πηλίκον μιᾶς τοιούτης διαίρεσεως ὡς ἀριθμὸς καὶ νὰ εἰσαχθῆ εἰς τὸ ἤδη ὑπάρχον σύστημα τῶν ἀριθμῶν· διότι εἰσαγόμενον καταστρέφει τὰς ἀρχικὰς ιδιότητας τῆς ἰσότητος καὶ τῶν τεσσάρων πράξεων.

Ἐστω τῶν ὄντι  $\lambda$  νέος τις ἀριθμὸς, ὅστις ἐπὶ 0 πολλαπλασιαζόμενος νὰ μὴ μηδενίζηται, ἀλλὰ νὰ δίδῃ γινόμενον 1 (τότε ὁ  $\lambda$  εἶναι πηλίκον τῆς διαίρεσεως  $\frac{1}{0}$ )· παραδεχόμενοι τὸν ἀριθμὸν τοῦτον θὰ εἶχομεν

παραδείγματος χάριν  $0 \cdot 3 \cdot \lambda = 0 \cdot \lambda = 1,$

ἀλλὰ πάλιν  $0 \cdot 3 \cdot \lambda = 0 \cdot \lambda \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3.$

Ὁμοίως  $0 \cdot 0 \cdot 5 \cdot \lambda = 0 \cdot 5 \cdot \lambda = 0 \cdot \lambda = 1.$

ἀλλὰ καὶ  $0 \cdot 0 \cdot 5 \cdot \lambda = 0 \cdot 0 \cdot \lambda \cdot 5 = 0 \cdot \lambda \cdot 5 = 1 \cdot 5 = 5,$

ἢ καὶ  $0 \cdot 0 \cdot 5 \cdot \lambda = 0 \cdot \lambda \cdot 5 \cdot 0 = 1 \cdot 5 \cdot 0 = 5 \cdot 0 = 0.$

Ὁμοίως εἶναι  $\lambda(\alpha + 0) = \lambda\alpha,$  ἀλλὰ καὶ  $\lambda(\alpha + 0) = \lambda \cdot \alpha + \lambda \cdot 0 = \lambda \cdot \alpha + 1.$

Ὡστε ἡ παραδοχὴ τοῦ  $\frac{1}{0}$  ὡς ἀριθμοῦ (ἥτοι ἡ παραδοχὴ ἀριθμοῦ μὴ μηδενιζομένου, ὅταν ἐπὶ 0 πολλαπλασιασθῆ) ἀντιβαίνει πρὸς τὰς ἀρχικὰς ιδιότητας τῶν πράξεων καὶ τῆς ἰσότητος· τοῦτ' ἔστιν ἡ διὰ τοῦ 0 διαίρεσις εἶναι ἀδύνατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

**Σύστημα τῶν θετικῶν καὶ τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν.**

55. Διὰ τῆς παραδοχῆς τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν κατέστη ἡ διαίρεσις πράξις πάντοτε δυνατὴ καὶ ἐταυτίσθησαν ὁ πολλαπλασιασμός καὶ ἡ διαίρεσις. Ἐν τῷ παρόντι κεφαλαίῳ θὰ ζητήσωμεν, ἂν εἶναι δυνατὸν διὰ τῆς παραδοχῆς νέων τινῶν ἀριθμῶν καὶ τῆς προσαρτήσεως αὐτῶν εἰς τοὺς ἤδη εὐρεθέντας ν' ἀποτελεσθῇ σύστημά τι ἀριθμῶν γενικώτερον, ἐν τῷ ὁποίῳ καὶ ἡ ἀφαίρεσις νὰ ἐκτελεῖται πάντοτε, νὰ μὴ ἀλλοιωθῶσι δὲ τὸ παράπαν αἱ ἀρχικαὶ ιδιότητες τῶν τεσσάρων πράξεων καὶ τῆς ἰσότητος.

56. Ἐν τῷ τοιούτῳ συστήματι τῶν ἀριθμῶν (ἐὰν ὑποτεθῇ ὑπάρχον) πρέπει νὰ ὑπάρχη ἡ διαφορὰ  $0 - \alpha$ , τοῦ  $\alpha$  ὄντος οἰουδήποτε ἀριθμοῦ τοῦ κλασματικοῦ συστήματος· τοῦτ' ἔστι· πρέπει (20) νὰ ὑπάρχη τις ἀριθμός, ὅστις προστιθέμενος εἰς τὸν  $\alpha$  ν' ἀποτελῇ μετ' αὐτοῦ 0.

57. Ἐντεῦθεν βλέπομεν, ὅτι πρέπει δι' ἕκαστον ἀριθμὸν νὰ παραδεχθῶμεν ἓνα ἀντίθετον· ἦτοι τοιοῦτον, ὥστε οἱ δύο ὁμοῦ ν' ἀποτελῶσι 0. Οἱ ἀντίθετοι ἀριθμοὶ ἐξουδετεροῦσιν ἢ καταστρέφουσιν ἀλλήλους, ὥστε προστιθέμενοι ἀμφοτέροι εἰς ἀριθμὸν οὐδὲν ἄλλοιοῦσιν αὐτόν.

58. Ἡ παραδοχὴ τοιούτων ἀριθμῶν δικαιολογεῖται καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων· διότι ὑπάρχουσι πολλὰ ποσὰ ἀντίθεσιν ἐπιδεχόμενα, οἷον κέρδος καὶ ζημία, περιουσία καὶ χρέος, καὶ τὰ τοιαῦτα, (περὶ τῶν ὁποίων παρακατιόντες θὰ διαλάβωμεν)· εὐλογον δ' εἶναι νὰ παριστῶνται τὰ ἀντίθετα ποσὰ δι' ἀντιθέτων ἀριθμῶν.

Ἐὰν π. χ. ἔμπορός τις κερδήσῃ 1 δραχμὴν καὶ ἔπειτα χάσῃ 1 δραχμὴν, φανερόν εἶναι, ὅτι ἡ χρηματικὴ του κατάστασις δὲν ἠλλοιώθη ποσῶς· ἦτοι μία δραχμὴ κέρδους καὶ μία δραχμὴ ζημίας ἐξουδετεροῦσιν ἀλλήλας καὶ διὰ τοῦτο δύνανται νὰ παριστῶνται δι' ἀντιθέτων ἀριθμῶν.

59. Διὰ τοῦτο παραδεχόμεθα ἕκαστου τῶν ἀριθμῶν τοῦ κλασματικοῦ συστήματος ἓνα ἀντίθετον, ὃν τινὰ παριστῶμεν, πρὸς τὸ παρόν, διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου φέροντος τόνον. Οὕτω τῶν  $8, 3, \frac{1}{2}$ , οἱ ἀντίθετοι εἶναι  $8', 3', \frac{1'}{2}$ . Καλοῦμεν δὲ τοὺς νέους τούτους ἀριθμοὺς ἀρνητικούς, τοὺς δὲ προϋπάρχοντας θετικούς

60. Ὅπως οἱ θετικοὶ ἀριθμοὶ ἀποτελοῦνται ἐκ τῶν μονάδων  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ , οὕτω καὶ οἱ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ ἀποτελοῦνται ἐκ τῶν ἀντιθέτων μονάδων  $1', \frac{1'}{2}, \frac{1'}{3}, \dots$ , αἵτινες καλοῦνται ἀρνητικαὶ μονάδες.

Ὅστε πᾶς ἀριθμὸς εἶναι ἄθροισμα πολλῶν μονάδων τοῦ αὐτοῦ εἶδους.

### Πρόσθεσις.

61. Ἐὰν οἱ προσθετέοι ἀριθμοὶ εἶναι ὁμοειδεῖς, ἡ πρόσθεσις αὐτῶν δὲν διαφέρει τῆς προσθέσεως ἐν τῷ κλασματικῷ συστήματι.

$$\text{Οὕτως εἶναι } 5 + 6 = 11, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{7} = \frac{10}{21}, \quad \frac{3}{8} + \frac{4}{5} = \frac{47}{40}.$$

$$\text{'Ομοίως εἶναι } 5' + 6' = 11', \quad \frac{1'}{3} + \frac{1'}{7} = \frac{10'}{21}, \quad \frac{3'}{8} + \frac{4'}{5} = \frac{47'}{40}.$$

Ἐὰν δὲ εἶναι ἑτεροειδεῖς, ἡ πρόσθεσις αὐτῶν ἀνάγεται εἰς τὴν ἀφαίρεσιν ἐν τῷ κλασματικῷ συστήματι· δύο δὲ ἀντίθετοι μονάδες συναποτελοῦσιν (ὡς ἐκ τοῦ ὀρίσμου αὐτῶν ἔπεται) τὸ 0.

Διότι εἶναι  $3 + 5' = 3 + 3' + 2' = 2'$ .

$$\frac{3}{7} + \frac{4'}{5} = \frac{15}{35} + \frac{28'}{35} = \frac{15}{35} + \frac{15'}{35} + \frac{13'}{35} = \frac{13'}{35}.$$

\* Ἡ ἀρχικὴ ιδιότης τῆς προσθέσεως τῶν ἀκεραίων διατηρεῖται καὶ ἐν τῷ συστήματι τούτῳ. Διότι ἔστρωσαν τυχόντες προσθετέοι οἱ

$\frac{1}{2}, \frac{1'}{3}, \frac{5'}{8}, \frac{3}{4}$ · ἐὰν ἀντ' αὐτῶν λάβωμεν τοὺς ἴσους αὐτῶν (κατὰ

τὰ γνωστὰ ἐκ τῶν κλασμάτων)  $\frac{12}{24}, \frac{8'}{24}, \frac{15'}{24}, \frac{18}{24}$ , τὸ ἄθροισμα θὰ

ἀποτελεῖται, κατὰ τὸν ὀρίσμον τῆς προσθέσεως (11), ἐκ 30 θετικῶν μονάδων (εἰκοστῶν τετάρτων) καὶ ἐξ 23 ἀντιθέτων αὐταῖς. Ἄλλ' εἶναι φανερόν, ὅτι καθ' οἰκονόηποτε τάξιν καὶ ἂν γίνῃ ἡ πρόσθεσις, αἱ 23 ἀρνητικαὶ μονάδες θὰ ἐξουδετερώσωσιν 23 θετικάς καὶ θὰ μείνωσιν ὡς ἄθροισμα 7 θετικά· τὸ ἄθροισμα δηλαδή θὰ εἶναι  $\frac{7}{24}$ .

Ἐκ τούτου ἔπεται, ὅτι πρὸς εὔρεσιν τοῦ ἀθροίσματος πολλῶν ἀριθμῶν δύναται τις νὰ προσθέσῃ χωριστὰ τοὺς θετικούς καὶ χωριστὰ τοὺς ἀρνητικούς, μετὰ δὲ ταῦτα ν' ἀποτελέσῃ ἐκ τῶν δύο ἀθροισμάτων ἓνα μόνον ἀριθμόν, ἢ θετικόν ἢ ἀρνητικόν ἢ καὶ 0.

### Παραδείγματα.

$$5 + 8' + 2 + 9' = 7 + 17' = 10'. \\ \frac{1}{2} + \frac{2'}{5} + 1 + \frac{1'}{8} = \frac{3}{2} + \frac{21'}{40} = \frac{39}{40}.$$

$$1 + \frac{1}{2} + 2' + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 2 + 2' = 0.$$

ΣΗΜ. Ἐπειδὴ τὸ ἄθροισμα ὁσωνδήποτε μονάδων, εἴτε τοῦ αὐτοῦ εἴδους εἴτε καὶ μὴ, πάντοτε ἀνάγεται εἰς πλῆθος τι μονάδων τοῦ ἐνὸς εἴδους, ἢ καὶ εἰς τὸ 0, δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν τὸν ἀριθμὸν γενικώτερον ὡς ἄθροισμα μονάδων, ἀδιαφοροῦντες, ἂν αἱ μονάδες εἶναι τοῦ αὐτοῦ εἴδους ἢ οὐ.

### Ἀφαίρεσις.

62. Ἡ ἀφαίρεσις ἀνάγεται νῦν εἰς τὴν πρόσθεσιν· διότι ἔστω τυχῶν ἀριθμὸς, ὁ  $\alpha$ , καὶ ἀντίθετος αὐτοῦ ὁ  $\alpha'$ . τότε ἡ διαφορὰ  $\beta - \alpha$  ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα  $\beta + \alpha'$ . διότι, ἂν εἰς τοῦτο προστεθῇ ὁ ἀφαιρετέος  $\alpha$ , προκύπτει  $\beta + \alpha' + \alpha$ , ἥτοι ὁ μειωτέος  $\beta$ .

Ἡ ἀφαίρεσις ἄρα ἀριθμοῦ ἀπὸ ἄλλου σημαίνει πρόσθεσιν τοῦ ἀντιθέτου αὐτοῦ.

### Παραδείγματα.

$$\begin{aligned} 8 - 3 &= 8 + 3 = 11. \\ 7' - 13 &= 7' + 13' = 20' \\ 12 - 28 &= 12 + 28' = 16' \\ 15' - 7' &= 15' + 7 = 8' \\ 2' - 15' &= 2' + 15 = 13. \end{aligned}$$

### Πολλαπλασιασμός.

Ὁ πολλαπλασιασμὸς τοῦ τυχόντος ἀριθμοῦ ἐπὶ τοὺς θετικούς ἀριθμούς ὀρίζεται καὶ ἐν τῷ συστήματι τούτῳ, ὡς καὶ ἐν τῷ κλασματικῷ συστήματι· ἥτοι

$\alpha \cdot 3$  σημαίνει  $\alpha + \alpha + \alpha$ ,

$\alpha \cdot \frac{1}{5}$  σημαίνει τὸ πέμπτον μέρος τοῦ  $\alpha$ , ἥτοι τὸ  $\frac{\alpha}{5}$ ,

$\alpha \cdot \frac{2}{3}$  σημαίνει  $\frac{\alpha}{3} + \frac{\alpha}{3}$ , οἴοσδήποτε ἀριθμὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ  $\alpha$ .

63 Ὁ πολλαπλασιασμὸς ἀριθμοῦ οἴοσδήποτε ἐπὶ τὴν ἀρνητικὴν μονάδα  $1'$  πρέπει νὰ ὀρισθῇ ὡς τροπὴ τοῦ ἀριθμοῦ εἰς τὸν ἀντίθετον (ἵνα διατηρῶνται αἱ ἀρχικαὶ ιδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ).

Ἐστω  $\alpha$  τυχῶν ἀριθμὸς καὶ  $\alpha'$  ὁ ἀντίθετος αὐτοῦ· ἐπειδὴ τὸ ἄθροισμα  $1 + 1'$  ἰσοῦται τῷ 0, καὶ τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot (1 + 1')$  ἰσοῦται τῷ 0· ἀλλὰ τὸ αὐτὸ γινόμενον, κατὰ τὴν ἐπιμεριστικὴν ιδιότητα, ἰσοῦται τῷ ἀθροίσματι  $(\alpha \cdot 1) + (\alpha \cdot 1')$ , ἐπομένως οἱ δύο ἀριθμοὶ  $\alpha \cdot 1$  καὶ  $\alpha \cdot 1'$  εἶναι ἀντίθετοι· ἀλλ' ὁ πρῶτος εἶναι (46) ἴσος τῷ  $\alpha$ , ἀντίθετον δ' αὐτοῦ παρεδέχθημεν ἕνα μόνον· ὥστε ἀνάγκη νὰ εἶναι  $\alpha \cdot 1' = \alpha'$ .

Ἐκ τούτου ἔπονται τὰ ἐξῆς.

1<sup>ov</sup>) Τὸ γινόμενον τῆς ἀρνητικῆς μονάδος  $1'$  ἐφ' ἑαυτὴν ἰσοῦται τῇ θετικῇ μονάδι 1, ἥτοι  $1' \cdot 1' = 1$ .

2<sup>ov</sup>) Πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς εἶναι γινόμενον τῆς ἀρνητικῆς μονάδος  $1'$  ἐπὶ τὸν ἀντίθετον θετικὸν ἀριθμὸν.

Παραδείγματος χάριν, ὁ  $\frac{3'}{8}$  ἰσοῦται τῷ  $\frac{3}{8} \cdot 1'$ .



64. Ὁ πολλαπλασιασμός δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν ἐκτελεῖται, ὡς ἂν ἦσαν ἀμφότεροι θετικοὶ (ἤτοι ἀριθμοὶ τοῦ προηγούμενου συστήματος), καὶ τὸ γινόμενον εἶναι, θετικὸν μὲν, ἂν οἱ παράγοντες εἶναι ὁμοειδεῖς, ἀρνητικὸν δέ, ἂν ἑτεροειδεῖς.

Καὶ ὄντως, ἐπειδὴ εἶναι  $5' = 5.1'$  καὶ  $8' = 8.1'$ ,  
ἔπεται (κατὰ τὴν πρώτην ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ)

$$5'.8 = 5.8.1' = 40.1' = 40'$$

$$\text{καὶ } 5'.8' = 5.8.1'.1' = 40.1 = 40.$$

ὥστε, πλὴν τοῦ εἴδους τοῦ γινομένου, ὁ πολλαπλασιασμός ἐν τῷ συστήματι τούτῳ κατ' οὐδὲν ἄλλο διαφέρει τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐν τῷ προηγούμενῳ συστήματι.

Τὸ γινόμενον ὁσωνδήποτε παραγόντων εἶναι θετικὸν μὲν, ἂν ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀρνητικῶν παραγόντων εἶναι ἄρτιος (διότι ἀνά δύο πολλαπλασιαζόμενοι δίδουσι θετικὸν γινόμενον), ἀρνητικὸν δέ, ἂν περιττός.

65. Τῶν ἴσων ἀριθμῶν τὰ γινόμενα ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἶναι ἴσα· διότι θετικῶς λαμβανόμενα εἶναι ἴσα· εἶναι δὲ καὶ ὁμοειδῆ· ὥστε κατ' οὐδὲν διαφέρουσι.

\* ΣΗΜ. Ἐν τῇ εὑρέσει τοῦ γινομένου δύο ἀριθμῶν τοῦ συστήματος τούτου ἐλήφθησαν μὲν ὑπ' ὄψιν αἱ ἀρχικαὶ ιδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ἀλλ' εἶναι νῦν ἀνάγκη ν' ἀποδειχθῇ ὅτι, ὡς ὠρίσθη ὁ πολλαπλασιασμός, πᾶσαι αἱ ῥηθεῖσαι ιδιότητες διατηροῦνται ἀληθεῖς ἐπὶ πάντων τῶν ἀριθμῶν τοῦ συστήματος. Καὶ ἡ μὲν ἀδιαφορία ὡς πρὸς τὴν τάξιν τῶν παραγόντων εἶναι προφανής· διότι (κατὰ τὸν κανόνα τοῦ ἐδ. 64) πλὴν τοῦ εἴδους τοῦ γινομένου, ὁ πολλαπλασιασμός ἀνάγεται εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τοῦ κλασματικοῦ συστήματος, ἡ δὲ ἐπιμεριστικὴ ιδιότης ἀποδεικνύεται ὡς ἐξῆς.

1) Τὸ γινόμενον τοῦ ἀθροίσματος  $\alpha + \beta$  ἐπὶ ἀκέραιον καὶ θετικὸν ἀριθμὸν, οἷον τὸν 3, εἶναι κατὰ τὸν ὄρισμόν·

$$(\alpha + \beta) \cdot 3 = (\alpha + \beta) + (\alpha + \beta) + (\alpha + \beta) = (\alpha + \alpha + \alpha) + (\beta + \beta + \beta) = \alpha \cdot 3 + \beta \cdot 3.$$

2) Τὸ γινόμενον τοῦ ἀθροίσματος  $\alpha + \beta$  ἐπὶ θετικὴν κλασματικὴν μονάδα, οἷον  $\frac{1}{5}$ , εἶναι (ἐδ. 48) τὸ πέμπτον μέρος τοῦ  $\alpha + \beta$ · ἀλλὰ τὸ πέμπτον τοῦ  $\alpha + \beta$  εἶνε  $\frac{\alpha}{5} + \frac{\beta}{5}$ , διότι τοῦτο πεντάκις ληφθέν, ἤτοι ἐπὶ 5 πολλαπλασιασθέν, γίνεται  $\alpha + \beta$ , ἄρα

$$(\alpha + \beta) \cdot \frac{1}{5} = \frac{\alpha}{5} + \frac{\beta}{5} \cdot \text{ἤτοι} = \alpha \cdot \frac{1}{5} + \beta \cdot \frac{1}{5}.$$

3) Τὸ γινόμενον τοῦ ἀθροίσματος  $\alpha + \beta$  ἐπὶ κλασματικὸν καὶ θετικὸν ἀριθμὸν, ὡς τὸν  $\frac{2}{3}$ , εἶναι (κατὰ τὸν ὄρισμόν τοῦ ἐδ. 48)

$$(\alpha + \beta) \cdot \frac{2}{3} = \frac{(\alpha + \beta)}{3} + \frac{(\alpha + \beta)}{3} = \left( \frac{\alpha}{3} + \frac{\beta}{3} \right) + \left( \frac{\alpha}{3} + \frac{\beta}{3} \right) = \alpha \cdot \frac{2}{3} + \beta \cdot \frac{2}{3}.$$

ὥστε διὰ πάντα θετικὸν ἀριθμὸν  $\gamma$  θὰ εἶναι  $(\alpha + \beta)\gamma = \alpha\gamma + \beta\gamma$ .

Καὶ διὰ πάντα ἀρνητικὸν ἀριθμὸν  $\gamma'$  θὰ εἶναι  $(\alpha + \beta)\gamma' = \alpha\gamma' + \beta\gamma'$ ,  
διότι οἱ ἀντίθετοι αὐτῶν ἀριθμοὶ  $(\alpha + \beta)\gamma$  καὶ  $\alpha\gamma + \beta\gamma$  εἶναι ἴσοι.

### Διαίρεσις.

66. Ἡ διαίρεσις δύο ἀριθμῶν γίνεται, ὡς ἂν ἦσαν ἀμφοτέροι θετικοί, καὶ τὸ πηλίκον εἶναι θετικὸν μὲν, ἂν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ὁμοειδεῖς, ἀρνητικὸν δέ, ἂν ἑτεροειδεῖς.

Π.χ. 8' διὰ 4 δίδει 2', 8 διὰ 4' δίδει 2', καὶ 8' διὰ 4' δίδει 2, διότι ἕκαστον τούτων πολλαπλασιασθὲν ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει τὸν διαιρετέον.

### Συμπέρασμα.

Ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε εἰρημένων γίνεται φανερόν, ὅτι ἐν τῷ συστήματι τῶν θετικῶν καὶ τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν εἶναι πάντοτε δυνατὰ καὶ αἱ τέσσαρες πράξεις (πλὴν μιᾶς ἐξαίρεσεως), ἀνάγεται δὲ ἡ μὲν ἀφαίρεσις εἰς τὴν πρόσθεσιν, ἡ δὲ διαίρεσις εἰς τὸν πολλαπλασιασμόν. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν τούτῳ τῷ συστήματι διατηροῦνται, ὡς ἀπεδείξαμεν, ἀληθεῖς αἱ θεμελιώδεις ιδιότητες τῶν τεσσάρων πράξεων, συνάγεται, ὅτι διατηροῦνται καὶ πᾶσαι αἱ ἐξ αὐτῶν πηγάζουσαι γενικαὶ ιδιότητες τῶν αὐτῶν πράξεων.

### Γραφὴ τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν.

67. Τοὺς θετικούς καὶ τοὺς ἀρνητικούς ἀριθμοὺς διχρῖνομεν συνήθως προτάσσοντες αὐτῶν τὰ σημεῖα + (διὰ τοὺς θετικούς) καὶ — (διὰ τοὺς ἀρνητικούς), ὡς +5, —7, —8, —10, κτλ. καὶ τὸ ἄθροισμα ὅσωνδήποτε ἀριθμῶν παριστῶμεν κατὰ συνθήκην γράφοντες αὐτοὺς τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλον καὶ ἕκαστον μετὰ τοῦ σημείου αὐτοῦ·

οὕτω τὸ ἄθροισμα	$5 + 7' + 9' + 8$	γράφεται	$+5 - 7 - 9 + 8,$
	τὸ $5' + 7'$	»	$-5 - 7,$
	τὸ $3' + 9$	»	$-3 + 9,$
	τὸ $7 + 1$	»	$+7 + 1.$

γίνεται δὲ τοῦτο, διότι τοιοῦτοτρόπως εὐρίσκονται ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν σεσημειωμένοι αἱ πρὸς εὔρεσιν τοῦ ἄθροίσματος ἀπαιτούμεναι πράξεις.

68. Κατὰ ταῦτα, τὰ σημεῖα + καὶ — ἔχουσι διπλὴν χρῆσιν· δηλοῦσι δηλαδή καὶ τὰς πράξεις (τῆς προσθέσεως καὶ τῆς ἀφαιρέσεως) καὶ τὸ εἶδος τῶν ἀριθμῶν· ἀλλὰ τοῦτο οὐδεμίαν σύγχυσιν δύνχται νὰ προξενήσῃ· διότι ἐπὶ μεμονωμένων μὲν ἀριθμῶν, ὡς +5, —7, —9, προφανῶς δηλοῦσι τὰ σημεῖα τὸ εἶδος τῶν ἀριθμῶν· ἐὰν δὲ ἀριθμοὶ τινες συνδέωνται πρὸς ἀλλήλους διὰ τῶν σημείων τούτων, ὡς  $5 + 7 - 9 - 10 + 4$ , εἴτε ταῦτα ἐκληφθῶσιν ὡς σημεῖα τῶν πράξεων, εἴτε ὡς δηλωτικὰ τοῦ εἶδους τῶν προσθετέων ἀριθμῶν, εἰς τὸ αὐτὸ καταντᾶ· διότι ἐν τῷ ληφθέντι παραδείγματι ἡ ἀφαίρεσις τῶν 9 καὶ 10 δύναται νὰ ἀντικατασταθῇ ὑπὸ τῆς προσθέσεως τῶν 9' καὶ 10', ἥτοι τῶν —9 καὶ —10.

## Παράστασις τῶν θετικῶν καὶ τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν.

69. Ἀφοῦ ἀπεδείξαμεν, ὅτι ἐκ τῆς παραδοχῆς δύο εἰδῶν ἀριθμῶν ἀντιθέτων πρὸς ἀλλήλους οὐδαμῶς βλάπτονται αἱ γενικαὶ ἀρχαὶ τῆς ἰσότητος καὶ τῶν τεσσάρων πράξεων, ἀλλὰ μάλιστα ἀποτελεῖται γενικώτερον τι καὶ τελειότερον σύστημα ἀριθμῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ καὶ αἱ τέσσαρες πράξεις ἐκτελοῦνται, μένει νῦν νὰ ἴδωμεν, πρὸς τί ἄλλο δύνανται οἱ ἀριθμοὶ οὔτοι νὰ χρησιμεύσωσι. Φανερόν εἶναι, ὅτι, ἂν παριστῶσιν οἱ ἀριθμοὶ οὔτοι ποσά τινα, τὰ ποσὰ ταῦτα θὰ ἐπιδέχωνται τὴν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ἐνυπάρχουσαν ἀντίθεσιν, ἥτοι θὰ ἔχωσι δύο ἀντιθέτους φοράς· τοιαῦτα δὲ ποσὰ προδήλως εἶναι τὸ κέρδος καὶ ἡ ζημία, ἡ περιουσία καὶ τὸ χρέος ἀνθρώπου τινός, οἱ ἐπὶ τινος γραμμῆς δρόμοι πρὸς τὰ δεξιὰ ἢ πρὸς τὰ ἀριστερά, ὁ χρόνος ὁ παρελθὼν καὶ ὁ μέλλων, καὶ τὰ ὅμοια. Ἐν πᾶσι τούτοις καὶ τοῖς ὁμοίοις ποσοῖς δύνανται κατὰ συνθήκην νὰ παριστῶνται αἱ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν φοράν ἔχουσαι καταστάσεις τοῦ ποσοῦ διὰ τῶν ἀριθμῶν τοῦ ἐνὸς εἴδους, αἱ δὲ τὴν ἐναντίαν ἔχουσαι, διὰ τῶν ἀντιθέτων. Ἐὰν λ.χ. παραστήσωμεν διὰ τοῦ  $+1$  μίαν δραχμὴν κέρδους, ἡ ζημία μιᾶς δραχμῆς δύναται καὶ πρέπει νὰ παρασταθῇ διὰ τοῦ  $-1$ · διότι μία δραχμὴ κέρδους καὶ μία δραχμὴ ζημίας συναποτελοῦσι 0, ἥτοι οὐδόλως ἀλλοιοῦσι τὴν χρηματικὴν κατάστασιν τοῦ ταῦτα παθόντος, ὅπως καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $+1$  καὶ  $-1$  συναποτελοῦσι 0, καὶ οὐδόλως ἀλλοιοῦσιν ἄλλον ἀριθμὸν, ἐὰν ἀμφοτέροι προστεθῶσιν εἰς αὐτόν. Ὁμοίως ἐὰν τις ἀπὸ τινος σημείου 0 τῆς γραμμῆς AB διατρέξῃ δρόμον ἐνὸς πῆχεως πρὸς τὰ δεξιὰ, ἔπειτα δρόμον ἐνὸς πῆχεως πρὸς τὰ ἀριστερά, ὁ πρῶτος δρόμος θέλει παρασταθῇ διὰ τοῦ  $+1$ , ὁ δὲ δεύτερος, ὁ κατ' ἀντίθετον φοράν διανυθείς, διὰ τοῦ  $-1$ · διότι ὁ ἀμφοτέρους διανύσας εἶναι τὸ αὐτὸ ὡς νὰ μὴ ἐκινήθῃ διόλου ἐκ τῆς θέσεώς του. Καὶ ἂν πολλὰ κέρδη καὶ ζημίαι παριστῶνται δι' ἀριθμῶν κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν θὰ παριστᾷ τὸ τελικὸν κέρδος ἢ τὴν τελικὴν ζημίαν, καθ' ὅσον εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικόν. Ἐὰν π.χ. πρῶτον μὲν ἐκέρδησέ τις 5 δραχμάς, εἶτα δὲ ἐζημιώθῃ 3, τὸ ὀλικὸν κέρδος αὐτοῦ εἶναι ἴσον τῷ ἄθροισματι  $5+3$ , ἥτοι 2· ἐὰν δὲ πρῶτον μὲν ἐκέρδησεν 8 δραχμάς, εἶτα δὲ ἐζημιώθῃ 10, ἡ ὀλικὴ ζημία αὐτοῦ ἰσοῦται τῷ ἄθροισματι  $8+10$ , ἥτοι 2· καὶ ἂν τις ἐκέρδησεν 10 δραχμάς, εἶτα ἐζημιώθῃ 8 (ὅτε ἔχει κέρδος  $10+8$ ), εἶτα πάλιν ἐκέρδησεν 4, τὸ ὀλικὸν κέρδος αὐτοῦ εἶναι  $(10+8)+4$  ἥτοι  $10+8+4$ · ὁμοίως καὶ ἐπὶ περισσοτέρων.

Ὁμοίως δεικνύεται, ὅτι, ἂν τις βαδίζῃ ἐπὶ τῆς γραμμῆς AB ὅτε μὲν πρὸς τὰ δεξιὰ, ὅτε δὲ πρὸς τὰ ἀριστερά, καὶ ἕκαστον διάστημα πρὸς τὰ δεξιὰ δια-

νυσθὲν παριστᾶται διὰ θετικοῦ ἀριθμοῦ, ἕκαστον δὲ πρὸς τὰ ἀριστερὰ δικ-  
νυσθὲν δι' ἀρνητικοῦ, τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν τούτων θὰ παραστήσῃ τὴν  
τελικὴν ἀπόστασιν τοῦ κινουμένου ἀπὸ τοῦ σημείου  $O$ , ἐξ οὗ ὠρμήθη, καὶ τὸ  
εἶδος τοῦ ἐκ τῆς προσθέσεως προκύπτοντος ἀριθμοῦ θὰ δεικνύη, ἂν ἡ τελικὴ  
θέσις τοῦ κινήθεντος εἶναι πρὸς τὰ δεξιὰ ἢ πρὸς τὰ ἀριστερὰ τοῦ  $O$ .

Ἐκτὸς τούτου δυνάμεθα νὰ μεταχειρισθῶμεν τοὺς θετικούς καὶ τοὺς  
ἀρνητικούς ἀριθμούς πρὸς ὄρισμὸν τῆς θέσεως πράγματός τινος ἐν σειρᾷ  
πολλῶν ἢ καὶ ἀπείρων πραγμάτων· πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ παραστή-  
σωμεν τὸ τυχὸν τῆς σειρᾶς μέλος διὰ τοῦ ἀριθμοῦ  $0$  καὶ τὰ πρὸς τὰ  
δεξιὰ αὐτοῦ κατὰ σειρὰν διὰ τῶν ἀριθμῶν  $+1, +2, +3$ , κτλ. καὶ  
τὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ τοῦ αὐτοῦ μέλους εὐρισκόμενα διὰ τῶν ἀριθμῶν  
 $-1, -2, -3$ , κτλ.

Εἶναι ἀληθές, ὅτι ὑπάρχουσι καὶ ποσὰ μὴ ἐπιδεχόμενα τοιαύτην ἀντίθεσιν  
κτκστασέων (π. χ. ἡ ἡλικία ἀνθρώπου τινός, αἱ ὥραι, καθ' ἃς θὰ ἐκτελε-  
σθῇ ἔργον τι, κτλ), ἀλλὰ τοῦτο δὲν ἐμποδίζει τὴν παραδοχὴν τῶν ἀρνη-  
τικῶν ἀριθμῶν, ὡς δὲν ἠμπόδισε τὴν παραδοχὴν τῶν κλασματικῶν ἀριθ-  
μῶν ἢ ὑπαρξίς ποσῶν μὴ ἐπιδεχομένων τὴν διαίρεσιν· διότι (ὡς πικρετηρή-  
σαμεν καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ), εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχη ἡ ἀριθμητικὴ γενικὸν τι σύ-  
στημα ἀριθμῶν, δυνάμενον νὰ παραστήσῃ πάντα τὰ ποσὰ καὶ ἐν τῷ ὁποίῳ  
πᾶν ἀριθμητικὸν ζήτημα νὰ λύηται τοῦλάχιστον δι' ἀριθμῶν.

### Ἄνακεφαλαίωσις.

Ἄνακεφαλιούντες πάντα τὰ προηγούμενα συνάγομεν, ὅτι·

1) Ἐὰν θέλωμεν νὰ καταστήσωμεν δυνατὰς καὶ τὰς τέσσαρας πρά-  
ξεις, ἀνάγκη νὰ παραδεχθῶμεν δύο ἀρχικὰς μονάδας ἀντιθέτους πρὸς  
ἀλλήλας ( $1$  καὶ  $1'$ ), ἔτι δὲ καὶ ἄλλας ἀπείρους τὸ πλῆθος δευτερευού-  
σας μονάδας, αἵτινες εἶναι μέρη τέλεια τῶν δύο πρώτων. Ἐκ τούτων  
δὲ τῶν μονάδων ἀποτελεῖται πᾶς ἀριθμός.

2) Πᾶσαι αἱ γενικαὶ ιδιότητες τῶν τεσσάρων πράξεων (τουτέστιν  
αἱ ἐπὶ οἰωνδῆποτε ἀριθμῶν ἀληθεύουσαι) πηγάζουσιν ἐκ δύο ἀρχι-  
κῶν ιδιοτήτων αὐτῶν, τῆς ἀδιαφορίας πρὸς τὴν τάξιν ἐν τε τῇ προσ-  
θέσει καὶ ἐν τῇ πολλαπλασιασμῷ, καὶ τῆς ἐπιμεριστικῆς ιδιότητος.  
Ἐπὶ τῶν δύο τούτων ιδιοτήτων στηρίζεται πᾶσα ἀριθμητικὴ πράξις·  
τὰς ιδιότητας ταύτας εὐρισκομεν μὲν ὑπαρχούσας ἐν τοῖς ἀκεραίοις  
ἀριθμοῖς, τοὺς ὁποίους πρώτους πάντων γνωρίζομεν, διατηροῦμεν δὲ  
καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀριθμῶν, τοὺς ὁποίους ἔπειτα σχηματίζομεν, ἀπο-  
κτιστῶντες αὐτὰς γενικὰς ἀρχὰς ἢ νόμους τῶν πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ.

70. Γινόμενον, οὔτινος πάντες οἱ παράγοντες εἶναι ἴσοι, λέγεται δύναμις τοῦ ἐνός τῶν παραγόντων· καὶ ἂν μὲν εἶναι δύο οἱ παράγοντες, τὸ γινόμενον λέγεται δευτέρα δύναμις ἢ τετράγωνον, ἂν δὲ τρεῖς, τρίτη δύναμις ἢ κύβος καὶ καθεξῆς.

Κατὰ ταῦτα τὸ γινόμενον  $3 \times 3 \times 3 \times 3$  λέγεται τετάρτη δύναμις τοῦ 3, τὸ δὲ γινόμενον  $15 \times 15$  λέγεται δευτέρα δύναμις τοῦ 15.

Τὰς δυνάμεις πρῆστῶμεν συντόμως γράφοντες μόνον ἓνα παράγοντα, δεξιὰ δὲ αὐτοῦ καὶ ὑψηλότερα τὸν ἀκέραιον, ὅστις δεικνύει τὸ πλῆθος τῶν παραγόντων· οἷον·

$$12^4 \text{ σημάζει } 12 \times 12 \times 12 \times 12.$$

$$5^3 \quad \text{»} \quad 5 \times 5 \times 5.$$

Ἐν τῇ τοιαύτῃ γραφῇ τῶν δυνάμεων, ὁ μὲν παράγων λέγεται βᾶσις τῆς δυνάμεως, ὁ δὲ τὸ πλῆθος τῶν παραγόντων ἐκφράζων ἀκέραιος καὶ θετικὸς ἀριθμὸς λέγεται ἐκθέτης τῆς δυνάμεως.

71. Ἐπειδὴ αἱ δυνάμεις εἶναι γινόμενα, ἔπεται, ὅτι αἱ ιδιότητες αὐτῶν εὐρίσκονται ἐκ τῶν ιδιοτήτων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ· εἶναι δὲ ἀρχικαὶ ιδιότητες τῶν δυνάμεων αἱ ἐξῆς·

1) Τὸ γινόμενον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι πάλιν δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἐκθέτην δὲ ἔχει τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἐκθετῶν.

$$\text{Κατὰ ταῦτα εἶναι } a^5 \cdot a^8 = a^{13},$$

$$\text{καὶ γενικῶς } a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

τοῦτο εἶναι ἄμεσον ἀκολούθημα τῆς προτάσεως (30), καθ' ἣν πολλαπλασιάζεται γινόμενον ἐπὶ ἄλλο γινόμενον.

Ἐκ τῆς προτάσεως ταύτης ἀκολουθεῖ, ὅτι καὶ τὸ γινόμενον ὁσωνδήποτε δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι πάλιν δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἐκθέτην ἔχουσα τὸ ἄθροισμα πάντων τῶν ἐκθετῶν· ἦτοι

$$a^m \cdot a^n \cdot \dots \cdot a^p = a^{m+n+\dots+p}$$

$$\text{παραδείγματος χάριν εἶναι } 2^3 \cdot 2^5 = 2^8$$

$$10^2 \cdot 10^6 \cdot 10^8 = 10^{16}.$$

Ἐὰν δὲ ὑποθεθῇ, ὅτι αἱ πολλαπλασιαζόμενα δυνάμεις εἶναι ἴσαι, τουτέστιν, ὅτι εἶναι  $m = n = \dots = p$ , καὶ παρασταθῇ τὸ πλῆθος αὐτῶν διὰ τοῦ π, ἔπεται ἐκ τῆς αὐτῆς προτάσεως

$$a^m \cdot a^m \cdot a^m \cdot \dots \cdot a^m = a^{m+m+m+\dots+m} = a^{m \cdot \pi}$$

καὶ ἐπειδὴ εἶναι  $\alpha^\mu \cdot \alpha^\mu \cdot \alpha^\mu \dots \alpha^\mu = (\alpha^\mu)^\pi$ , συνάγεται

ἡ ιδιότης  $(\alpha^\mu)^\pi = \alpha^{\mu \cdot \pi}$

παρὰδείγματος χάριν  $(3^2)^3 = 3^6$ ,

ἦτοι, ἵνα ὑψώσωμεν δύναμιν ἀριθμοῦ εἰς ἄλλην δύναμιν, πολλαπλασιαζόμεν τοὺς ἐκθέτας.

2) Γινόμενον ὑποῦται εἰς δύναμιν, ἐὰν ὑψωθῇ ἕκαστος τῶν παραγόντων εἰς τὴν αὐτὴν δύναμιν

ἦτοι  $(\alpha \cdot \beta)^\mu = \alpha^\mu \cdot \beta^\mu$

π. χ.  $2^4 \cdot 5^4 = 10^4 = 10000$ .

3) Κλάσμα ὑποῦται εἰς δύναμιν, ἐὰν ἀμφότεροι οἱ ὄροι αὐτοῦ ὑψωθῶσιν εἰς τὴν αὐτὴν δύναμιν

ἦτοι  $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\mu = \frac{\alpha^\mu}{\beta^\mu}$ , οἷον  $\frac{32^5}{16^5} = 2^5$ .

Ἡ εὔρεσις τῶν ιδιοτήτων τούτων ἐκ τῶν ιδιοτήτων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι εὐκολωτάτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ. Τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν αἱ μὲν περιττὸν ἐκθέτην ἔχουσαι δυνάμεις εἶναι ἀρνητικάί, αἱ δὲ ἄρτιον θετικάί.

Π. χ. εἶναι  $(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = +25$

ἀλλὰ  $(-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = +25(-5) = -125$ .

### Ὁρισμοὶ τῶν δυνάμεων $\alpha^1$ καὶ $\alpha^0$ .

72. Κατὰ τὸν δοθέντα ὀρισμὸν ὁ ἐκθέτης πάσης δυνάμεως εἶναι ἀριθμὸς ἀκέραιος καὶ θετικὸς καὶ οὐχὶ μικρότερος τοῦ 2. Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρύνωμεν τὸν ὀρισμὸν τῶν δυνάμεων καὶ ἐπὶ ἄλλων ἐκθετῶν, δεόν νὰ διατηρήσωμεν ἐπὶ πασῶν τῶν δυνάμεων τὰς αὐτὰς ἀρχικὰς ιδιότητας, (ὡς διετηρήσαμεν καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἀριθμῶν τὰς ἀρχικὰς ιδιότητας τῶν πράξεων)· διότι τοῦτο καὶ ἀπλουστέραν καθιστᾷ καὶ γενικωτέραν τὴν ἀριθμητικὴν· ἀλλὰ καὶ τὸν γενικὸν ὀρισμὸν πάσης δυνάμεως δίδει, ὡς ἐν τοῖς ἐπομένοις θὰ δειχθῇ.

Διὰ νὰ εὐρώμεν, πῶς πρέπει νὰ ὀρίσωμεν τὰς δυνάμεις  $\alpha^1$  καὶ  $\alpha^0$ , ὥστε νὰ διατηρηθῇ καὶ δι' αὐτὰς ἡ πρώτη ιδιότης τῶν δυνάμεων, ἥτις ἐκφράζεται διὰ τῆς ἰσότητος  $\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\mu+\nu}$ ,

παρρηγοῦμεν, ὅτι, ἂν ὑποθέσωμεν τὴν ἰσότητα ταύτην ἀληθῆ καὶ διὰ  $\mu=1$ , εὐρίσκομεν  $\alpha^1 \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\nu+1}$ ,

ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι  $\alpha^1$  εἶναι πηλίκον τῆς διαίρεσεως τοῦ  $\alpha^{\nu+1}$ , ἦτοι τοῦ  $\alpha^\nu \cdot \alpha$ , διὰ  $\alpha^\nu$ , καὶ ἐπομένως (ἐὰν  $\alpha$  διαφέρῃ τοῦ 0) ἰσοῦται τῷ  $\alpha$ .

ὥστε, ἂν θέλωμεν νὰ διατηρηθῇ ἡ ἀρχικὴ ιδιότης τῶν δυνάμεων, δεόν νὰ ὀρίσωμεν ὡς πρώτην δύναμιν παντὸς ἀριθμοῦ (πλὴν τοῦ 0) αὐτὸν τοῦτον τὸν ἀριθμὸν, ἥτοι  $\alpha^1 = \alpha$ .

Ἐὰν ἐν τῇ αὐτῇ ἰσότητι τεθῇ  $\mu = 0$ , προκύπτει  $\alpha^0 \cdot \alpha^\nu = \alpha^\nu$  ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι  $\alpha^0$  εἶναι πηλίκον τοῦ  $\alpha^\nu$  διαιρεθέντος διὰ  $\alpha^\nu$ , ἥτοι εἶναι ἴσον τῇ μονάδι 1 (ἐὰν μὴ εἶναι  $\alpha = 0$ ), ὥστε  $\alpha^0$  οἰουδήποτε ὄντος τοῦ  $\alpha$  (πλὴν τοῦ 0) δεόν νὰ ὀρισθῇ ὡς ἴσον τῇ μονάδι 1.

### Διαίρεσις δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

73. Τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι πάλιν δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἔχουσα ἐκθέτην τὴν διαφορὰν τῶν δύο ἐκθετῶν· τῆς διαφορᾶς δὲ ταύτης μειωτέος μὲν εἶναι ὁ ἐκθέτης τοῦ διαιρέτου, ἀφαιρετέος δὲ ὁ τοῦ διαιρέτου.

ὑποθέσωμεν, ὅτι πρόκειται νὰ διαιρεθῇ  $\alpha^\mu$  διὰ  $\alpha^\nu$ , εἶναι δὲ  $\mu > \nu$  λέγω, ὅτι τὸ πηλίκον εἶναι·

$$\alpha^{\mu-\nu}$$

Διότι τοῦτο πολλαπλασιασθὲν ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει  $\alpha^{\mu-\nu} \cdot \alpha^\nu$ , ἥτοι κατὰ τὴν ἀρχικὴν ιδιότητα τῶν δυνάμεων,  $\alpha^\mu$ , ἥτοι τὸν διαιρέτον· ὥστε εἶναι·

$$\frac{\alpha^\mu}{\alpha^\nu} = \alpha^{\mu-\nu}$$

ὑπετέθη  $\mu > \nu$  ἀληθεύει δὲ ἡ ἰσότης αὕτη, καὶ ὅταν εἶναι  $\mu = \nu$  διότι τότε γίνεται·

$$\frac{\alpha^\mu}{\alpha^\mu} = \alpha^0 = 1.$$



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ



# ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

## ΒΙΒΛΙΟΝ Α΄.

### Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΛΓΕΒΡΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

##### ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ

##### Ὅρισμὸς τῆς Ἀλγέβρας.

Ἡ Ἀλγεβρα εἶναι γενικὴ ἀριθμητικὴ ἀσχολεῖται δὲ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν ζητήματα.

Ἡ μὲν ἀριθμητικὴ, ἀσχολουμένη περὶ τοὺς ἀριθμοὺς, ἀποβλέπει κυρίως εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν τρόπων, καθ' οὓς ἐκτελοῦνται αἱ ἐπ' αὐτῶν πράξεις ἢ δὲ ἄλγεβρα ἐρευνᾷ τὰς ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν ὑπαρχούσας γενικὰς σχέσεις· τουτέστι τὰς σχέσεις, αἵτινες ὑπάρχουσι μεταξύ δύο ἢ περισσότερων ἀριθμῶν, οἰοιδήποτε καὶ ἂν εἶναι οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι· ὅτι δὲ τοιαῦται σχέσεις ὑπάρχουσιν, ἐμάθομεν ἐν τοῖς προηγουμένοις.

Καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν ζητήματα λύει ἡ ἄλγεβρα κατὰ γενικὴν τινα μέθοδον, ἣτις στηρίζεται ἐπὶ τῶν εἰρημένων γενικῶν σχέσεων τῶν ἀριθμῶν· λύει δ' αὐτὰ καὶ γενικώτερον· διότι ἐπὶ ἐκάστου ζητήματος εὐρίσκει τὰς πράξεις, αἵτινες πρέπει νὰ ἐκτελεσθῶσιν ἐπὶ τῶν δεδομένων ἀριθμῶν, οἰοιδήποτε καὶ ἂν εἶναι οὗτοι, ἵνα ἐξ αὐτῶν εὕρηθῃ ὁ ἄγνωστος.

##### Ἀλγεβρικὰ σύμβολα.

Ἐν τῇ ἀλγέβρᾳ αἱ πράξεις ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν καὶ αἱ μεταξύ αὐτῶν σχέσεις τῆς ἰσότητος καὶ ἀνισότητος σημειοῦνται διὰ τῶν αὐτῶν συμβόλων, δι' ὧν καὶ ἐν τῇ ἀριθμητικῇ.

Καὶ οἱ ἀριθμοὶ παρίστανται συνήθως διὰ τῶν γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου. Ἐκαστον δὲ γράμμα παριστᾷ ἐν ἐκάστῳ ζητήματι ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Ἀριθμοὺς διαφέροντας ἀπ' ἀλλήλων παριστῶμεν διὰ διαφόρων γραμμάτων, ἢ διὰ τοῦ αὐτοῦ μὲν γράμματος (ἐὰν ἔχωσιν τι κοινόν), φέροντος ὅμως τόνους πρὸς διάκρισιν τῶν ἀριθμῶν ἀπ' ἀλλήλων, ὡς  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ ,  $\alpha'''$ , κτλ.

ΣΗΜ. Ὅτι διὰ τῶν συμβόλων τούτων αἱ μεταξύ τῶν ἀριθμῶν γενικαὶ σχέσεις γράφονται συντομώτερον ἢ διὰ τῆς κοινῆς γραφῆς εἶναι φανερόν· ἢ συντομία δ' αὕτη, ὅταν πολλαχῶς αἱ πράξεις συνδυάζονται, εἶναι ὠφελιμωτάτη· διότι δι' αὐτῆς λαμβάνομεν σαφεστέραν ἰδέαν τοῦ συνόλου τῶν πράξεων καὶ εὐκολώτερον μεταβαίνομεν ἀπὸ μιᾶς σχέσεως εἰς ἄλλην, ὡς ἐν τοῖς ἐπομένοις θὰ ἴδωμεν.

**Ἀλγεβρικοὶ παραστάσεις καὶ διάφορα εἴδη αὐτῶν.**

**Ὁρισμοί.**

74. Ἀλγεβρική παράστασις ἢ ἀλγεβρικός τύπος λέγεται ἢ διὰ τῶν ἀλγεβρικῶν συμβόλων σημειώσις πράξεων ἐπὶ γραμμάτων καὶ ἀριθμῶν ἢ καὶ μόνον ἐπὶ γραμμάτων, οἷον  $3x^2 - 2αβ + 5β^2$  εἶναι ἀλγεβρική παράστασις ἢ τύπος.

Ἐπειδὴ μέχρι τοῦδε μόνον τὰς τέσσαρας θεμελιώδεις πράξεις ἐγνωρίσαμεν, διὰ τοῦτο ὑποθέτομεν πρὸς τὸ παρὸν ταύτας μόνον τὰς πράξεις σεσημειωμένας ἐν ταῖς ἀλγεβρικοῖς παραστάσεσιν.

75. Ὅταν παράστασις, ὡς εἷς ἀριθμὸς θεωρουμένη, συνδυάζεται δι' οἰαζδήποτε πράξεως πρὸς ἄλλην παράστασιν ἢ πρὸς ἀπλοῦν γράμμα ἢ καὶ πρὸς ἀριθμὸν, ἐγκλείεται εἰς παρένθεσιν. Οὕτως ἡ διαφορὰ τῆς παραστάσεως  $α - β$  ἀπὸ τοῦ  $γ$  παρίσταται διὰ τοῦ  $γ - (α - β)$ · τὸ δὲ γινόμενον τῆς παραστάσεως  $α - β$  ἐπὶ  $γ$  παρίσταται διὰ τοῦ  $(α - β)γ$ .

Ὁμοίως εὐρίσκεται καὶ ἡ σημασία τῶν ἐπομένων παραστάσεων

$$\begin{array}{lll} (α + β) (α - β), & 3. (αβ - γδ)α & 5 (α + β) \\ [α - (β - γ)] δ & [α - (β - γ)] (δ + ζ). & \end{array}$$

76. Παράστασις, ἐν ἣ μῆτε πρόσθεσις μῆτε ἀφαίρεσις εὐρίσκεται σεσημειωμένη, λέγεται *μονώνυμον*· οἷον αἱ παραστάσεις

$$\frac{3α}{β} \quad 5αβ^2, \quad 8'αβ, \quad \frac{1'}{2} α \quad \text{εἶναι μονώνυμα.}$$

Τὸ μονώνυμον εἶναι ἀκέραιον, ἐὰν μόνον πολλαπλασιασμὸν ἐπὶ τῶν γραμμάτων περιέχῃ· ἐὰν δὲ καὶ διαίρεσιν ἐπὶ τῶν γραμμάτων περιέχῃ, λέγεται *κλασματικόν*.

Ἐὰν ἐν τῷ μονωνύμῳ ὑπάρχῃ τις ἀριθμητικὸς παράγων, γράφεται οὗτος πρῶτος καὶ λέγεται *συντελεστής* τοῦ μονωνύμου· οὕτω τῶν μονωνύμων

$$5α \quad 8 \frac{α}{β} \quad \frac{3}{7} α^2 \quad 4'β^2 \quad \text{συντελεσταὶ εἶναι}$$

$$\text{οἱ ἀριθμοὶ } 5, \quad 8, \quad \frac{3}{7}, \quad 4'.$$

Ὅταν τὸ μονώνυμον δὲν ἔχη συντελεστήν, ἐννοῦμεν συντελεστήν αὐτοῦ τὴν θετικὴν μονάδα 1· οἷον τοῦ αβ συντελεστής εἶναι ἡ μονάς· διότι δύναται νὰ γραφῆ καὶ ὡς ἐξῆς 1.αβ. Ὡσαύτως ἀντὶ α δύναμεθα νὰ γράψωμεν 1.α· ὥστε καὶ τὰ ἀπλᾶ γράμματα ὑπάγονται εἰς τὰς παραστάσεις.

Ἐπειδὴ ὁ συντελεστής τοῦ μονωνύμου εἶναι ἢ θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς, ἔπεται, ὅτι, ὅταν τὸ εἶδος τῶν ἀριθμῶν (68) σημαίνεται διὰ τῶν σημείων + καὶ —, τὰ μὲν θετικὸν συντελεστήν ἔχοντα μονώνυμα θὰ ἔχουσι πρὸ αὐτῶν τὸ +, τὰ δὲ ἀρνητικόν, τὸ —. Οὕτω

$$\begin{array}{ccccc} +\alpha & +3\alpha\beta & -5\gamma^2 & -8\alpha^2\beta & -\alpha \\ \text{εἶναι } (+1)\alpha, & (+3).\alpha\beta, & (-5).\gamma^2, & (-8).\alpha^2\beta, & (-1)\alpha, \end{array}$$

ὥστε τὸ πρὸ τοῦ μονωνύμου γραφόμενον σημεῖον + ἢ — εἶναι τοῦ συντελεστοῦ αὐτοῦ καὶ δεικνύει τὸ εἶδος τοῦ συντελεστοῦ.

Οἱ θετικοὶ συντελεσταὶ γράφονται συνήθως ἀνευ σημείου.

77. Πολυώνυμον λέγεται τὸ ἄθροισμα μονωνύμων· γράφεται δὲ τὸ ἄθροισμα ὅσωνδῆποτε μονωνύμων, ὡς καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν· ἤτοι γράφονται τὰ μονώνυμα ἐν μετ' ἄλλο καθ' οἷανδῆποτε τάξιν καὶ ἕκαστον μετὰ τοῦ σημείου του· οἷον αἱ παραστάσεις

$$3\alpha^2 - \beta^2 + \alpha\gamma, \quad 8\alpha^2 - 2\alpha\beta + 4\gamma^2 - 6\delta\gamma$$

εἶναι πολυώνυμα· καὶ τὸ μὲν πρῶτον εἶναι ἄθροισμα τῶν μονωνύμων +  $3\alpha^2$ ,  $-\beta^2$ ,  $+\alpha\gamma$ , τὸ δὲ δεύτερον εἶναι ἄθροισμα τῶν ἐξῆς

$$+ 8\alpha^2, - 2\alpha\beta, + 4\gamma^2, - 6\delta\gamma.$$

Ὅροι τοῦ πολυωνύμου λέγονται τὰ μονώνυμα, τῶν ὁποίων εἶναι ἄθροισμα τὸ πολυώνυμον. Ἐὰν οἱ ὅροι εἶναι δύο, τὸ πολυώνυμον λέγεται διώνυμον, ἐὰν τρεῖς, τριώνυμον.

Οἱ τὸ + ἔχοντες ὅροι λέγονται θετικοί, οἱ δὲ τὸ — ἀρνητικοί.

Τὸ σημεῖον τοῦ πρώτου ὅρου, ἐὰν εἶναι τὸ +, παραλείπεται συνήθως.

Τὸ πολυώνυμον εἶναι ἀκέραιον, ἐὰν πάντα τὰ μονώνυμα, ἐξ ὧν ἀποτελεῖται, εἶναι ἀκέραια.

Ὅτι τὰ σημεῖα + καὶ —, ἅτινα ἔχουσι πρὸ αὐτῶν οἱ ὅροι τοῦ πολυωνύμου, δύναται νὰ ἐκληφθῶσι καὶ ὡς σημεῖα τῶν πράξεων (προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως), χωρὶς ἐκ τούτου νὰ προκύψῃ σύγχυσις, ἀποδεικνύεται ὡς καὶ ἐν τῷ ἐδ. 68· διότι π. χ. εἰς τὸ πολυώνυμον  $2\alpha^2 - \beta^2 + \alpha\gamma$  δύναμεθα, ἀντὶ νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ  $\beta^2$ , νὰ προσθέσωμεν τὸν ἀντίθετον αὐτοῦ ἀριθμὸν, ἤτοι τὸ  $-\beta^2$ .

**Βαθμὸς τῶν ἀκεραίων παραστάσεων.**

78. Βαθμὸς ἀκεραίου μονωνύμου πρὸς τι γράμμα λέγεται ὁ ἐκθέτης τοῦ γράμματος τούτου ἐν τῷ μονωνύμῳ· οἷον τὸ μονώνυμον  $8\alpha^2\beta^3\gamma\delta^4$  εἶναι πρὸς τὸ  $\alpha$  δευτέρου βαθμοῦ, πρὸς τὸ  $\beta$  τρίτου καὶ πρὸς τὸ  $\delta$  τετάρτου.

Ἐὰν γράμμα τι δὲν ἔχῃ ἐκθέτην, ὑποτίθεται, ὅτι ἔχει τὴν μονάδα 1 (72). Ὡστε τὸ αὐτὸ μονώνυμον εἶναι πρώτου βαθμοῦ πρὸς τὸ  $\gamma$ .

Πᾶν μονώνυμον εἶναι βαθμοῦ 0 πρὸς πᾶν γράμμα μὴ ἐν αὐτῷ περιεχόμενον· διότι δύναται νὰ ὑποτεθῇ ἐν τῷ μονωνύμῳ ὡς παράγων ἢ 0 δυνάμεις τοῦ γράμματος, ἥτις ἰσοῦται τῇ μονάδι 1 (72).

Πρὸς πολλὰ δὲ γράμματα βαθμὸς μονωνύμου λέγεται τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν τῶν αὐτῶν γραμμάτων ἐν τῷ μονωνύμῳ·

οἷον τὸ μονώνυμον  $5\alpha^2\beta^2\gamma\delta^3$  εἶναι πρὸς τὰ γράμματα  $\alpha$  καὶ  $\beta$  τοῦ τετάρτου βαθμοῦ· πρὸς δὲ τὰ  $\alpha, \beta, \gamma$ , τοῦ πέμπτου· πρὸς δὲ τὰ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  τοῦ ὀγδόου κτλ.

Βαθμὸς ἀκεραίου πολυωνύμου πρὸς τι γράμμα λέγεται ὁ μέγιστος τῶν βαθμῶν τῶν ὄρων αὐτοῦ πρὸς τὸ αὐτὸ γράμμα· οἷον τὸ πολυώνυμον

$$\chi^5 + 4\chi^4 - 3\alpha^2\chi^2 + 5\alpha^4$$

εἶναι πρὸς τὸ  $\chi$  τοῦ πέμπτου βαθμοῦ, πρὸς δὲ τὸ  $\alpha$  τοῦ τετάρτου.

Ὅμογενές λέγεται τὸ πολυώνυμον πρὸς τινὰ γράμματα, ἐὰν πάντες οἱ ὄροι αὐτοῦ εἶναι τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰ γράμματα ταῦτα· π. χ. τὸ πολυώνυμον  $3\alpha^2 + 2\beta^2 - 7\alpha\beta$  εἶναι ὁμογενές πρὸς τὰ  $\alpha$  καὶ  $\beta$ · ὁμοίως καὶ τὸ πολυώνυμον  $\alpha^2 + \nu\beta^2$  εἶναι ὁμογενές πρὸς  $\alpha$  καὶ  $\beta$ .

**Μερικαὶ τιμαὶ τῶν ἀλγεβρικῶν παραστάσεων.**

79. Ἐὰν ἐν ἀλγεβρικῇ παραστάσει ἕκαστον τῶν γραμμάτων ἀντικατασταθῇ ὑπὸ ἀριθμοῦ καὶ ἐκτελεσθῶσιν αἱ σεσημειωμένοι πράξεις, ὁ προκύπτων ἀριθμὸς λέγεται τιμὴ τῆς παραστάσεως· καὶ ὁ ἀριθμὸς, ὁ γράμμα τι ἀντικαθιστῶν, λέγεται τιμὴ τοῦ αὐτοῦ γράμματος.

Ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως ἐξαρτᾶται ἐκ τῶν τιμῶν τῶν γραμμάτων, ἅτινα περιέχει· καὶ εἶναι ἐντελῶς ὠρισμένη, ὅταν αἱ τιμαὶ τῶν γραμμάτων δοθῶσιν· οἷον ἡ παράστασις  $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2$

ἂν μὲν ὑποτεθῇ  $\alpha = 3, \quad \beta = 2, \quad \gamma = 1,$   
 δίδει  $3^2 + 2^2 - 1^2$  ἢ  $9 + 4 - 1$  ἥτοι 12·

ἂν δὲ ὑποτεθῇ  $\alpha = 5, \quad \beta = 3, \quad \gamma = 3,$   
 γίνεται  $5^2 + 3^2 - 3^2$  ἢ  $25 + 9 - 9,$  ἢ 25·

ἂν δὲ ὑποτεθῇ  $\alpha = 4$  καὶ  $\beta = \gamma,$

ἡ παράστασις γίνεται  $4^2 + \beta^2 - \beta^2$  ἤτοι 16.

Ἐὰν δὲ ὑποτεθῇ  $\alpha=3$ ,  $\beta=4$ ,  $\gamma=5$ , ἡ παράστασις γίνεται 0.

### Ζητήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Εὐρεῖν τὰς τιμὰς τῆς παραστάσεως  $2\chi^2 - 5\chi + 2$  τὰς ἀντιστοιχοῦσας πρὸς τὰς ἐπομένους τιμὰς τοῦ  $\chi$ .  $\chi=0, 1, 2, 3, 4, 5$ .

2) Εὐρεῖν τὰς τιμὰς τῆς παραστάσεως  $3\alpha^2 + 2\alpha\chi - \chi^2$  τὰς ἀντιστοιχοῦσας πρὸς τὰς ἐπομένους τιμὰς τῶν γραμμάτων

$\alpha=0$	$\alpha=1$	$\alpha=\frac{1}{2}$	$\chi=3\alpha$	$\chi=-\alpha$
$\chi=0$	$\chi=\frac{1}{2}$	$\chi=1$		

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

### ΑΛΓΕΒΡΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

80 Ἀλγεβρικαὶ πράξεις λέγονται αἱ μεταβολαί, αἵτινες δυνάμει τῶν γενικῶν νόμων τῶν πράξεων γίνονται ἐπὶ τῶν παραστάσεων, ἐν ὧσιν ὁ ὑπὸ τῶν γραμμάτων παριστώμενοι ἀριθμοὶ μένουσιν ἐντελῶς ἀόριστοι. Οὕτω, παραδείγματος χάριν, τὴν παράστασιν  $(\alpha + \beta + \gamma) \cdot \delta$  δυνάμεθα νὰ μεταβάλωμεν εἰς τὴν ἐπομένην  $(\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta) + (\gamma \cdot \delta)$ , οἷους δὴποτε ἀριθμοὺς καὶ ἂν παριστῶσι τὰ γράμματα, δυνάμει τοῦ ἐπιμεριστικοῦ νόμου· τοῦτο δὲ ποιῶντες ἐκτελοῦμεν ἀλγεβρικὴν πράξιν.

Τὸ σύνολον τῶν ἀλγεβρικῶν πράξεων λέγεται Ἀλγεβρικὸς λογισμὸς.

81. Δύο παραστάσεις ἐξ ἀλλήλων προκύπτουσιν, δυνάμει τῶν εἰρημένων νόμων λέγονται ἴσαι· διότι προδήλως δίδουσιν ἀμφότεραι ἴσους ἀριθμούς, ὅταν ἕκαστον τῶν γραμμάτων ἐντικατασταθῇ ὑπὸ τυχόντος ἀριθμοῦ· τοιαῦται εἶναι λ. χ. αἱ παραστάσεις

$$(\alpha + \beta + \gamma) \cdot \delta \quad \text{καὶ} \quad \alpha \cdot \delta + \beta \cdot \delta + \gamma \cdot \delta.$$

82. Αἱ ἐπὶ τῶν παραστάσεων σημειούμεναι πράξεις ἔχουσι τὰς γενικὰς ιδιότητες τῶν ὁμωνύμων ἀριθμητικῶν πράξεων· διότι καὶ αἱ παραστάσεις ἀριθμοὺς τινὰς παριστῶσι πάντοτε. Οὕτω π. χ. εἶναι

$$\frac{\alpha + \beta}{\gamma} = \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\gamma}$$

καὶ ὅταν ἀντὶ  $\alpha, \beta, \gamma$ , τεθῶσιν οἰαιδὴποτε παραστάσεις· διότι ἡ ἰσότης αὕτη ἐδείχθη ἀληθὴς (40) ἐπὶ τριῶν οἰωνδὴποτε ἀριθμῶν.

### Πρόσθεσις.

83. Ἐπειδὴ πᾶν πολυώνυμον εἶναι ἄθροισμα τῶν ὄρων αὐτοῦ, ἔπεται ὅτι, ἵνα προσθέσωμεν πολυώνυμον εἰς ἄλλο πολυώνυμον, ἀρκεῖ νὰ σχηματίσωμεν ἐν πολυώνυμον ἐκ πάντων τῶν ὄρων ἀμφοτέρων τῶν πολυ-

νύμων (18), διατηροῦντες τὸ σημεῖον ἐκάστου ὄρου.

Φανερόν δὲ εἶναι, ὅτι τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ περὶ ὄσωνδήποτε πολυωνύμων ἢ καὶ μονωνύμων.

Κατὰ ταῦτα τὸ ἄθροισμα  $(3\alpha^2 - \beta^2 + 5\alpha\beta) + (8\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2)$   
 τῶν δύο πολυωνύμων  $3\alpha^2 - \beta^2 + 5\alpha\beta$  καὶ  $8\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2$   
 ἰσοῦται τῷ πολυωνύμῳ  $3\alpha^2 - \beta^2 + 5\alpha\beta + 8\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2$ .

Καὶ τὸ ἄθροισμα  $(\alpha - \beta + \gamma) + (\delta + \varepsilon - \zeta) + (\eta - \theta)$   
 τῶν τριῶν πολυωνύμων  $\alpha - \beta + \gamma$ ,  $\delta + \varepsilon - \zeta$ ,  $\eta - \theta$ .  
 ἰσοῦται τῷ πολυωνύμῳ  $\alpha - \beta + \gamma + \delta + \varepsilon - \zeta + \eta - \theta$ .

Καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο μονωνύμων  $8\alpha\beta$  καὶ  $-3\gamma\delta$   
 ἴσται τὸ  $(8\alpha\beta) + (-3\gamma\delta)$

ἰσοῦται (77) τῷ διωνύμῳ  $8\alpha\beta - 3\gamma\delta$ .

τῶν δὲ μονωνύμων  $-9\gamma\delta$  καὶ  $-3\varepsilon^2$  τὸ ἄθροισμα εἶναι  $-9\gamma\delta - 3\varepsilon^2$ .

### Περὶ τῶν ὁμοίων ὄρων καὶ τῆς προσθέσεως αὐτῶν.

84. Ὅμοιοι ὄροι λέγονται οἱ κατὰ τὸν συντελεστὴν μόνον διαφερόντες (ἂν διαφέρωσιν). Οὕτως ἐν τῷ πολυωνύμῳ

$$2\alpha\beta + 5\beta\gamma - 4\alpha\beta + 8\alpha\beta$$

οἱ ὄροι  $2\alpha\beta$ ,  $-4\alpha\beta$ ,  $8\alpha\beta$  εἶναι ὁμοιοί.

Πάντες οἱ ὁμοιοί ὄροι τοῦ πολυωνύμου δύνανται νὰ προστεθῶσι καὶ συγχωνευθῶσιν εἰς ἓνα· ἡ δὲ πρᾶξις αὕτη λέγεται πρόσθεσις ἢ ἀναγωγή τῶν ὁμοίων ὄρων.

Ἐστω τυχὸν πολυώνυμον, ἔχον ὁμοίους ὄρους, τὸ

$$8\alpha\beta\gamma^2 + 15\alpha\beta\gamma^2 - 2\alpha\beta\gamma^2 - 7\alpha\beta^2\gamma + 12\alpha^2\beta\gamma - 13\alpha\beta\gamma^2$$

δῆλον, ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν ὁμοίων ὄρων

$$8\alpha\beta\gamma^2 + 15\alpha\beta\gamma^2 - 2\alpha\beta\gamma^2 - 13\alpha\beta\gamma^2$$

ἰσοῦται (32) τῷ γινομένῳ

$$\alpha\beta\gamma^2 (+8 + 15 - 2 - 13)$$

ἴσται τῷ

$$\alpha\beta\gamma^2 (+8) \quad \text{ἢ} \quad 8\alpha\beta\gamma^2.$$

ἐξ οὗ συνάγεται, ὅτι

Πάντες οἱ ὁμοιοί ὄροι πολυωνύμου ἀποτελοῦσιν ἓνα ὄρον ὁμοιον αὐτοῖς καὶ ἔχοντα συντελεστὴν τὸ ἄθροισμα τῶν συντελεστῶν τῶν αὐτῶν ὄρων.

Κατὰ ταῦτα τὸ πολυώνυμον  $\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 + \alpha^2 + 4\alpha\beta + \beta^2$

ἰσοῦται τῷ  $2\alpha^2 + 2\beta^2 + 2\alpha\beta$ .

καὶ τὸ πολυώνυμον  $3\alpha\beta - 4\alpha^2 + 5\alpha\beta - 8\beta^2 - 8\alpha\beta + 3\beta^2$

ἰσοῦται τῷ  $-4\alpha^2 - 5\beta^2$ .

**Ἀφαιρέσεις.**

85. Ἄς ὑποθέσωμεν, ὅτι πρόκειται ἀπὸ παραστάσεως οἰασθήποτε  $M$  νὰ ἀφαιρεθῇ πολυώνυμον, ἔστω τὸ  $\alpha - \beta + \gamma + \delta - \epsilon - \zeta$ .

ἵνα ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ  $M$  τὸν ὑπὸ τοῦ πολυωνύμου παριστώμενον ἀριθμὸν, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν τὸν ἀντίθετον αὐτοῦ· οὗτος δὲ προδήλως εὑρίσκεται, ἐὰν ἀλλάθῃσι τὰ σημεῖα πάντων τῶν ὄρων τοῦ πολυωνύμου· ἐπομένως ἡ διαφορὰ

$$M - (\alpha - \beta + \gamma + \delta - \epsilon - \zeta)$$

ἰσοῦται τῇ παραστάσει

$$M - \alpha + \beta - \gamma - \delta + \epsilon + \zeta.$$

ἦτοι, ἵνα ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ παραστάσεως οἰασθήποτε δοθὲν πολυώνυμον, γράφομεν κατόπιν αὐτῆς πάντας τοὺς ὄρους τοῦ ἀφαιρετέου πολυωνύμου ἀλλάσσοντες τὰ σημεῖα αὐτῶν, ἦτοι τρέποντες τὰ  $+$  εἰς  $-$  καὶ ἀντιστρόφως.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ.** Ὅτι ἡ παράστασις  $M - \alpha + \beta - \gamma - \delta + \epsilon + \zeta$  ἰσοῦται τῇ διαφορᾷ τῶν δύο ἐπομένων

$$M \quad \text{καὶ} \quad \alpha - \beta + \gamma + \delta - \epsilon - \zeta,$$

γίνεται φανερὸν καὶ ἐκ τούτου, ὅτι τὸ ἄθροισμα αὐτῆς καὶ τοῦ ἀφαιρετέου ἰσοῦται τῷ μειωτέῳ  $M$ · διότι τὸ εἰρημένον ἄθροισμα γράφεται (77) καὶ ὡς ἐξῆς  $M + \alpha - \alpha + \beta - \beta + \gamma - \gamma + \delta - \delta + \epsilon - \epsilon + \zeta - \zeta$ .

**Ζητήματα πρὸς ἄσκησιν.**

1) Εὑρεῖν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πολυωνύμων

$$\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \quad \text{καὶ} \quad \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2$$

Ἄπ.  $2\alpha^2 + 2\beta^2.$

2) Εὑρεῖν τὴν διαφορὰν τῶν αὐτῶν πολυωνύμων

Ἄπ.  $4\alpha\beta.$

3) Εὑρεῖν τὸ ἄθροισμα τῶν ἐπομένων πολυωνύμων

$$\alpha + \beta - \gamma$$

$$\alpha - \beta + \gamma$$

$$- \alpha + \beta + \gamma.$$

Ἄπ.  $\alpha + \beta + \gamma.$

4) Εὑρεῖν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πολυωνύμων \*

$$\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3$$

$$\alpha^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3.$$

Ἄπ.  $2\alpha^3 + 6\alpha\beta^2.$

**Πολλαπλασιασμός.**

α'.) Πολλαπλασιασμός ἀκεραίων μονωνύμων.

86. Πολλαπλασιασμός δύο μονωνύμων εἶνε ἡ εὐρεσις μονωνύμου ἴσου πρὸς τὸ γινόμενον αὐτῶν.

Ἐπειδὴ πᾶν ἀκεραῖον μονώνυμον εἶναι (76) γινόμενον πολλῶν παραγόντων, ἔπεται ἀμέσως ἡ πρότασις:

Τὸ γινόμενον δύο ἀκεραίων μονωνύμων εἶναι μονώνυμον, ἔχον παραγόντας πάντας τοὺς παράγοντας ἀμφοτέρων τῶν μονωνύμων.

Ἔστωσαν ὡς παράδειγμα τὰ μονώνυμα

$$+3\alpha\beta^2\gamma \quad \text{καὶ} \quad -5\alpha^2\beta\gamma^3\delta.$$

ἐπειδὴ τὸ μὲν πρῶτον εἶναι γινόμενον τῶν παραγόντων  $+3, \alpha, \beta^2, \gamma,$  τὸ δὲ δεύτερον τῶν  $-5, \alpha^2, \beta, \gamma^3, \delta,$

ἔπεται (30), ὅτι τὸ γινόμενον αὐτῶν εἶναι  $+3 \cdot \alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma \cdot (-5) \cdot \alpha^2 \cdot \beta \cdot \gamma^3 \cdot \delta.$

Ἐπειδὴ δὲ οἱ παράγοντες δύνανται νὰ γραφῶσι καθ' οἰανδήποτε θέλωμεν τάξιν, τὸ αὐτὸ γινόμενον ἰσοῦται τῷ

$$(+3) \cdot (-5) \cdot \alpha \cdot \alpha^2 \cdot \beta^2 \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \gamma^3 \cdot \delta$$

$$\text{ἦτοι (28) τῷ} \quad -15\alpha^3\beta^3\gamma^4\delta.$$

Ὁμοίως εὐρίσκωμεν, ὅτι τὸ γινόμενον τῶν μονωνύμων

$$-12\alpha^5\beta\gamma\delta \quad \text{καὶ} \quad -\alpha\gamma^2\delta$$

εἶναι  $(-12) \cdot (-1) \cdot \alpha^5 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \gamma^2 \cdot \delta \cdot \delta$  ἦτοι  $+12\alpha^6\beta\gamma^3\delta^2.$

Καὶ τὸ γινόμενον τῶν μονωνύμων  $6\alpha\beta\gamma^2$  ἐπὶ  $12\alpha^3\beta^4$

εὐρίσκεται ὁμοίως ἴσον τῷ μονωνύμῳ  $72\alpha^4\beta^5\gamma^2.$

Ἐκ τούτων συνάγομεν τὸν ἐπόμενον κανόνα:

Ἴνα πολλαπλασιάσωμεν δύο ἀκεραία μονώνυμα, πολλαπλασιάζομεν πρῶτον τοὺς συντελεστὰς αὐτῶν, ἔπειτα γράφομεν πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου τῶν συντελεστῶν πάντα τὰ ἐν τοῖς μονωνύμοις ὑπάρχοντα γράμματα καὶ ἕκαστον μετ' ἐκθέτου ἴσου πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν, οὓς ἔχει ἐν τοῖς μονωνύμοις.

Ἐὰν ἐν τῶν μονωνύμων δὲν ἔχη γράμμα τι, ὑποτίθεται ἔχον αὐτὸ εἰς τὴν δύναμιν 0 (72).

Ὁ αὐτὸς δὲ κανὼν δίδει προδήλως καὶ τὸ γινόμενον ὁσωνδήποτε μονωνύμων· διότι πρὸς εὐρεσιν τοῦ γινομένου τούτου ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιασθῶσι τὰ δύο πρῶτα, ἔπειτα τὸ εὐρεθὲν γινόμενον ἐπὶ τὸ τρίτον καὶ οὕτω καθεξῆς.

87. Τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰρημένα εὐρισχόμενον γινόμενον δύο μο-



νωνύμων ἔχει πρὸ αὐτοῦ τὸ σημεῖον +, ἐὰν οἱ παράγοντες εἶναι ὁμοίω-  
σημοι, τὸ δὲ —, ἐὰν ἑτερόσημοι· τουτέστιν

Ἐν τῷ πολλαπλασιασμῷ τῶν μονωνύμων τὰ ὅμοια σημεῖα δίδουσι  
+, τὰ δὲ ἀνόμοια —.

Ἡ πρότασις αὕτη ἐκφράζει τὸν λεγόμενον κανόνα τῶν σημείων.

### β.) Πολλαπλασιασμός τῶν ἀκεραίων πολυωνύμων.

88. Πολλαπλασιασμός πολυωνύμου ἐπὶ πολυώνυμον (ἢ ἐπὶ μονώ-  
νυμον) εἶναι ἡ εὗρεσις πολυωνύμου ἴσου πρὸς τὸ γινόμενον αὐτῶν.

Ἐπειδὴ πᾶν πολυώνυμον εἶναι ἄθροισμα τῶν ὄρων αὐτοῦ, ἔπεται, ὅτι

Πολυώνυμον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ μονώνυμον, ἐὰν πολλαπλασια-  
σθῇ ἕκαστος τῶν ὄρων τοῦ πολυωνύμου ἐπὶ τὸ μονώνυμον καὶ προστε-  
θῶσι τὰ προκύπτοντα μονώνυμα.

Πολυώνυμον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ πολυώνυμον, ἐὰν ἕκαστος τῶν  
ὄρων τοῦ πολλαπλασιαστέου πολλαπλασιασθῇ ἐφ' ἕκαστον τῶν ὄρων  
τοῦ πολλαπλασιαστοῦ καὶ προστεθῶσι τὰ προκύπτοντα μονώνυμα.

Ὡστε ὁ πολλαπλασιασμός τῶν πολυωνύμων ἀνάγεται πάντοτε εἰς  
τὸν πολλαπλασιασμόν τῶν μονωνύμων.

### Παραδείγματα.

1) Τὸ γινόμενον  $(\alpha + \beta) \cdot (\alpha + \beta)$  κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰρημένα ἰσοῦται  
τῷ πολυωνύμῳ  $\alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \beta + \beta \cdot \alpha + \beta \cdot \beta$   
ἢτοι  $\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$ .

Ἐπειδὴ δὲ τὸ γινόμενον  $(\alpha + \beta) \cdot (\alpha + \beta)$  εἶναι ἡ δευτέρα δύναμις τοῦ  
ἄθροίσματος  $(\alpha + \beta)$  καὶ γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς:  $(\alpha + \beta)^2$ , συνάγομεν τὴν  
ἰσότητα  $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$ ,

ἣτις ἐκφράζει τὴν ἐπομένην πρότασιν.

Τὸ τετραγώνον τοῦ ἄθροίσματος δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν ἀποτε-  
λεῖται ἐκ τῶν τετραγώνων αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ διπλασίου γινομένου  
αὐτῶν.

2) Τὸ γινόμενον  $(\alpha - \beta) \cdot (\alpha - \beta)$  ἰσοῦται τῷ πολυωνύμῳ  
 $\alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot (-\beta) + (-\beta) \cdot \alpha + (-\beta) \cdot (-\beta)$   
ἢτοι  $\alpha \cdot \alpha - \alpha \cdot \beta - \beta \cdot \alpha + \beta \cdot \beta$   
ἢ  $\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2$ .

Ἐπειδὴ δὲ τὸ γινόμενον  $(\alpha - \beta) \cdot (\alpha - \beta)$  εἶναι ἡ δευτέρα δύναμις τῆς  
διαφορᾶς  $(\alpha - \beta)$  καὶ γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς:  $(\alpha - \beta)^2$ , συνάγομεν τὴν

ισότητα  $(\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2,$

ἥτις ἐκφράζει τὴν ἐπομένην πρότασιν.

Τὸ τετράγωνον τῆς διαφορᾶς δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν ἀποτελεῖται ἐκ τῶν τετραγώνων αὐτῶν πλην τοῦ διπλασίου γινομένου αὐτῶν.

3) Τὸ γινόμενον  $(\alpha + \beta) \cdot (\alpha - \beta)$  ἰσοῦται τῷ πολυωνύμῳ  
 $\alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \beta - \beta \cdot \alpha - \beta \cdot \beta.$  ἥτοι τῷ  $\alpha^2 - \beta^2,$

ὅθεν ἔχομεν τὴν ἰσότητα  $(\alpha + \beta) (\alpha - \beta) = \alpha^2 - \beta^2,$   
 τουτέστι τὸ ἄθροισμα δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν ἐπὶ τὴν διαφορὰν αὐ-  
 τῶν πολλαπλασιασθὲν δίδει τὴν διαφορὰν τῶν τετραγώνων αὐτῶν.

Τὰ τρία ταῦτα γινόμενα ἀπαντῶσι συχνότατα ἐν τῇ ἀλγέβρᾳ.  
 Ἐπὶ πολυπλοκωτέρων παραδειγμάτων διατίθεται ἡ πράξις ὡς ἔπεται.

4) Εὐρεῖν τὸ γινόμενον τῶν δύο πολυωνύμων

$\chi^3 - 3\chi^2 - 5\chi + 6$  καὶ  $\chi^2 + 8\chi - 5$

$$\begin{array}{r} \chi^3 - 3\chi^2 - 5\chi + 6 \\ \chi^2 + 8\chi - 5 \\ \hline \chi^5 - 3\chi^4 - 5\chi^3 + 6\chi^2 \\ + 8\chi^4 - 24\chi^3 - 40\chi^2 + 48\chi \\ - 5\chi^3 + 15\chi^2 + 25\chi - 30 \\ \hline \chi^5 + 5\chi^4 - 34\chi^3 - 19\chi^2 + 73\chi - 30. \end{array}$$

Οἱ ὅροι ἑκατέρου τῶν δοθέντων πολυωνύμων εἶναι γεγραμμένοι κατὰ  
 τοιαύτην σειρὰν, ὥστε οἱ ἐκθέται τοῦ γράμματος  $\chi$  ἐλαττοῦνται ἀπὸ  
 ὅρου εἰς ὅρον (ὅταν δὲ τοῦτο συμβαίνει εἰς πολυώνυμον, λέγεται, ὅτι  
 τὸ πολυώνυμον εἶναι διατεταγμένον κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ  
 γράμματος). Ὑπὸ τὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν, ἣν σύρομεν ὑποκάτω τῶν  
 δύο πολυωνύμων, γράφομεν εἰς μίαν σειρὰν τὰ γινόμενα τοῦ πρώτου  
 ὅρου τοῦ πολλαπλασιαστοῦ ( $\chi^2$ ) ἐπὶ τοὺς ὅρους τοῦ πολλαπλασιαστοῦ.  
 ἔπειτα εἰς δευτέραν σειρὰν τὰ γινόμενα τοῦ δευτέρου ὅρου ( $+8\chi$ ), καὶ  
 εἰς τρίτην τὰ τοῦ τρίτου ( $-5$ ), γράφονται δὲ τὰ μερικὰ ταῦτα γινό-  
 μενα οὕτως, ὥστε οἱ τὴν αὐτὴν δυνάμιν τοῦ γράμματος  $\chi$  ἔχοντες ὅροι  
 νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην· τέλος ὑπὸ τὴν  
 δευτέραν ὀριζοντίαν γραμμὴν γράφεται τὸ ἐκ πάντων τῶν μερικῶν γι-  
 νομένων μετὰ τὴν πρόσθεσιν τῶν ὁμοίων ὅρων ἀποτελούμενον πολυώ-  
 νυμον, ὅπερ εἶναι τὸ γινόμενον τῶν δοθέντων.

5) Εὐρεῖν τὸ γινόμενον τῶν δύο πολυωνύμων

$$\begin{array}{r}
 3-2\alpha+4\alpha^2 \qquad \qquad \text{καὶ} \qquad 8+5\alpha-\alpha^2 \\
 3-2\alpha+4\alpha^2 \\
 8+5\alpha-\alpha^2 \\
 \hline
 24-16\alpha+32\alpha^2 \\
 15\alpha-10\alpha^2+20\alpha^3 \\
 \quad -3\alpha^2+2\alpha^3-4\alpha^4 \\
 \hline
 24-\alpha+19\alpha^2+22\alpha^3-4\alpha^4.
 \end{array}$$

Ἐνκαῦθα οἱ ὄροι τῶν δύο πολυωνύμων ἐγράφησαν κατὰ τοιαύτην τάξιν, ὥστε νὰ ἀυξάνωσιν οἱ ἐκθέται τοῦ γράμματος  $\alpha$  ἀπὸ ὄρου εἰς ὄρον· ἤτοι τὰ πολυώνυμα διετάχθησαν ἀμφοτέρω κατὰ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις τοῦ γράμματος  $\alpha$ · κατὰ τὰ ἄλλα ἢ πρᾶξις ἐγένετο ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ παραδείγματι.

6) Εὐρεῖν τὸ γινόμενον τῶν δύο πολυωνύμων

$$\begin{array}{r}
 \alpha^2\chi^2+\alpha\chi^3+\alpha^3\chi+\alpha^4+\chi^4 \qquad \qquad \chi-\alpha \\
 \chi^4+\alpha\chi^3+\alpha^2\chi^2+\alpha^3\chi+\alpha^4 \\
 \chi-x \\
 \hline
 \chi^5+\alpha\chi^4+\alpha^2\chi^3+\alpha^3\chi^2+\alpha^4\chi \\
 -x\chi^4-\alpha^2\chi^3-\alpha^3\chi^2-\alpha^4\chi-\alpha^5 \\
 \hline
 \chi^5-\alpha^5.
 \end{array}$$

7) Εὐρεῖν τὸν κύβον τοῦ  $(\alpha+\beta)$ , ἤτοι τὸ γινόμενον  $(\alpha+\beta) \cdot (\alpha+\beta) \cdot (\alpha+\beta)$ .

Τὸ γινόμενον τῶν δύο πρώτων παραγόντων ἰσοῦται τῷ

$$\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2.$$

ὥστε πρέπει νὰ εὐρεθῇ τὸ γινόμενον  $(\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2) \cdot (\alpha+\beta)$

$$\begin{array}{r}
 \alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2 \\
 \alpha+\beta \\
 \hline
 \alpha^3+2\alpha^2\beta+\alpha\beta^2 \\
 +\alpha^2\beta+2\alpha\beta^2+\beta^3 \\
 \hline
 \alpha^3+3\alpha^2\beta+3\alpha\beta^2+\beta^3
 \end{array}$$

Ἐκ τῶν παραδειγμάτων τούτων γίνεται καταφανές, ὅτι διὰ τῆς διατάξεως τῶν πολυωνύμων κατὰ τὰς κατιούσας ἢ κατὰ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις ἑνὸς γράμματος ἢ εὐρεσις τῶν ὁμοίων ὄρων τοῦ γινομένου καὶ ἡ πρόσθεσις αὐτῶν γίνεται εὐκολώτερον.

89. Ἐκ τοῦ τρόπου, καθ' ὃν γίνεται ὁ πολλαπλασιασμός δύο πο-

λυωνύμων, βλέπομεν, ὅτι τὸ γινόμενον πρὸ τῆς ἀναγωγῆς ἔχει τόσους ὅρους, ὅσας μονάδας ἔχει τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν, δι' ὧν μετρεῖται τὸ πλῆθος τῶν ὄρων τῶν πολυωνύμων· ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναγωγῆς δύναται τὸ πλῆθος τῶν ὄρων τοῦ γινομένου νὰ καταστῇ μικρότερον.

Παρατηρητέον ὅμως, ὅτι ὑπάρχουσι πάντοτε ἐν τῷ γινομένῳ δύο ὅροι πρὸς οὐδένα ἄλλον ὅμοιοι καὶ ἐπομένως ἀμετάβλητοι διαμένοντες ἐν αὐτῷ.

Εἶναι δὲ οὗτοι τὸ γινόμενον τῶν πρώτων ὄρων τῶν πολυωνύμων καὶ τὸ γινόμενον τῶν τελευταίων, ὅταν τὰ πολυώνυμα εἶναι ὁμοίως διατεταγμένα κατὰ τὰς δυνάμεις ἑνὸς γράμματος.

Ἐν τῶντοι τὰ πολυώνυμα εἶναι διατεταγμένα κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἑνὸς γράμματος, οἱ πρώτοι ὅροι ἔχουσι τὰς μεγίστας δυνάμεις τοῦ γράμματος καὶ διὰ τοῦτο τὸ γινόμενον αὐτῶν θὰ ἔχη δύναμιν τοῦ αὐτοῦ γράμματος μεγαλύτεραν ἢ πάντα τὰ ἄλλα μερικὰ γινόμενα· ὁμοίως οἱ τελευταῖοι ὅροι ἔχουσι τὰς ἐλαχίστας δυνάμεις καὶ τὸ γινόμενον αὐτῶν ἔχει διὰ τοῦτο μικρότεραν δύναμιν τοῦ γράμματος τῆς διατάξεως ἢ πάντα τὰ ἄλλα γινόμενα· ἐπομένως οἱ δύο οὗτοι ὅροι τοῦ γινομένου οὐδένα ἔχουσιν ὅμοιον αὐτοῖς. Τοῦτο δύναται τις νὰ ἴδῃ εἰς πάντα τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα.

Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγεται, ὅτι τὸ γινόμενον δύο πολυωνύμων ἔχει τοῦλάχιστον δύο ὅρους. Ὅτι δὲ δύναται καὶ δύο μόνον νὰ ἔχη, ἐξαφανιζομένων πάντων τῶν λοιπῶν ἐν τῇ ἀναγωγῇ, δεικνύει τὸ 6<sup>ον</sup> παράδειγμα.

Ὁ βαθμὸς τοῦ γινομένου πρὸς γράμμα τι (78) ἰσοῦται τῷ ἀθροίσματι τῶν βαθμῶν τῶν παραγόντων πρὸς τὸ αὐτὸ γράμμα.

### Διαιρέσεις.

#### α.) Διαιρέσεις ἀκεραίων μονωνύμων.

90. Μονώνυμον ἀκεραῖον λέγεται διαιρετὸν δι' ἄλλου, ἐὰν ὑπάρχη ἀκεραῖον μονώνυμον ἴσον τῷ πηλίκῳ αὐτῶν.

Ἡ εὕρεσις τοῦ ἀκεραίου μονωνύμου πηλίκου λέγεται *διαίρεσις* τῶν μονωνύμων.

91. Ἴνα μονώνυμον εἶναι διαιρετὸν δι' ἄλλου, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ ἔχη πάντα τὰ γράμματα τὰ ἐν τῷ διαιρέτῃ ὑπάρχοντα καὶ ἕκαστον μετ' ἐκθέτου μὴ ἐλάσσονος.

Διότι ὁ διαιρέτης ἐπὶ τὸ ἀκεραῖον καὶ μονώνυμον πηλίκον πολλαπλα-

σιασθείς πρέπει νὰ δίδῃ τὸν διαιρετέον· περιέχονται ἄρα πάντα τὰ γράμματα τοῦ διαιρετέου ἐν τῷ διαιρετέῳ καὶ ἕκαστον μετ' ἐκθέτου οὐχὶ ἐλάσσονος.

92. Ἐκ τοῦ κανόνος, καθ' ὃν πολλαπλασιάζονται δύο μονώνυμα, εὐρίσκομεν εὐκόλως τὸν ἐπόμενον κανόνα τῆς διαιρέσεως τῶν μονωνύμων (ὑποθέτοντες τὸ ἐν διαιρετὸν διὰ τοῦ ἄλλου).

Ἴνα διαιρέσωμεν μονώνυμον δι' ἄλλου, διαιροῦμεν τὸν συντελεστὴν αὐτοῦ διὰ τοῦ συντελεστοῦ τοῦ διαιρετέου καὶ ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ ἐκθέτου ἐκάστου γράμματος αὐτοῦ τὸν ἐκθέτην τοῦ αὐτοῦ γράμματος τοῦ διαιρετέου.

Ἐὰν γράμμα τι δὲν ὑπάρχῃ ἐν τῷ διαιρετέῳ, ὑποτίθεται ὑπάρχον μὲ ἐκθέτην 0 (72).

Ἔστωσαν ὡς παράδειγμα τὰ μονώνυμα

$$40x^5\beta^2\gamma\delta^3, \quad 5\alpha\beta^2\delta.$$

Τὸ πηλίκον αὐτῶν, ὅπερ πκρίσταται διὰ τοῦ

$$\frac{40x^5\beta^2\gamma\delta^3}{5\alpha\beta^2\delta}, \quad \text{ἰσοῦται τῷ μονωνύμῳ } 8x^4\gamma\delta^2.$$

διότι τοῦτο πολλαπλασιασθέν ἐπὶ τὸν διαιρετέον δίδει τὸν διαιρετέον.

Κατὰ τὸν δοθέντα κανόνα ἔπρεπε νὰ γράψωμεν εἰς τὸ πηλίκον καὶ τὸν παράγοντα  $\beta^0$ . παρελείψαμεν ὅμως αὐτὸν ὡς ἴσον τῇ μονάδι.

Ὅμοίως εὐρίσκομεν, ὅτι

Τὸ μονώνυμον  $-15\alpha^3\beta\gamma\delta^5$ , διὰ τοῦ  $7\alpha\beta\delta^3$  διαιρεθέν, δίδει πηλίκον τὸ μονώνυμον  $-\frac{15}{7}\alpha^2\gamma\delta^2$ .

Καὶ τὸ μονώνυμον  $-20\alpha\beta\gamma^3$  διὰ τοῦ  $-5\alpha\beta\gamma$  διαιρεθέν, δίδει πηλίκον τὸ  $4\gamma^2$ .

ἐξ ὧν βλέπομεν, ὅτι καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῶν μονωνύμων ὁ αὐτὸς κανὼν τῶν σημείων διατηρεῖται· ἥτοι ἐξ ὁμοίων σημείων προκύπτει +, ἐξ ἀνομοίων δὲ —.

β'.) Διαίρεσις πολυωνύμου διὰ μονωνύμου, ἀμφοτέρων ὄντων ἀκεραίων.

93. Πολυώνυμον ἀκέραιον λέγεται διαιρετὸν διὰ μονωνύμου ἀκεραίου, ἐὰν ὑπάρχῃ ἀκέραιον πολυώνυμον ἴσον τῷ πηλίκῳ αὐτῶν· καὶ ἡ εὔρεσις τοῦ πολυωνύμου τούτου καὶ ἀκεραίου πηλίκου λέγεται διαίρεσις τοῦ πολυωνύμου διὰ τοῦ μονωνύμου.

94. Πολυώνυμον ἀκέραιον εἶναι διαιρετὸν διὰ μονωνύμου, ἐὰν πάν-  
τες οἱ ὄροι τοῦ πολυωνύμου εἶναι διαιρετοὶ διὰ τοῦ μονωνύμου (τὸ πο-  
λυώνυμον ὑποτίθεται ἄνευ ὁμοίων ὄρων) καὶ τότε μόνον.

Διότι οἱ ὄροι οὗτοι εἶναι γινόμενα τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τοὺς ὄρους τοῦ  
ἀκεραίου πολυωνύμου πηλίκου.

Ἔνα διαιρέσωμεν πολυώνυμον διὰ μονωνύμου, διαιροῦμεν ἕκαστον  
ὄρον τοῦ πολυωνύμου διὰ τοῦ μονωνύμου, καὶ προσθέτομεν τὰ προ-  
κύπτοντα πηλίκα.

Διότι τὸ πολυώνυμον εἶναι ἄθροισμα τῶν ὄρων αὐτοῦ· ἄθροισμα δὲ  
διαιρεῖται δι' ἀριθμοῦ, ἐὰν διακριθῇ ἕκαστον τῶν μερῶν αὐτοῦ χωριστὰ  
καὶ προστεθῶσι τὰ πηλίκα.

Παραδείγματος χάριν, τὸ πολυώνυμον

$$4x^2\beta^3 - 8x^3\beta^2 + 12x\beta^4 \quad \text{διὰ τοῦ } 2\alpha\beta^2 \text{ διαιρεθὲν}$$

$$\text{δίδει πηλίκον τὸ} \quad 2\alpha\beta - 4x^2 + 6\beta^2.$$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ. Ὅταν πάντες οἱ ὄροι πολυωνύμου εἶναι διαιρετοὶ διὰ  
μονωνύμου τινός, τὸ πολυώνυμον παρίσταται ὡς γινόμενον τοῦ μονωνύ-  
μου ἐπὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ τοῦ μονωνύμου.

Τοῦ πολυωνύμου  $12x^2\beta^4 - 6x^3\beta^3 + 4x^4\beta^2$  πάντες οἱ ὄροι εἶναι διαιρε-  
τοὶ διὰ τοῦ  $2x^2\beta^2$ , ἐπομένως καὶ αὐτὸ τὸ πολυώνυμον εἶναι διαιρετὸν διὰ  
τοῦ  $2x^2\beta^2$ . ἐπειδὴ δὲ τὸ πηλίκον εἶναι:  $6\beta^2 - 3\alpha\beta + 2\alpha^2$ ,  
συνάγομεν, ὅτι τὸ αὐτὸ πολυώνυμον γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς·

$$(6\beta^2 - 3\alpha\beta + 2\alpha^2)2x^2\beta^2.$$

Ὅτανεῖς πολυώνυμον γίνηται τοῦτο, λέγομεν, ὅτι ἐξάγονται οἱ κοι-  
νοὶ τῶν ὄρων παράγοντες ἐκτὸς τῆς παρενθέσεως.

γ'.) Διαιρέσεις πολυωνύμου διὰ πολυωνύμου, ἀμφοτέρων  
ὄντων ἀκεραίων.

95. Πολυώνυμον λέγεται διαιρετὸν δι' ἄλλου, ἐὰν ὑπάρχη πολυώ-  
νυμον (ἢ μονώνυμον) ἀκέραιον ἴσον τῷ πηλίκῳ αὐτῶν.

Ἡ εὕρεσις τοῦ πολυωνύμου τούτου λέγεται διαιρέσεις τῶν δύο πολυω-  
νύμων στηρίζεται δὲ ἡ πράξις αὕτη ἐπὶ τῶν ἐπομένων δύο θεωρημάτων.

1) Ἐὰν δύο πολυώνυμα εἶναι διατεταγμένα ἀμφοτέρω κατὰ τὰς  
ἀνιούσας ἢ ἀμφοτέρω κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματος,  
ὁ πρῶτος ὄρος τοῦ πηλίκου αὐτῶν (ἐὰν ὑποτεθῇ ὑπάρχον καὶ ὁμοίως  
διατεταγμένον) εὐρίσκεται ἐκ τῆς διαιρέσεως τῶν πρώτων ὄρων τῶν  
πολυωνύμων.

Ἐστω διαιρετέος μὲν τὸ πολυώνυμον

$$\Delta + \Delta' + \Delta'' + \dots$$

διαιρέτης δὲ τὸ

$$\delta + \delta' + \delta'' + \dots$$

πηλίκον δὲ τὸ

$$\Pi + \Pi' + \Pi'' + \dots$$

τότε θὰ εἶναι  $\Delta + \Delta' + \Delta'' + \dots = (\delta + \delta' + \delta'' \dots) (\Pi + \Pi' + \Pi'' + \dots)$

Τοὺς ὅρους τῶν τριῶν τούτων πολυωνύμων ὑποθέτω διατεταγμένους κατὰ τὰς δυνάμεις ἑνὸς γράμματος  $\alpha$  (ἢ ὄλων κατὰ τὰς ἀνιούσας ἢ ὄλων κατὰ τὰς κατιούσας). παριστῶ δὲ ἕκαστον ὅρον δι' ἑνὸς μόνου γράμματος χάριν συντομίας.

Ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν δύο πολυωνύμων  $(\delta + \delta' + \delta'' + \dots) \cdot (\Pi + \Pi' + \Pi'' + \dots)$ , ἐπειδὴ τὰ πολυώνυμα ταῦτα εἶναι ὁμοίως διατεταγμένα, οἱ πρῶτοι ὅροι αὐτῶν θὰ δώσωσι γινόμενον τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ γινομένου (ἐδ. 89), ἄρα εἶναι  $\Delta = \delta \cdot \Pi$ . ἐπομένως καὶ  $\Pi = \frac{\Delta}{\delta}$ . τοῦτο δὲ ἐπρόκειτο νὰ ἀποδείξωμεν.

2) Ἐὰν ὁ διαιρέτης πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸν εὐρεθέντα πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου καὶ ἀφαιρεθῇ τὸ γινόμενον ἀπὸ τοῦ διαιρέτου, εὐρίσκεται ὑπόλοιπον, ὅπερ διαιρούμενον διὰ τοῦ διαιρέτου θὰ δώσῃ πάντας τοὺς ἄλλους ὅρους τοῦ πηλίκου.

Διότι ὁ διαιρετέος εἶναι γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸ πηλίκον· ἴτοι ἀποτελεῖται ἐκ τῶν γινομένων τοῦ διαιρέτου ἐπὶ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ πηλίκου. ἂν λοιπὸν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ διαιρέτου τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐφ' ἑνα ὅρον τοῦ πηλίκου, τὸ ὑπόλοιπον θὰ εἶναι γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τοὺς λοιποὺς ὅρους τοῦ πηλίκου, ἴτοι ἐπὶ τὸ ἐκ τῶν λοιπῶν ὄρων τοῦ πηλίκου ἀποτελούμενον πολυώνυμον· ἐπομένως τὸ πολυώνυμον τοῦτο εἶναι πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ὑπολοίπου διὰ τοῦ διαιρέτου.

Ἐπὶ τῶν δύο τούτων θεωρημάτων στηριζόμενοι εὐρίσκομεν τὸ πηλίκον δύο πολυωνύμων (ὅταν ὑπάρχη), διότι διὰ μὲν τοῦ πρώτου εὐρίσκομεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου, διὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἀνάγεται ἡ εὐρεσις τῶν λοιπῶν εἰς νέαν τινὰ διαίρεσιν. Ἐὰν δὲ καὶ εἰς τὴν νέαν τυχύτην διαίρεσιν ἐφαρμόσωμεν τὸ πρῶτον θεώρημα, εὐρίσκομεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου αὐτῆς (τουτέστι τὸν δεύτερον ὅρον τοῦ ζητουμένου πηλίκου), ἡ δὲ εὐρεσις τῶν λοιπῶν ἀνάγεται καὶ πάλιν (δυνάμει τοῦ δευτέρου θεωρήματος) εἰς τρίτην τινὰ διαίρεσιν· καὶ οὕτω κθεξῆς. Φανερόν δὲ ὅτι, ὅταν ὑπάρχη πολυώνυμον πηλίκον, μίξ τῶν

μερικῶν τούτων διαιρέσεων, εἰς ἃς ἀνάγεται ἢ ἐξ ἀρχῆς δοθεῖσα, θὰ δώσῃ τὸν τελευταῖον ὅρον τοῦ πηλίκου καὶ θὰ ἀφήσῃ ὑπόλοιπον 0.

Παρατηρητέον δέ, ὅτι ἡ διαίρεσις τῶν πολυωνύμων ἀνάγεται οὕτως εἰς τὴν διαίρεσιν μονωνύμων· διότι εἰς ἐκάστην μερικὴν διαίρεσιν μόνον οἱ πρῶτοι ὅροι λαμβάνονται.

Ἡ διάταξις τῆς πράξεως φαίνεται ἐκ τῶν ἐπομένων παραδειγμάτων.

$$1) \text{ Νὰ διαιρεθῇ τὸ πολυώνυμον } 8\chi^3 - 22\chi^2 + 17\chi - 3 \\ \text{διὰ τοῦ } 4\chi - 1.$$

$$\begin{array}{r|l} 8\chi^3 - 22\chi^2 + 17\chi - 3 & 4\chi - 1 \\ - 8\chi^3 + 2\chi^2 & \hline \hline - 20\chi^2 + 17\chi - 3 & \\ + 20\chi^2 - 5\chi & \hline \hline + 12\chi - 3 & \\ - 12\chi + 3 & \hline \hline 0 & \end{array}$$

Τὰ πολυώνυμα εἶναι διατεταγμένα κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ  $\chi$ · μετὰ τὴν εὑρεσιν τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ πηλίκου ( $2\chi^2$ ) πολλαπλασιάζεται οὗτος ἐπὶ τὸν διαιρέτην καὶ οἱ ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ προκύπτοντες ὅροι, ἐπειδὴ πρέπει νὰ ἀφαιρεθῶσιν ἀπὸ τοῦ διαιρετέου, γράφονται ὑπ' αὐτὸν μετ' ἐναντίων σημείων καὶ προστίθενται εἰς αὐτόν. Τὸ δὲ ἐκ τῆς προσθέσεως μετὰ τὴν ἀναγωγὴν προκύπτον πολυώνυμον  $-20\chi^2 + 17\chi - 3$  θεωρεῖται νῦν ὡς νέος διαιρετέος, ἐφ' οὗ ποιοῦμεν πάλιν τὰ αὐτὰ καὶ εὐρίσκομεν τὸν δεῦτερον ὅρον τοῦ πηλίκου ( $-5\chi$ ) καὶ τὸ δεῦτερον ὑπόλοιπον  $12\chi - 3$ · θεωροῦντες καὶ τοῦτο ὡς νέον διαιρετέον καὶ ποιοῦντες καὶ ἐπ' αὐτοῦ τὰ αὐτὰ, εὐρίσκομεν τὸν τρίτον ὅρον τοῦ πηλίκου ( $+3$ ) καὶ ὑπόλοιπον 0· ὥστε τὸ ζητούμενον πηλίκον εἶναι

$$2\chi^2 - 5\chi + 3.$$

$$2) \text{ Νὰ διαιρεθῇ τὸ πολυώνυμον}$$

$$3\chi^5 + 5\alpha\chi^4 - 9\alpha^2\chi^3 - 12\alpha^3\chi^2 + 8\alpha^4\chi + 5\alpha^5$$

$$\text{διὰ τοῦ } \chi^3 + \alpha\chi^2 - 2\alpha^2\chi - \alpha^3.$$

$$\begin{array}{r|l} 3\chi^5 + 5\alpha\chi^4 - 9\alpha^2\chi^3 - 12\alpha^3\chi^2 + 8\alpha^4\chi + 5\alpha^5 & \chi^3 + \alpha\chi^2 - 2\alpha^2\chi - \alpha^3 \\ - 3\chi^5 - 3\alpha\chi^4 + 6\alpha^2\chi^3 + 3\alpha^3\chi^2 & \hline \hline 2\alpha\chi^4 - 3\alpha^2\chi^3 - 9\alpha^3\chi^2 + 8\alpha^4\chi + 5\alpha^5 & \\ - 2\alpha\chi^4 - 2\alpha^2\chi^3 + 4\alpha^3\chi^2 + 2\alpha^4\chi & \hline \hline - 5\alpha^2\chi^3 - 5\alpha^3\chi^2 + 10\alpha^4\chi + 5\alpha^5 & \\ + 5\alpha^2\chi^3 + 5\alpha^3\chi^2 - 10\alpha^4\chi - 5\alpha^5 & \hline \hline 0 & \end{array}$$



96. Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγεται ὁ ἐπόμενος κανὼν τῆς διαιρέσεως τῶν ἀκεραίων πολυωνύμων.

Ἔνα διαιρέσωμεν πολυώνυμον δι' ἑτέρου πολυωνύμου, διατάσσομεν ἀμφότερα κατὰ τὰς ἀνιούσας ἢ ἀμφοτέρω κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματος, καὶ διαιροῦμεν τοὺς πρώτους ὅρους αὐτῶν, ἐξ ὧν εὐρίσκομεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου· ἔπειτα ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ διαιρετέου τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εὐρίσκομεν ὑπόλοιπόν τι· μετὰ δὲ ταῦτα θεωροῦμεν τὸ ὑπόλοιπον τοῦτο ὡς νέον διαιρετέον καὶ ποιοῦμεν ἐπ' αὐτοῦ ὅσα καὶ ἐπὶ τοῦ πρώτου διαιρετέου, ὅτε εὐρίσκομεν τὸν δεύτερον ὅρον τοῦ πηλίκου καὶ ὑπόλοιπόν τι. Θεωροῦμεν πάλιν καὶ τοῦτο ὡς νέον διαιρετέον, καὶ ἐξακολουθοῦμεν τοιοῦτοιτρόπως, μέχρις οὗ φθάσωμεν εἰς ὑπόλοιπον 0 ὅπερ θὰ συμβῆῃ μετὰ τινος πράξεως, ἐὰν τὸ δοθὲν πολυώνυμον εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ ἑτέρου.

97. Ἐπειδὴ οἱ ὅροι τοῦ πηλίκου εὐρίσκονται ἐκ τοῦ διαιρετέου καὶ ἐκ τῶν διαδοχικῶν ὑπολοίπων, διαιρουμένων τῶν πρώτων ὅρων αὐτῶν διὰ τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ διαιρέτου, ἔπεται, ὅτι ἡ διαίρεσις δύο πολυωνύμων δὲν δύναται νὰ περατωθῆ, ἤτοι τὸ πολυώνυμον τὸ ἀποτελοῦν τὸν διαιρετέον δὲν εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ διαιρέτου, 1) ἐὰν ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ διαιρέτου δὲν διαιρῆ τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ διαιρετέου, ἢ τὸν πρῶτον ὅρον τινὸς ἐκ τῶν ὑπολοίπων· καὶ 2) ἐὰν διαιρῆ μὲν πάντας τούτους, ἀλλ' οὐδέποτε εὐρίσκηται ὑπόλοιπον 0· ὡς συμβαίνει ἐν τῇ ἐπομένῃ διαιρέσει.

$$\begin{array}{r}
 \chi + \chi^2 \\
 - \chi + \chi^2 \\
 \hline
 2\chi^2 \\
 - 2\chi^2 + 2\chi^3 \\
 \hline
 + 2\chi^3 \\
 \dots
 \end{array}
 \quad \Bigg| \quad
 \begin{array}{r}
 \chi - \chi^2 \\
 1 + 2\chi + \dots
 \end{array}$$

Ἐπειδὴ πάντα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι μονώνυμα, τὰ δὲ γινόμενα τοῦ διαιρέτου ἐπὶ ἕνα ἕκαστον τῶν ὅρων τοῦ πηλίκου εἶναι διώνυμα, φανερόν εἶναι, ὅτι οὐδέποτε θὰ εὐρεθῆ ὑπόλοιπον 0.

Παρατηρητέον ὁμῶς, ὅτι ἡ εἰς ἀπειρον ἐξακολούθησις τῆς διαιρέσεως εἶναι ἀδύνατος, ὅταν τὰ πολυώνυμα εἶναι διατεταγμένα κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματος· διότι τότε ὁ βαθμὸς τῶν ὑπολοίπων πρὸς τὸ γράμμα τῆς διατάξεως προβαίνει ἐλαττούμενος (διότι ἐν ἑκάστη

διαίρεσει ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ διαιρετέου δὲν ὑπάρχει ἐν τῷ ὑπολοίπῳ), κατέπομένως μετὰ τινος πράξεως, ἐν δὲν φηάτωμεν εἰς ὑπόλοιπον 0, θὰ φηάτωμεν εἰς ὑπόλοιπον βηθμοῦ κατωτέρου ἢ ὁ διαιρέτης, ὅτε ἡ διαίρεσις διακόπτεται· διὰ τοῦτο προτιμότερον εἶναι ἐν τῇ διαίρεσει νὰ διατάσσωμεν τὰ πολυώνυμα κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματος.

ΣΗΜ. Α'. Ἐὰν τὸ πηλίκον διαίρεσεώς τινος ἔχη δύο μόνον ὅρους, οἱ ὅροι οὗτοι εὐρίσκονται ἀμέσως, ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς διαίρεσεως τῶν πρώτων ὄρων, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς διαίρεσεως τῶν τελευταίων.

Οὕτω π. χ. ἐν τῇ διαίρεσει

$$\chi^3 - \chi^2 - 11\chi + 3 \quad \Big| \quad \chi^2 - 4\chi + 1$$

τὸ πηλίκον δύο μόνον ὅρους δύναται νὰ ἔχη· διότι ὁ μὲν πρῶτος ὅρος αὐτοῦ εἶναι  $\chi$ , ὁ δὲ τελευταῖος  $+3$ · μεταξύ δὲ αὐτῶν οὐδεμία ἄλλη δύναμις τοῦ  $\chi$  ὑπάρχει· ὥστε τὸ πηλίκον, ἂν ὑπάρχη, θὰ εἶναι τὸ  $\chi + 3$ . Τοῦτο δὲ ἀληθῶς εἶναι τὸ πηλίκον· διότι πολλαπλασιασθὲν ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει τὸν διαιρετέον.

Ὁμοίως ἐν τῇ διαίρεσει

$$\chi^4 + 2\chi^3 - 5\chi^2 + 3\chi + 1 \quad \Big| \quad \chi^3 - 8\chi^2 + 8\chi - 1$$

τὸ πηλίκον μόνον τοὺς δύο ὅρους  $\chi - 1$  δύναται νὰ ἔχη· ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ  $\chi - 1$  πολλαπλασιασθὲν ἐπὶ τὸν διαιρέτην δὲν δίδει τὸν διαιρετέον, συνάγομεν, ὅτι ἡ προκειμένη διαίρεσις δὲν γίνεται.

ΣΗΜ. Β'. Ἐὰν ἐν πολυωνύμῳ αἱ δυνάμεις τοῦ γράμματος τῆς διατάξεως εὐρίσκωνται πολλαπλασιασμένοι οὐχὶ ἐπὶ ἀριθμούς ἢ ἐπὶ μονώνυμα, ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέρω παραδείγμασι συνέβαιεν, ἀλλ' ἐπὶ πολυώνυμα, ἡ διαίρεσις ἀποβάλλει ἐπιπικνωτέρα, ἀλλ' ἡ θεωρία αὐτῆς κατ' οὐδὲν μεταβάλλεται· μόνον οἱ πρῶτοι ὅροι, ἐκ τῆς διαίρεσεως τῶν ὑποίων εὐρίσκονται οἱ ὅροι τοῦ πηλίκου, εἶναι καὶ αὐτοὶ πολυώνυμα.

ΣΗΜ. Γ'. Διατάσσοντες τὰ πολυώνυμα πρὸς διάφορα γράμματα (ἂν ἔχωσιν), εὐρίσκομεν διὰ μιᾶς πολλοὺς ὅρους τοῦ πηλίκου.

Οἷον ἐν τῇ διαίρεσει

$$\chi^4 - 4\chi^3 + (3\beta^2 - 5\alpha^2)\chi^2 - 3\alpha\beta^2\chi + 2\beta^4 \quad \Big| \quad \chi^2 + \alpha\chi + \beta^2$$

ἂν μὲν πρὸς τὸ  $\chi$  διατάξωμεν, εὐρίσκομεν δύο ὅρους τοῦ πηλίκου, τοὺς  $\chi^2$  καὶ  $2\beta^2$ , ἂν δὲ πρὸς τὸ  $\alpha$ , εὐρίσκομεν, ὅτι τὸ πηλίκον πρέπει νὰ ἔχη τὸν ὅρον  $-5\alpha\chi$ · ὥστε τὸ πηλίκον ἔχει τοὺς ὅρους  $\chi^2 - 5\alpha\chi + 2\beta^2$ , ἐπειδὴ δὲ πολλαπλασιάζοντες τούτους ἐπὶ τὸν διαιρέτην εὐρίσκομεν τὸν διαιρετέον, συμπεραίνομεν, ὅτι ἐπερατώθη ἡ διαίρεσις.

\* Ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀκεραίου πολυωνύμου διὰ τοῦ  $\chi - \alpha$ .

98. Ἡ διαίρεσις ἀκεραίου πολυωνύμου, διατεταγμένου κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ  $\chi$ , διὰ τοῦ διωνύμου  $\chi - \alpha$ , δύναται νὰ παραταθῆ, μέχρις οὔ εὐρεθῆ ὑπόλοιπον βαθμοῦ πρὸς τὸ  $\chi$  μικροτέρου ἢ ὁ διαιρέτης, ἤτοι μὴ περιέχον τὸ  $\chi$ .

Εἰς τοῦτο στηριζόμενοι δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τὸ ὑπόλοιπον τοῦτο, χωρὶς νὰ διαιρέσωμεν, καὶ νὰ συμπεράνωμεν, πότε τὸ πολυώνυμον εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ  $\chi - \alpha$ .

Διότι παριστῶντες διὰ τοῦ  $\Phi$  τὸ διαιρετέον πολυώνυμον, διὰ τοῦ  $\Pi$  τὸ πηλίκον καὶ διὰ τοῦ  $\Upsilon$  τὸ ὑπόλοιπον, θὰ ἔχωμεν

$$\Phi = (\chi - \alpha) \cdot \Pi + \Upsilon.$$

Διότι ἐν τῇ ἐκτελέσει τῆς διαιρέσεως ἀφηρέθησαν ἀπὸ τῶν ὄρων τοῦ διαιρετέου τὰ γινόμενα τοῦ διαιρέτου ἐπὶ πάντας τοὺς ὄρους τοῦ πηλίκου· ἤτοι ἀφηρέθη ἀπὸ τοῦ διαιρετέου τὸ γινόμενον  $(\chi - \alpha) \cdot \Pi$  τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸ πηλίκον καὶ ἔμεινε τὸ ὑπόλοιπον  $\Upsilon$ . ὥστε σύγκριται ὁ διαιρετέος ἐκ τοῦ ὑπολοίπου τούτου καὶ ἐκ τοῦ γινομένου  $(\chi - \alpha) \cdot \Pi$ . ἀληθεύει δὲ τοῦτο προδήλως οἷας δῆποτε τιμὰς καὶ ἀν ἔχωσι τὰ γράμματα  $\chi$  καὶ  $\alpha$ . Ἄλλ' ἐὰν ὑποτεθῆ  $\chi = \alpha$  ἐν τῇ ἰσότητι, τὸ μὲν γινόμενον  $(\chi - \alpha) \cdot \Pi$  μηδενίζεται, ὡς μηδενιζομένου ἑνὸς τῶν παραγόντων αὐτοῦ, τὸ δὲ  $\Upsilon$  μένει ἀμετάβλητον· διότι δὲν περιέχει τὸ  $\chi$ . τὸ δὲ πολυώνυμον  $\Phi$  τρέπεται εἰς παράστασίν τινα μὴ ἔχουσαν τὸ  $\chi$ , ἣν σημειοῦμεν διὰ τοῦ  $\Phi_\alpha$ . εἶναι ἄρα

$$\Phi_\alpha = \Upsilon.$$

τουτέστι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως πολυωνύμου διὰ τοῦ  $\chi - \alpha$  εὐρίσκομεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ πολυωνύμου, ἐὰν ἀντὶ τοῦ  $\chi$  τεθῆ τὸ  $\alpha$ .

Ἐὰν ἄρα, ἀντικαθισταμένου τοῦ  $\chi$  ὑπὸ τοῦ  $\alpha$ , προκύπτῃ ἐκ τοῦ πολυωνύμου ἐξαγόμενον 0, συμπεραίνομεν, ὅτι τὸ πολυώνυμον εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ  $\chi - \alpha$ .

Κατὰ ταῦτα τὸ πολυώνυμον  $\chi^3 - 5\chi^2 + 2\chi - 1$  διὰ τοῦ  $\chi - \alpha$  διαιρούμενον δίδει ὑπόλοιπον, τὸ  $\alpha^3 - 5\alpha^2 + 2\alpha - 1$ .

Καὶ τὸ πολυώνυμον  $\chi^4 - 5\chi^3 + 2\chi - 10$  διαιρεῖται διὰ τοῦ  $\chi - 5$ , διότι μηδενίζεται, ὅταν ἐν αὐτῷ τεθῆ ἀντὶ τοῦ  $\chi$  ὁ 5.

Ὅμοίως δεικνύεται, ὅτι καὶ τὸ διώνυμον  $\chi^\mu - \alpha^\mu$  εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ  $\chi - \alpha$ . τὸ δὲ πηλίκον αὐτοῦ, διὰ τῆς διαιρέσεως εὐρισκόμενον, εἶναι

$$\chi^{\mu-1} + \alpha\chi^{\mu-2} + \alpha^2\chi^{\mu-3} + \dots + \alpha^{\mu-2}\chi + \alpha^{\mu-1}$$

πάντες οἱ ὅροι τοῦ πηλίκου τούτου ἔχουσι συντελεστὴν τὸ + 1, καὶ αἱ μὲν δυνάμεις τοῦ χ προβαίνουσιν ἐλαττούμεναι, τοῦ δὲ α τοῦναντίον ἀυξανόμεναι κατὰ μονάδα· ὥστε ὁ βαθμὸς ὄλων τῶν ὄρων πρὸς τὰ γράμματα χ καὶ α εἶναι ὁ αὐτὸς μ—1.

Ἄξιοσημείωτοι περιπτώσεις τῆς διαιρέσεως ταύτης εἶναι αἱ ἐξῆς·

$$\frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha - \beta} = \alpha + \beta, \quad \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta} = \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$$

### Κλασματικαὶ παραστάσεις ἢ ἀλγεβρικὰ κλάσματα.

99. Τὸ πηλίκον δύο οἰωνδήποτε ἀλγεβρικῶν παραστάσεων παρίσταται ὡς κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸν διαιρετέον, παρονομαστὴν δὲ τὸν διαιρέτην.

Φανερόν δέ, ὅτι αἱ οὕτω προκύπτουσαι κλασματικαὶ παραστάσεις, αἵτινες καὶ ἀλγεβρικὰ κλάσματα λέγονται, ἔχουσι πάσας τὰς γενικὰς ιδιότητες τῶν κλασμάτων· διότι καὶ ὁ ἀριθμητὴς καὶ ὁ παρονομαστὴς αὐτῶν, οἱ αἰδηδήποτε παραστάσεις καὶ ἂν εἶναι, παριστῶσιν ἀριθμούς τινας· ἐπὶ πάντων δὲ τῶν ἀριθμῶν ἀπεδείχθησαν ἰσχύουσαι αἱ ιδιότητες ἐκεῖνοι ὡς ἀκολουθήματα ἀναγκαῖα τῶν ἀρχικῶν ιδιοτήτων τῶν τεσσάρων πράξεων· ἐπομένως πᾶσαι αἱ ἀπλοποιήσεις καὶ αἱ πράξεις, αἱ ἐπὶ τῶν συνήθων κλασμάτων γινόμεναι, γίνονται καὶ ἐπὶ τούτων καὶ δι' αὐτῶν αἱ παραστάσεις τρέπονται ἢ μετασχηματίζονται εἰς ἄλλας ἴσας.

Ἔπονται παραδείγματά τινα μετασχηματισμῶν.

1) Τὸ πηλίκον τοῦ μονωνύμου  $3\alpha^2\beta\gamma$  διὰ τοῦ  $8\alpha\beta\gamma^2\delta$  εἶναι

$$\frac{3\alpha^2\beta\gamma}{8\alpha\beta\gamma^2\delta} \quad \text{ἢ ἀπλούστερον} \quad \frac{3\alpha}{8\gamma\delta}$$

2) Τὸ πηλίκον τῶν παραστάσεων

$$\frac{\gamma}{\chi - \alpha} - \frac{\gamma}{\chi + \alpha} \quad \text{διὰ} \quad 1 + \frac{\gamma^2}{\chi^2 - \alpha^2}$$

εἶναι

$$\frac{\frac{\gamma}{\chi - \alpha} - \frac{\gamma}{\chi + \alpha}}{1 + \frac{\gamma^2}{\chi^2 - \alpha^2}}$$

ἐὰν δὲ πολλαπλασιασθῶσιν ὁ ἀριθμητὴς καὶ ὁ παρονομαστὴς τοῦ κλάσματος τούτου ἐπὶ τὴν παράστασιν  $\chi^2 - \alpha^2$ , ἥτοι ἐπὶ

$$(\chi - \alpha)(\chi + \alpha), \quad \text{ὁ μὲν ἀριθμητὴς γίνεταί}$$

$$\frac{\gamma}{\chi-\alpha}(\chi-\alpha)(\chi+\alpha) - \frac{\gamma}{\chi+\alpha}(\chi+\alpha)(\chi-\alpha)$$

τουτέστι  $\gamma(\chi+\alpha) - \gamma(\chi-\alpha)$ , ήτοι  $2\alpha\gamma$ .

ό δε παρονομαστής γίνεται  $\chi^2 - \alpha^2 + \gamma^2$ . ώστε τὸ πηλίκον τῶν δοθεισῶν

παραστάσεων εἶναι 
$$\frac{2\alpha\gamma}{\chi^2 - \alpha^2 + \gamma^2}.$$

3.) Τὸ πηλίκον τοῦ πολυωνύμου  $\chi^5 - 2\chi^4 + 4\chi^3 - 8\chi^2 + 2\chi - 1$  διαιρουμένου διὰ τοῦ  $\chi^2 - 4$ , εἶναι

$$\frac{\chi^5 - 2\chi^4 + 4\chi^3 - 8\chi^2 + 2\chi - 1}{\chi^2 - 4}.$$

ἀλλ' ἐὰν διαιρεθῇ ὁ ἀριθμητὴς διὰ τοῦ παρονομαστοῦ, εὑρίσκεται πηλίκον τὸ  $\chi^3 - 2\chi^2 + 8\chi - 16$  καὶ ὑπόλοιπον  $34\chi - 65$ . ἐπομένως εἶναι

$$\chi^5 - 2\chi^4 + 4\chi^3 - 8\chi^2 + 2\chi - 1 = (\chi^2 - 4)(\chi^3 - 2\chi^2 + 8\chi - 16) + (34\chi - 65).$$

ὅθεν ἔπεται, ὅτι τὸ προκείμενον πηλίκον τῶν πολυωνύμων ἰσοῦται τῇ

παραστάσει 
$$\chi^3 - 2\chi^2 + 8\chi - 16 + \frac{34\chi - 65}{\chi^2 - 4}.$$

Ὁ μετασχηματισμὸς οὗτος τοῦ πηλίκου δύο πολυωνύμων δύναται πάντοτε νὰ ἐκτελεσθῇ, ἐὰν ὁ βαθμὸς τοῦ διαιρετέου δὲν εἶναι μικρότερος τοῦ βαθμοῦ τοῦ διαιρέτου.

4) Ἡ διαφορὰ 
$$\frac{\alpha}{\alpha - \beta} - \frac{\beta}{\alpha + \beta}$$

μετασχηματίζεται εἰς τὴν 
$$\frac{\alpha(\alpha + \beta)}{\alpha^2 - \beta^2} - \frac{\beta(\alpha - \beta)}{\alpha^2 - \beta^2}$$

ήτοι 
$$\frac{\alpha(\alpha + \beta) - \beta(\alpha - \beta)}{\alpha^2 - \beta^2} \quad \eta \quad \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2 - \beta^2}.$$

5) Ἐστω τὸ κλάσμα 
$$\frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2}.$$

Παρατηροῦντες, ὅτι ὁ μὲν ἀριθμητὴς εἶναι  $(\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$ , ὁ δὲ παρονομαστής εἶναι  $(\alpha - \beta)^2$ , γράφομεν αὐτὸ ὡς ἑξῆς:

$$\frac{(\alpha - \beta)(\alpha + \beta)}{(\alpha - \beta)(\alpha - \beta)}$$

ἢ ἑξαλειφόμενου τοῦ κοινῆ παράγοντος  $(\alpha - \beta)$

$$\frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta}.$$

6) Τοῦ κλάσματος  $\frac{8\alpha^4 - 16\alpha^3\beta + 8\alpha^2\beta^2}{3\alpha^2 - 3\beta^2}$

ὁ μὲν ἀριθμητὴς γράφεται  $8\alpha^2(\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2)$ , ἴσως  $8\alpha^2(\alpha - \beta)^2$ , ὁ δὲ παρονομαστὴς  $3(\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$ . ὅθεν τὸ κλάσμα ἀπλούστερον γίνεται

$$\frac{8\alpha^2(\alpha - \beta)}{3(\alpha + \beta)}$$

7) Τὸ ἄθροισμα τῶν κλασμάτων  $\frac{2\alpha}{\alpha + \beta} + \frac{2\beta}{\alpha - \beta} + \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2 - \beta^2}$

εὐρίσκεται, ἂν τραπῶσιν εἰς τὸν αὐτὸν παρονομαστήν· γίνεται δὲ κοινὸς παρονομαστὴς αὐτῶν ὁ  $\alpha^2 - \beta^2$ , διότι ἡ παράστασις αὕτη διαιρεῖται διὰ πάντων τῶν παρονομαστῶν· οὕτως εὐρίσκομεν

$$\frac{2\alpha(\alpha - \beta) + 2\beta(\alpha + \beta) + \alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2 - \beta^2}$$

ἢ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων  $3 \cdot \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2 - \beta^2}$ .

Ἐὰν οἱ παρονομασταὶ τῶν κλασμάτων εἶναι ἀκέραια πολυώνυμα, ὁ κοινὸς παρονομαστὴς, εἰς ὃν ἀνάγονται πάντα, εἶναι παράστασις διαιρετὴ διὰ πάντων τῶν παρονομαστῶν· τοιαύτη παράστασις εἶναι πάντοτε τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν, ἀλλ' ἐνίοτε ὑπάρχει καὶ ἄλλη ἀπλουστέρα τούτου.

8) Τὸ γινόμενον τῶν δύο κλασμάτων

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha^2 + \beta^2} \quad \frac{\alpha\beta}{\alpha^2 - \beta^2}$$

εἶναι  $\frac{(\alpha - \beta) \cdot \alpha\beta}{(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^2 - \beta^2)}$  ἢ  $\frac{(\alpha - \beta) \cdot \alpha\beta}{(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)}$

καὶ ἀπλούστερον  $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2)}$ .

### Ζητήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Εὐρεῖν τὴν διαφορὰν  $\frac{(\alpha + \beta)^2}{\alpha^3 - \beta^3} - \frac{\alpha - \beta}{\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2}$ .

Κοινὸς παρονομαστὴς τῶν κλασμάτων θὰ γίνῃ ὁ  $\alpha^3 - \beta^3$ .

2) Καταστήσαι τὴν παράστασιν

$$\frac{6\alpha\beta}{3\gamma - \delta} \left( \frac{\gamma + \delta}{4} - \frac{\delta}{3} \right) \text{ ἀπλουστέραν. } \left( \text{Ἄπ. } \frac{\alpha\beta}{2} \right).$$

3) Εύρεϊν τὴν διαφορὰν  $\frac{3\alpha}{\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2} - \frac{3}{\alpha+\beta}$

4) Ἀποδείξει τὴν ἀλήθειαν τῶν ἐπομένων ἰσοτήτων  
 $(\alpha-\beta)(\gamma-\delta) = (1+\alpha\gamma)(1+\beta\delta) - (1+\alpha\delta)(1+\beta\gamma)$   
 $(\alpha^2+\beta^2)(\alpha'^2+\beta'^2) - (\alpha\alpha'+\beta\beta')^2 = (\alpha\beta'-\alpha'\beta)^2$   
 $(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)(\alpha'^2+\beta'^2+\gamma'^2) - (\alpha\alpha'+\beta\beta'+\gamma\gamma')^2 =$   
 $= (\alpha\beta'-\alpha'\beta)^2 + (\beta\gamma'-\beta'\gamma)^2 + (\gamma\alpha'-\gamma'\alpha)^2$   
 $(\alpha^2+\beta^2)^2 = (\alpha^2-\beta^2)^2 + (2\alpha\beta)^2$   
 $(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)^2 = (\alpha^2-\beta^2-\gamma^2)^2 + (2\alpha\beta)^2 + (2\alpha\gamma)^2$

5) Διαίρεσαι  $\chi^{3\omega} - \psi^{3\omega}$  διὰ τοῦ  $\chi^\omega - \psi^\omega$ .

Ἐὰν θέσωμεν  $\chi^\omega = \alpha$  καὶ  $\psi^\omega = \beta$ , καταντῶμεν εἰς τὴν διαίρεσιν  
 $\alpha^3 - \beta^3$  διὰ τοῦ  $\alpha - \beta$ .

6) Πότε ἡ διαφορὰ  $\chi^\mu - \alpha^\mu$  διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ  $\chi^\nu - \alpha^\nu$ ;

7) Νὰ διαιρηθῇ τὸ διώνυμον  $\chi^5\psi^3 - \chi^3\psi^5$  διὰ τοῦ  $\chi - \psi$   
 (Ἀπ. πηλίκον  $\chi^3\psi^3(\chi + \psi)$ .)

8) Νὰ δειχθῇ ὅτι ἡ παράστασις

$$(\chi + \psi + \omega)^\nu - \chi^\nu - \psi^\nu - \omega^\nu$$

διαίρεται δι' ἐκάστου τῶν ἀθροισμάτων

$$\chi + \psi, \quad \psi + \omega, \quad \omega + \chi$$

ἐὰν ὁ  $\nu$  εἶναι περιττός.

9) Νὰ εὔρεθῇ τὸ λάθος εἰς τὴν ἐξῆς σειρὰν τῶν πράξεων, αἵτινες ἄγουσιν εἰς ἄτοπον ἐξαγόμενον.

Ἐστὼ  $\alpha = \beta$ , τότε θὰ εἶναι καὶ  $\alpha\beta = \beta^2$ .

προσέτι  $\alpha\beta - \alpha^2 = \beta^2 - \alpha^2$  ἤτοι  $\alpha(\beta - \alpha) = (\beta + \alpha)(\beta - \alpha)$ ,  
 ὅθεν ἐπεταί (ἂν διαιρέσωμεν ἀμφότερα τὰ ἴσα διὰ  $\beta - \alpha$ )  $\alpha = \beta + \alpha$   
 καὶ ἐπειδὴ  $\alpha = \beta$ , συνάγεται  $\alpha = 2\alpha$  ἢ καὶ  $1 = 2$ .

## ΒΙΒΛΙΟΝ Β΄.

### ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑΙ

#### Ὅρισμοί.

100. Τὰς ἰσότητες, ὧν τὰ μέλη ἔχουσι γράμματα, διακρίνομεν εἰς ταυτότητας καὶ εἰς ἐξισώσεις.

Καὶ ταυτότητα μὲν καλοῦμεν τὴν ἰσότητα, ἐὰν ἀληθεύῃ διὰ πάσας τὰς τιμὰς ἐκάστου τῶν γραμμάτων, τὰ ὅποια ἔχει· οἷκι εἶναι αἱ ἰσότητες

$$\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha, \quad (\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$$

καὶ πᾶσαι αἱ ἐν τοῖς προηγουμένοις εὐρεθεῖσαι.

Ἐξίσωσιν δὲ τὴν ἰσότητα, ἣτις ἀληθεύει, μόνον ὅταν τὸ γράμμα ἢ τὰ γράμματα λάβωσιν ἀρμοδίως τιμὰς· τοιαύτη εἶναι ἡ ἰσότης

$$2\chi = 4.$$

ἣτις ἀληθεύει, μόνον ὅταν τὸ γράμμα  $\chi$  ἀντικατασταθῇ ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 2.

Τὰ γράμματα τῆς ἐξίσωσης, ἀτινα πρέπει νὰ ἀντικατασταθῶσιν ὑπὸ ὀρισμένων ἀριθμῶν, ἵνα ἀληθεύσῃ ἡ ἰσότης, λέγονται ἄγνωστοι τῆς ἐξίσωσης. Οἱ δὲ ὀρισμένοι ἀριθμοί, οἵτινες ἀντικαθιστῶντες τοὺς ἀγνώστους ἐπαληθεύουσι τὴν ἐξίσωσιν, λέγονται τιμαὶ τῶν ἀγνώστων. Ἐὰν δὲ τοιοῦτοι ἀριθμοὶ δὲν ὑπάρχωσιν, ἡ ἐξίσωσις λέγεται ἀδύνατος.

Οἱ ἀγνωστοὶ παρίστανται συνήθως διὰ τῶν τελευταίων γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου  $\varphi$ ,  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$ .

Ἡ εὕρεσις τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων λέγεται λύσις τῆς ἐξίσωσης· εἶναι δὲ ἡ λύσις τῶν ἐξισώσεων τὸ κυριώτατον ἔργον τῆς ἀλγέβρας· διότι εἰς τοῦτο ἀνάγεται ἡ λύσις τῶν προβλημάτων.

Ἰσοδύναμοι λέγονται δύο ἐξισώσεις, ὅταν αἱ αὐταὶ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων ἐπαληθεύωσιν ἀμφοτέρως.

Ἐν τῇ λύσει ἐξίσωσης οἰασδῆποτε ἐπιτρέπεται πᾶσα μεταβολὴ αὐτῆς, ἐὰν ἄγῃ εἰς ἐξίσωσιν ἰσοδύναμον.



**Γενικαὶ ἰδιότητες τῶν ἐξισώσεων.**

101. **ΘΕΩΡΗΜΑ Α΄.** Ἐὰν προστεθῇ εἰς ἀμφοτέρω τὰ μέλη ἐξισώσεως ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς, προκύπτει ἐξίσωσις ἰσοδύναμος.

Ἐστω ὡς παράδειγμα ἡ ἐξίσωσις  $5\chi = 15$ .

Ἐὰν εἰς ἀμφοτέρω τὰ μέλη αὐτῆς προστεθῇ ὁ τυχὼν ἀριθμὸς  $\mu$ , προκύπτει ἡ ἐξίσωσις  $5\chi + \mu = 15 + \mu$ .

λέγω δέ, ὅτι αἱ ἐξισώσεις αὗται εἶναι ἰσοδύναμοι.

Διότι, ἂν ἀληθεύσῃ ποτὲ ἡ πρώτη (λαμβάνοντος τοῦ ἀγνώστου ἀρμοδίαν τιμὴν), ἦτοι ἂν τὰ δύο μέλη αὐτῆς γίνωσι δύο ἴσοι ἀριθμοί, θὰ μείνωσιν ἴσοι καὶ μετὰ τὴν προσθήκην τοῦ  $\mu$ . ἐπομένως θὰ ἀληθεύσῃ καὶ ἡ δευτέρα· καὶ τὴν ἀνάπκλιν, ἂν ἡ δευτέρα ἀληθεύσῃ, τὰ μέλη αὐτῆς θὰ μείνωσιν ἴσα καὶ μετὰ τὴν ἀφίρσιν τοῦ  $\mu$ . ἐπομένως θὰ ἀληθεύσῃ καὶ ἡ πρώτη· ὥστε αἱ ἐξισώσεις αὗται εἶναι ἰσοδύναμοι.

Ἐπειδὴ πᾶσα ἀφίρσιν ἀνάγεται εἰς πρόσθεσιν (62), ἔπεται, ὅτι καὶ ἂν ἀφαιρεθῇ ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν μελῶν ἐξισώσεως ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς, προκύπτει ἐξίσωσις ἰσοδύναμος.

Παραδείγματος χάριν ἡ ἐξίσωσις  $\chi^2 + \chi + 7 = \frac{\chi}{2} + \chi^2 + 12$

εἶναι ἰσοδύναμος τῇ  $\chi + 7 = \frac{\chi}{2} + 12$ ,

ἣν εὐρίσκομεν παραλείποντες ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τὸν ἀριθμὸν  $\chi^2$ .

**ΠΟΡΙΣΜΑ Α΄.** Ἐὰν ὁ πρόστιθέμενος ἀριθμὸς  $\mu$  εἶναι ἀντίθετος ὄρω τινὲ τῆς ἐξισώσεως, ὁ ὄρος οὗτος ἀφκνίζεται ἐκ τοῦ μέλους, ἐν ᾧ εὐρίσκετο, καὶ μεταβαίνει εἰς τὸ ἕτερον ἔχων ἐναντίον σημεῖον· ὁθεν

Δυνάμεθα νὰ μεταφέρωμεν ἀπὸ τοῦ ἐνὸς μέλους ἐξισώσεως ὄρον τινὰ εἰς τὸ ἕτερον, ἀρκεῖ νὰ ἀλλάξωμεν τὸ σημεῖον αὐτοῦ.

Ἐστω ὡς παράδειγμα ἡ ἐξίσωσις  $3\chi - 7 = \frac{\chi}{2} + 5 + 2\chi$ .

προσθέτοντες εἰς ἀμφοτέρω τὰ μέλη αὐτῆς τὸν 7, λαμβάνομεν τὴν ἰσοδύναμον ἐξίσωσιν  $3\chi = \frac{\chi}{2} + 5 + 2\chi + 7$ ,

ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι ὁ ὄρος 7, ὅστις εὐρίσκετο εἰς τὸ πρῶτον μέλος ἔχων τὸ σημεῖον —, εὐρίσκεται νῦν εἰς τὸ δεύτερον ἔχων τὸ +.

Ὁμοίως προσθέτοντες εἰς ἀμφοτέρω τὰ μέλη τὸν ἀριθμὸν  $-2\chi$  (ἢ ἀφαιροῦντες ἀπ' ἀμφοτέρων τὸν  $2\chi$ ), λαμβάνομεν τὴν ἰσοδύναμον ἐξίσωσιν

$$3\chi - 2\chi = \frac{\chi}{2} + 12,$$

ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι ὁ ὅρος  $2\chi$ , ὅστις εὐρίσκετο εἰς τὸ δεύτερον μέλος ἔχων τὸ σημεῖον +, μετέβη εἰς τὸ πρῶτον καὶ ἔχει νῦν τὸ —.

ΠΟΡΙΣΜΑ Β'. Δυνάμεθα νὰ ἀλλάξωμεν τὰ σημεῖα πάντων τῶν ὄρων τῆς ἐξίσωσης.

$$\text{Ἔστω ἡ ἐξίσωσις} \quad 8\chi - 3 = 5\chi - \frac{\chi}{2} + 12.$$

μεταφέροντες τοὺς ὄρους τοῦ δευτέρου μέλους εἰς τὸ πρῶτον καὶ τοὺς ὄρους τοῦ πρῶτου εἰς τὸ δεύτερον, λαμβάνομεν

$$-5\chi + \frac{\chi}{2} - 12 = -8\chi + 3.$$

γράφοντες δὲ τὸ δεύτερον μέλος ὡς πρῶτον καὶ τὸ πρῶτον ὡς δεύτερον, εὐρίσκομεν

$$-8\chi + 3 = -5\chi + \frac{\chi}{2} - 12.$$

102. ΘΕΩΡΗΜΑ Β'. Ἐὰν πολλαπλασιασθῶσιν ἀμφότερα τὰ μέλη ἐξίσωσης ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν (πλὴν τοῦ 0), προκύπτει ἐξίσωσις ἰσοδύναμος.

$$\text{Ἔστω ὡς πρᾶδειγμα ἡ ἐξίσωσις} \quad 12\chi + 8 = 5\chi + 10 + \frac{\chi}{3}.$$

ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέλη αὐτῆς ἀμφότερα ἐπὶ τὸν τυχόντα ἀριθμὸν  $\mu$ , λαμβάνομεν τὴν ἐξίσωσιν

$$(12\chi + 8)\mu = (5\chi + 10 + \frac{\chi}{3})\mu$$

$$\eta \quad 12\mu\chi + 8\mu = 5\mu\chi + 10\mu + \frac{\mu\chi}{3}.$$

λέγω δέ, ὅτι αἱ ἐξισώσεις αὗται εἶναι ἰσοδύναμοι.

Καὶ ὄντως, ἂν ἀληθεύσῃ ποτὲ ἡ πρώτη, ἦτοι ἂν τὰ μέλη αὐτῆς γίνωσιν ἴσοι ἀριθμοί, θὰ μείνωσιν ἴσα καὶ μετὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν αὐτῶν ἐπὶ τὸν  $\mu$ : ἐπομένως θὰ ἀληθεύσῃ καὶ ἡ δευτέρα· ἂν δὲ πάλιν ἀληθεύσῃ ἡ δευτέρα, τὰ μέλη αὐτῆς θὰ μείνωσιν ἴσα καὶ μετὰ τὴν διαίρεσιν αὐτῶν διὰ τοῦ  $\mu$  (διότι ὁ  $\mu$  διαφέρει τοῦ 0): ἐπομένως θὰ ἀληθεύσῃ καὶ ἡ πρώτη· ὥστε εἶναι ἰσοδύναμοι.

Ἐπειδὴ πᾶσα διαίρεσις (πλὴν τῆς διὰ τοῦ 0) ἀνάγεται εἰς πολλαπλασιασμὸν (50), ἔπεται, ὅτι, καὶ ἂν διαιρεθῶσι τὰ μέλη ἐξίσωσης ἀμφότερα διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, προκύπτει ἐξίσωσις ἰσοδύναμος.

ΣΗΜ. Α'. Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη οἰκασδήποτε ἐξίσωσης ἐπὶ τὸ 0, εὐρίσκομεν πάντοτε  $0=0$ . ἦτοι ἰσότητα, ἐξ ἧς οὐδεὶς ἄγνωστος δύναται νὰ ὀρισθῇ.

ΣΗΜ. Β'. Ἐὰν ὁ πολλαπλασιαστής ἢ ὁ διαιρέτης  $\mu$  εἶναι παράστασις περιέχουσα γράμματα διάφορα τῶν ἀγνώστων, αἱ ἐξισώσεις εἶναι ἰσοδύναμοι μόνον διὰ τὰς τιμὰς τῶν γραμμάτων, αἵτινες δὲν μηδενίζουσι τὴν παράστασιν  $\mu$ .

Οὕτω λ.  $\chi$ . ἡ ἐξίσωσις  $(\alpha + \beta)\chi = \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$ ,  
 ἐν ἣ ὁ  $\chi$  θεωρεῖται ἀγνώστος, εἶναι ἰσοδύναμος τῇ

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)\chi = (\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)(\alpha - \beta)$$

$$\text{ἢτοι} \quad (\alpha^2 - \beta^2)\chi = \alpha^3 - \beta^3,$$

ἐν ὅσῳ ὑποτίθεται  $\alpha$  διάφορον τοῦ  $\beta$ , οὐχὶ δέ, καὶ ὅταν εἶναι  $\alpha = \beta$ .

Ὅμοιως ἡ ἐξίσωσις  $(\alpha - \beta)\chi = \alpha^2 - \beta^2$  εἶναι ἰσοδύναμος τῇ

$$\chi = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha - \beta},$$

ἢν εὐρίσκομεν διαιροῦντες τὰ μέλη τῆς πρώτης διὰ τοῦ  $\alpha - \beta$ , μόνον ἐν ὅσῳ τὸ  $\alpha$  εἶναι διάφορον τοῦ  $\beta$ .

ΣΗΜ. Γ'. Ἐὰν ὁ πολλαπλασιαστής ἢ ὁ διαιρέτης  $\mu$  εἶναι παράστασις περιέχουσα ἓνα ἢ περισσοτέρους ἀγνώστους τῆς ἐξισώσεως, ἡ προκύπτουσα ἐξίσωσις δὲν εἶναι ἐν γένει ἰσοδύναμος τῇ πρώτῃ.

Ἐστω ὡς παράδειγμα ἡ ἐξίσωσις  $5\chi - 3 = 4\chi - 1$ ,  
 ἐξ ἧς, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέλη ἐπὶ τὴν παράστασιν  $\chi - 1$ ,  
 εὐρίσκομεν  $(\chi - 1)(5\chi - 3) = (\chi - 1)(4\chi - 1)$ .

ἀληθεύει δὲ αὕτη, ὅταν τεθῇ  $\chi = 1$ , οὐχὶ δὲ καὶ ἡ πρώτη.

103. ΠΟΡΙΣΜΑ. Δυνάμεθα νὰ ἐξαλείψωμεν πάντας τοὺς παρονομαστὰς τῶν ὄρων ἐξισώσεως. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν πάντας τοὺς ὄρους αὐτῆς ἐπὶ κοινόν τι πολλαπλάσιον τῶν παρονομαστῶν.

Ἐστω π.  $\chi$ . ἡ ἐξίσωσις  $\frac{\chi}{3} + \frac{5}{2} = \frac{11\chi}{5} - 3\chi$ .

πολλαπλασιάζοντες πάντας τοὺς ὄρους ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν 2.3.5. λαμβάνομεν

$$2.3.5. \frac{\chi}{3} + 2.3.5. \frac{5}{2} = 2.3.5. \frac{11\chi}{5} - 2.3.5. 3\chi,$$

$$\text{ἢ} \quad 2.5\chi + 3.5.5 = 2.3.11\chi - 2.3.5.3\chi,$$

$$\text{ἢτοι} \quad 10\chi + 75 = 66\chi - 90\chi.$$

Ὅταν οἱ παρονομασταὶ εἶναι ὀρισμένοι ἀριθμοί, ὁ ἀπλούστατος πολλαπλασιαστής, δι' οὗ ἐξαλείφονται οἱ παρονομασταί, εἶναι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον αὐτῶν.

Ἐστω ὡς παράδειγμα ἡ ἐξίσωσις  $\frac{\chi}{6} - \frac{2\chi}{3} + \frac{3}{8} = \frac{5}{12}(\chi + 1)$

τῶν παρονομαστῶν τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον εἶνε 24· ἐὰν δὲ ἐπ' αὐτὸ πολλαπλασιάσωμεν ἀμφοτέρω τὰ μέλη (ἦτοι πάντας τοὺς ὄρους) τῆς ἐξίσωσως, εὐρίσκομεν

$$24 \cdot \frac{\chi}{6} - 24 \cdot \frac{2\chi}{3} + 24 \cdot \frac{3}{8} = 24 \cdot \frac{5}{12} \cdot (\chi + 1),$$

ἢ  $4\chi - 16\chi + 9 = 10(\chi + 1).$

Καὶ ὅταν οἱ παρονομασταὶ εἶναι ἐγγράμματοι, εὐρίσκεται ἐνίοτε παράστασις διαιρετὴ διὰ πάντων τῶν παρονομαστῶν καὶ ἀπλουστέρα τοῦ γινομένου αὐτῶν· ἡ τοιαύτη παράστασις λαμβάνεται τότε ὡς πολλαπλασιαστὴς τῆς ἐξίσωσως.

Ἐστω ἡ ἐγγράμματος ἐξίσωσις  $\frac{(\alpha + \beta)\chi}{\alpha - \beta} + \frac{(\alpha - \beta)\chi}{\alpha + \beta} + \frac{1}{\alpha^2 - \beta^2} = \frac{1}{\alpha^2\beta^2}$

ἡ παράστασις  $\alpha^2\beta^2(\alpha^2 - \beta^2)$  εἶναι διαιρετὴ διὰ πάντων τῶν παρονομαστῶν ἐπομένως, ἐὰν ἐπ' αὐτὴν πολλαπλασιάσωμεν πάντας τοὺς ὄρους τῆς ἐξίσωσως, ἀπαλλάσσομεν αὐτὴν ἀπὸ τῶν παρονομαστῶν καὶ εὐρίσκομεν

$$\alpha^2\beta^2(\alpha + \beta)^2\chi + \alpha^2\beta^2(\alpha - \beta)^2\chi + \alpha^2\beta^2 = \alpha^2 - \beta^2.$$

εἶναι δὲ ἡ ἐξίσωσις αὕτη ἰσοδύναμος τῇ δοθείσῃ, πλὴν ὅταν εἶναι  $\alpha^2 = \beta^2$ .

### Περὶ τοῦ βαθμοῦ τῶν ἐξισώσεων.

104. Βαθμὸς ἐξίσωσως, ἐν ᾗ ἕκαστος τῶν ὄρων εἶναι ἡ ὠρισμένος ἀριθμὸς ἢ μονώνυμον ἀκέραιον καὶ ἐν ᾗ ὅμοιοι ὄροι δὲν ὑπάρχουσι, λέγεται ὁ μέγιστος τῶν βαθμῶν τῶν μονωνύμων πρὸς τοὺς ἀγνώστους (78).

Κατὰ ταῦτα αἱ ἐξισώσεις

$$3\chi = 8, \quad \frac{5}{6}\chi - 9 = 0$$

εἶναι τοῦ πρώτου βαθμοῦ·

αἱ δὲ ἐξισώσεις  $\chi^2 + 5\chi = 14$ ,  $\chi\psi = 7$  εἶναι τοῦ δευτέρου βαθμοῦ.

### Λύσις τῶν ἐξισώσεων τοῦ πρώτου βαθμοῦ τῶν ἑνα ἄγνωστον περιεχουσῶν.

105. Τὴν λύσιν ἐξίσωσως, ἑνα ἄγνωστον ἐχούσης, ἐπιχειροῦμεν συνήθως κατὰ τὸν ἐπόμενον τρόπον.

α) Ἀπαλλάσσομεν αὐτὴν ἀπὸ τῶν παρονομαστῶν, ἐὰν ἔχη.

β) Ἐκτελοῦμεν τὰς σεσημειωμένας πράξεις, ἐὰν ᾧσι.

γ) Χωρίζομεν τοὺς γνωστοὺς ὄρους ἀπὸ τῶν ἐχόντων τὸν ἄγνωστον, μεταφέροντες τοὺς μὲν πρώτους εἰς τὸ ἓν ἐκ τῶν μελῶν, τοὺς δὲ δευτέρους εἰς τὸ ἕτερον.

δ') Προσθέτομεν τοὺς ὁμοίους ὄρους ἐν ἐκάστῳ μέλει, ἐὰν ὑπάρχωσι τοιοῦτοι.

Μετὰ τὰς πράξεις ταύτας, ἐὰν ἡ ἐξίσωσις εἶναι τοῦ πρώτου βαθμοῦ, οἱ μὲν γνωστοὶ ὄροι θὰ ἀποτελέσωσιν ὠρισμένον ἀριθμὸν ἢ παράστασιν γνωστήν, οἱ δὲ τὸν ἄγνωστον ἔχοντες, ἐπειδὴ ὁ ἄγνωστος εἶναι κοινὸς παραγῶν αὐτῶν, θὰ ἀποτελέσωσι τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ ἀριθμὸν ὠρισμένον ἢ ἐπὶ παράστασιν τινὴ γνωστήν· ὅθεν ἡ ἐξίσωσις θὰ λάβῃ τὴν μορφήν

$$\alpha \cdot \chi = \beta,$$

τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ὄντων ἢ ὠρισμένων ἀριθμῶν ἢ καὶ παραστάσεων γνωστῶν.

Ἡ ἐξίσωσις  $\alpha\chi = \beta$  εἶναι ἰσοδύναμος τῇ δοθείσῃ· διότι εὐρέθη ἐξ ἐκείνης διὰ πράξεων, αἵτινες τρέπουσιν ἐξίσωσιν οἰανδῆποτε εἰς ἄλλην ἰσοδύναμον. Ὡστε εἰς τὴν λύσιν τοιαύτης ἐξισώσεως ἀνάγεται ἡ λύσις πάσης ἐξισώσεως πρώτου βαθμοῦ.

Ἵποθέτοντες νῦν τὸν πολλαπλασιαστικὴν τοῦ ἄγνωστου, ἦτοι τὸν  $\alpha$ , διάφορον τοῦ 0, καὶ διακίρουντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ἐξισώσεως

$$\alpha\chi = \beta \text{ διὰ τοῦ } \alpha, \text{ εὐρίσκομεν τὴν ἰσοδύναμον ἐξίσωσιν } \chi = \frac{\beta}{\alpha},$$

ἣτις ἀληθεύει προδήλως, μόνον ὅταν ὁ ἄγνωστος ἀντικατασταθῇ ὑπὸ τοῦ  $\frac{\beta}{\alpha}$ . ἐπομένως καὶ ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις ἀληθεύει τότε, καὶ τότε

μόνον, ὅταν ὁ  $\chi$  ἀντικατασταθῇ ὑπὸ τοῦ  $\frac{\beta}{\alpha}$ . ἐλύθη ἄρα ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις.

Μένει νὰ ἐξετάσωμεν τὴν ἐξίσωσιν  $\alpha\chi = \beta$  ἐν τῇ μερικῇ περιπτώσει, καθ' ἣν εἶναι ὁ  $\alpha$  ἴσος τῷ 0· ὅτε γίνεται  $0\chi = \beta$ , ἦτοι  $0 = \beta$ . ἀλλ' ἂν μὲν ὁ γνωστὸς ὄρος  $\beta$  εἶναι καὶ αὐτὸς ἴσος τῷ 0, ἡ ἰσότης αὕτη γίνεται  $0 = 0$  καὶ ἀληθεύει οἰανδῆποτε τιμὴν καὶ ἂν ἔχη ὁ ἄγνωστος  $\chi$ · διότι οὐδόλως ἐν αὐτῇ περιέχεται· ἀληθεύει ἄρα καὶ ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις, ὡς ἰσοδύναμος αὐτῇ, οἰανδῆποτε τιμὴν καὶ ἂν ἔχη τὸ γράμμα  $\chi$ · ὥστε ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἢ πρὸς λύσιν δοθεῖσα ὡς ἐξίσωσις ἦτο ταυτότης· ἂν δὲ ὁ ὄρος  $\beta$  διαφέρῃ τοῦ 0, ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις ὑπὸ οὐδεμιᾶς τιμῆς τοῦ  $\chi$  ἐπαληθεύεται, ἦτοι εἶναι ἀδύνατος· διότι ἀληθευούσης τῆς δοθείσης ἐξισώσεως, θι ἦτο ἀληθὴς καὶ ἡ ἰσοδύναμος αὐτῇ  $\beta = 0$ .

106. Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγεται, ὅτι τῶν ἐξισώσεων τοῦ πρώτου βαθμοῦ αἱ μὲν ἐπαληθεύονται ὑπὸ μιᾶς μόνῃς τιμῆς τοῦ ἄγνωστου, αἱ δὲ ὑπὸ οὐδεμιᾶς (αἱ δὲ ἐπαληθεύονται ὑπὸ τιμῶν περισσοτέρων τῆς

μῆς εἶναι ταυτότητες). Καὶ αἱ μὲν πρῶται, ὅταν ἐπ' αὐτῶν ἐφαρμοσθῶσιν αἱ τέσσαρες πράξεις τοῦ ἐδ. 105, ἄγονται εἰς τὴν μορφήν  $\alpha\chi = \beta$ , ἐν ἧ ὁ πολλαπλασιαστικὸς  $\alpha$  διαφέρει τοῦ 0· ἦτοι διαφυλάττουσι τὸν ἄγνωστον· αἱ δὲ δευτέραι ἄγονται εἰς τὴν μορφήν  $0 = \beta$ · τουτέστιν ἐν αὐταῖς πάντες οἱ τὸν ἄγνωστον ἔχοντες ὅροι ἀφανίζονται, ἀναιροῦντες ἀλλήλους, ἀλλ' οὐχὶ καὶ οἱ γνωστοί. Ἐὰν δὲ ἡ πρὸς λύσιν δοθεῖσα ὡς ἐξίσωσις εἶναι ταυτότης, ἄγεται διὰ τῶν εἰρημένων πράξεων εἰς τὴν μορφήν  $0 = 0$ · τουτέστιν ἐν αὐτῇ καὶ οἱ τὸν ἄγνωστον ἔχοντες ὅροι ἀφανίζονται καὶ οἱ γνωστοὶ ὡσαύτως.

### Παραδείγματα.

1) Ἐστω πρὸς λύσιν ἡ ἐξίσωσις 
$$\frac{2(\chi+1)}{5} - 3 = \frac{\chi-1}{8}.$$

ἵνα ἀπκλαῖξωμεν αὐτὴν ἀπὸ τῶν παρονομαστῶν, πολλαπλασιάζομεν πάντας τοὺς ὅρους αὐτῆς ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν 5·8, ὅτε

εὐρίσκομεν 
$$5 \cdot 8 \cdot \frac{2(\chi+1)}{5} - 3 \cdot 5 \cdot 8 = 5 \cdot 8 \cdot \frac{\chi-1}{8}$$

ἢ ἀπλούστερον 
$$16(\chi+1) - 3 \cdot 5 \cdot 8 = 5(\chi-1).$$

ἐκτελοῦντες δὲ τὰς σεσημειωμένας πράξεις, εὐρίσκομεν

$$16\chi + 16 - 120 = 5\chi - 5.$$

χωρίζοντες δὲ τοὺς γνωστοὺς ὅρους ἀπὸ τῶν λοιπῶν, λαμβάνομεν

$$16\chi - 5\chi = 120 - 16 - 5.$$

τέλος προσθέτοντες τοὺς ὁμοίους ὅρους, εὐρίσκομεν

$$11\chi = 99,$$

ἐξ ἧς καὶ 
$$\chi = \frac{99}{11} = 9.$$

ὥστε ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις ἀληθεύει, μόνον ὅταν ὁ  $\chi$  ἀντικατασταθῇ ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 9. Ἐὰν τφόντι ἀντικαταστήσωμεν τὸν  $\chi$  ὑπὸ τοῦ 9 ἐν τῇ δοθείσῃ ἐξίσωσει, εὐρίσκομεν

$$\frac{2(9+1)}{5} - 3 = \frac{9-1}{8}$$

καὶ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων εὐρίσκομεν, ὡς ἔπρεπε νὰ συμβῇ, τὴν ἀληθῆ ἰσότητα  $1 = 1$ .

2) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις 
$$\frac{3(\chi+5)}{7} - \frac{2}{3} = \frac{\chi}{8} + \frac{2\chi}{3}.$$

ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν πάντας τοὺς ὅρους ἐπὶ τὸ γινόμενον 7·3·8, ἀπκλαῖσομεν τὴν ἐξίσωσιν ἀπὸ τῶν παρονομαστῶν καὶ εὐρίσκομεν

$$3 \cdot 8 \cdot 3(\chi+5) - 7 \cdot 8 \cdot 2 = 7 \cdot 3\chi - 7 \cdot 8 \cdot 2\chi,$$

καὶ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν σσημειωμένων πράξεων

$$72\chi + 360 - 112 = 21\chi + 112\chi,$$

καὶ μετὰ τὸν χωρισμὸν τῶν ὄρων  $360 - 112 = 21\chi + 112\chi - 72\chi$

καὶ μετὰ τὴν πρόσθεσιν τῶν ὁμοίων ὄρων  $248 = 61\chi$

ἐξ ἧς καὶ 
$$\chi = \frac{248}{61} = 4 + \frac{4}{61}.$$

ὥστε ὁ ἀριθμὸς  $\frac{248}{61}$ , μόνος οὗτος, λύει τὴν δοθεῖσαν ἐξίσωσιν.

3) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις 
$$\frac{7-\chi}{5} + \frac{1}{3} + \frac{\chi}{6} = \frac{2(\chi-1)}{3} + \frac{\chi}{2}.$$

πολλαπλασιάζοντες πάντας τοὺς ὄρους ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολ-  
λαπλάσιον τῶν παρονομαστῶν, ὅπερ εἶναι 2.5.3, εὐρίσκομεν

$$2 \cdot 3(7-\chi) + 2 \cdot 5 + 5 \cdot \chi = 2 \cdot 5 \cdot 2(\chi-1) + 3 \cdot 5\chi,$$

καὶ ἐκτελοῦντες τὰς σσημειωμένας πράξεις

$$42 - 6\chi + 10 + 5\chi = 20\chi - 20 + 15\chi,$$

καὶ χωρίζοντες τοὺς ὄρους,  $42 + 10 + 20 = 6\chi - 5\chi + 20\chi + 15\chi$

καὶ προσθέτοντες εὐρίσκομεν  $72 = 36\chi,$

ἐξ ἧς καὶ 
$$\chi = \frac{72}{36} = 2.$$

4) 
$$\frac{2\chi}{3} + \frac{5\chi}{6} + 4 = \frac{3\chi}{2} + 5.$$

πολλαπλασιάζοντες πάντας τοὺς ὄρους ἐπὶ 2.3, εὐρίσκομεν

$$2 \cdot 2\chi + 5\chi + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 3 \cdot 3\chi + 2 \cdot 3 \cdot 5$$

καὶ ἐκτελοῦντες τὰς πράξεις  $4\chi + 5\chi + 24 = 9\chi + 30$

καὶ χωρίζοντες τοὺς ὄρους  $4\chi + 5\chi - 9\chi = 30 - 24$

καὶ προσθέτοντες εὐρίσκομεν  $0 = 6.$

ὅθεν βλέπομεν, ὅτι ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις εἶναι ἀδύνατος, ἦτοι ὑπὸ οὐδε-  
νός ἀριθμοῦ ἐπαληθεύεται.

5) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις 
$$\frac{\chi-1}{4} + \frac{\chi}{12} = \frac{\chi-2}{3} + \frac{5}{12}.$$

ἐὰν ἐπὶ 3.4 πολλαπλασιάσωμεν πάντας τοὺς ὄρους, εὐρίσκομεν

$$3 \cdot (\chi-1) + \chi = 4 \cdot (\chi-2) + 5$$

ὅθεν  $3\chi - 3 + \chi = 4\chi - 8 + 5$

καὶ  $3\chi + \chi - 4\chi = 3 - 8 + 5$

ἦτοι  $0 = 0.$

ὥστε ἡ πρὸς λύσιν δοθεῖσα ὡς ἐξίσωσις ἦτο ταυτῆτος καὶ ἀληθεύει διὰ  
τοῦτο, οἷοςδήποτε ἀριθμὸς καὶ ἂν τεθῆ ἀντὶ τοῦ  $\chi.$

6) Ἐστω πρὸς τούτοις ἡ ἐγγράμματος ἐξίσωσις

$$\frac{2\chi - 4\beta}{\alpha + \beta} + 1 = \frac{4\alpha - \chi}{\alpha - \beta}$$

ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν πάντας τοὺς ὄρους ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν  $(\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$ , εὐρίσκομεν

$$(\alpha - \beta)(2\chi - 4\beta) + (\alpha - \beta)(\alpha + \beta) = (\alpha + \beta)(4\alpha - \chi)$$

καὶ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πολλαπλασιασμῶν

$$2\alpha\chi - 4\alpha\beta - 2\beta\chi + 4\beta^2 + \alpha^2 - \beta^2 = 4\alpha^2 - \chi\alpha + 4\alpha\beta - \beta\chi,$$

χωρίζοντες δὲ τοὺς γνωστούς ὄρους ἀπὸ τῶν λοιπῶν, εὐρίσκομεν

$$2\alpha\chi - 2\beta\chi + \alpha\chi + \beta\chi = 4\alpha\beta - 4\beta^2 - \alpha^2 + \beta^2 + 4\alpha^2 + 4\alpha\beta$$

καὶ μετὰ τὴν πρόσθεσιν τῶν ὁμοίων ὄρων,  $3\alpha\chi - \beta\chi = 3\alpha^2 + 8\alpha\beta - 3\beta^2$ . ἦτοι

$$(3\alpha - \beta)\chi = 3\alpha^2 + 8\alpha\beta - 3\beta^2.$$

Ἐὰν νῦν ὁ πολλαπλασιαστικὸς τοῦ  $\chi$ , ἦτοι ἡ πηράστασις  $3\alpha - \beta$ , διαφέρει τοῦ 0, διαιροῦμεν ἀμφοτέρω τὰ μέλη τῆς ἐξίσωσεως ταύτης διὰ  $3\alpha - \beta$  καὶ εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ  $\chi$

$$\chi = \frac{3\alpha^2 + 8\alpha\beta - 3\beta^2}{3\alpha - \beta} = \alpha + 3\beta.$$

Ἐὰν ὁμως εἴη  $3\alpha - \beta = 0$ , ἦτοι  $3\alpha = \beta$ , ἡ διὰ τοῦ  $3\alpha - \beta$  διαιρέσεις εἶναι ἀδύνατος καὶ ἡ προηγουμένη ἐξίσωσις γίνεται  $0 = 0$ . ὥστε ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις καταντᾷ ταυτότητος· καὶ ὄντως ὑποθέτοντες  $\beta = 3\alpha$ , δυνάμεθα νὰ γράψωμεν αὐτήν, ὡς ἔπεται

$$\frac{2\chi - 12\alpha}{4\alpha} + 1 = \frac{\chi - 4\alpha}{2\alpha}, \quad \eta \quad \frac{\chi}{2\alpha} - 3 + 1 = \frac{\chi}{2\alpha} - 2,$$

ἐξ οὗ φαίνεται ὅτι εἶναι ταυτότητος.

Πρὸς ἄσκησιν προτείνομεν εἰς λύσιν τὰς ἐπομένους ἐξισώσεις·

$$1) \quad \frac{3(5\chi - 4)}{7} = \frac{\chi + 13}{2} + \chi - 5 \quad (\chi = 5)$$

$$2) \quad \frac{(2\chi - 1)(2\chi + 1)}{4} + 1 = \chi^2 + 2\chi - \frac{1}{4} \quad \left(\chi = \frac{1}{2}\right)$$

$$3) \quad \frac{\chi}{\alpha - \beta} - \frac{\chi}{\alpha + \beta} = \frac{2}{\alpha^2 - \beta^2} \quad \left(\chi = \frac{1}{\beta}\right)$$

$$4) \quad \frac{\chi - 2\alpha}{\alpha - 2\beta} = \frac{\chi - 2\beta}{\beta - 2\alpha} \quad \left(\chi = \frac{4}{3}(\alpha + \beta)\right)$$

Ἐὰν  $\alpha = \beta$ , ἡ ἐξίσωσις καταντᾷ ταυτότητος.



## Προβλήματα,

ἧν ἡ λύσις ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς λύσεως μιᾶς ἐξισώσεως  
ἕνα ἄγνωστον περιεχοῦσης.

Πρόβλημα λέγεται πρότασις, ἐν ἣ ζητεῖται νὰ εὐρεθῶσιν ἐν ἡ περι-  
ρισσότερα ἄγνωστα ἐκπληροῦντα ὠρισμένας ἀπαιτήσεις.

107. Ἐν παντὶ προβλήματι διακρίνομεν δεδομένα καὶ ζητούμενα·  
(γνωστὰ καὶ ἄγνωστα).

108. Ἐν τοῖς ἀλγεβρικοῖς προβλήμασι καὶ τὰ δεδομένα καὶ τὰ ζη-  
τούμενα εἶναι πάντοτε ἀριθμοί· ἂν δὲ εἰς πρόβλημα περιέχωνται ποσά  
τινα, ταῦτα ὑποτίθενται μεμετρημένα, ἕκαστον διὰ τῆς μονάδος αὐτοῦ,  
καὶ δι' ἀριθμῶν ἐκπεφρασμένα.

109. Ὅροι τοῦ προβλήματος λέγονται αἱ ἀπαιτήσεις, τὰς ὁποίας  
τὰ ζητούμενα πρέπει νὰ πληρῶσιν, ἵνα λύωσι τὸ πρόβλημα.

Αἱ κυριώτεραι τῶν ἀπαιτήσεων τούτων γίνονται γνωσταὶ ἐν αὐτῇ  
τῇ ἐκφωνήσει τοῦ προβλήματος καὶ ὀρίζουσι τὰς σχέσεις, τὰς ὁποίας  
πρέπει νὰ ἔχωσι τὰ ζητούμενα πρὸς τὰ δεδομένα· λέγονται δὲ αἱ τοι-  
αῦται ἀπαιτήσεις ἐπιτάγματα.

Ἄλλὰ πλὴν τούτων, ὅταν ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς δὲν εἶναι ἀφηρημέ-  
νος, ἀλλὰ παριστᾷ ποσόν τι, ὁ ἀριθμὸς οὗτος, ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως τοῦ  
παριστοιμένου ποσοῦ καὶ ἀσχέτως πρὸς τὸ πρόβλημα, εἶναι συνήθως  
ὑποκείμενος εἰς δευτερεύοντάς τινας ὄρους, τοὺς ὁποίους ὡσαύτως ὀφεί-  
λει νὰ πληροῦ· λέγονται δὲ οἱ τοιοῦτοι ὄροι περιορισμοί.

Οὕτως ἐν τῷ προβλήματι:

Εὐρεῖν ἀριθμὸν, οὗ τὸ τριπλάσιον ὑπερβαίνει αὐτὸν κατὰ 9, ἐπιτάσ-  
σεται τοῦτο μόνον: νὰ εἶναι τὸ τριπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ ἴσον πρὸς τὸν ἀριθ-  
μὸν, ὅταν οὗτος ἀυξηθῇ κατὰ 9: ὥστε, ἂν παρασταθῇ ὁ ζητούμενος ἀριθ-  
μὸς διὰ τοῦ  $\chi$ , αἱ δύο παραστάσεις  $3\chi$  καὶ  $\chi + 9$  πρέπει νὰ εἶναι ἴσαι. Ἄλλ'  
οὐδεὶς ὑπάρχει περιορισμὸς· διότι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς, ὡς ἀφηρημένος,  
δύναται νὰ εἶνε οἷσδῆποτε (θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς, ἀκέραιος ἢ κλασματικὸς).

Ἐν δὲ τῷ προβλήματι:

Πόσα τέκνα ἔχει πατήρ τις, ὅστις δίδων εἰς ἕκαστον 3 δραχμάς, δι-  
δει 9 δραχμάς περισσοτέρας τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τέκνων;

Ἐὰν διὰ  $\chi$  παραστήσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν τέκνων, ἐπιτάσσεται πάλ-  
ιν νὰ εἶναι αἱ δύο παραστάσεις  $3\chi$  καὶ  $\chi + 9$  ἴσαι· διότι ἀμφότεραι ἐκ-  
φράζουσι τὸν ἀριθμὸν τῶν δοθεισῶν δραχμῶν· ὥστε ἡ τὸ ζητούμενον πρὸς

τὰ δεδομένα συνδέουσα σχέσεις εἶναι πάλιν ἡ αὐτή. Ἄλλ' ἵνα τὸ πρόβλημα τοῦτο λυθῇ ἐν τοῖς πράγμασιν, ἀπαιτεῖται νὰ εἶναι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς ἀκέραιος καὶ θετικός· διότι τοιαύτη ἡ φύσις τοῦ παριστωμένου ποσοῦ· τοῦτο δὲ εἶναι περιορισμός.

Πρόδηλον δέ, ὅτι πάντα τὰ προβλήματα, ἐν οἷς ὁ ἄγνωστος παριστᾷ ποσὸν τῆς αὐτῆς φύσεως, ἔχουσι τοὺς αὐτοὺς περιορισμούς.

Καὶ πάντες οἱ διὰ τῶν γραμμάτων παριστώμενοι ἀριθμοί, εἴτε γνωστοὶ ὑποτίθενται, εἴτε ἄγνωστοι, ὑπόκεινται συνήθως εἰς περιορισμούς, πηγάζοντας ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ποσοῦ, ὅπερ παριστῶσιν.

110. Ἡ λύσις παντὸς ἀλγεβρικοῦ προβλήματος συνίσταται ἐκ τῶν ἐξῆς τριῶν μερῶν.

α'.) Ἐκφράζομεν διὰ τῶν ἀλγεβρικῶν συμβόλων τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος· καὶ τὰ μὲν ἐπιτάγματα, ἢτοι αἱ τὰ ζητούμενα πρὸς τὰ δεδομένα συνδέουσαι σχέσεις, ἐκφράζονται δι' ἐξισώσεων, τὰς ὁποίας οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ (οἱ ἄγνωστοι) πρέπει νὰ ἐπαληθεύωσιν, οἱ δὲ περιορισμοὶ ἀναγράφονται ἀπλῶς πλησίον τῶν ἐξισώσεων· ὥστε πρῶτον εὐρίσκομεν τὴν ἐξίσωσιν ἢ τὰς ἐξισώσεις τοῦ προβλήματος καὶ τοὺς περιορισμοὺς αὐτοῦ.

β'.) Λύομεν τὴν ἐξίσωσιν ἢ τὰς ἐξισώσεις· οὕτως εὐρίσκομεν ἐκ πάντων τῶν ἀριθμῶν, τίς ἢ τίνες μόνον δύνανται νὰ λύσωσι τὸ πρόβλημα.

γ'.) Ἐρευνῶμεν, ἂν ὁ εὑρεθεὶς ἀριθμὸς ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἐξισώσεως πληροῖ καὶ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ προβλήματος· ὅτε εἶναι πραγματικὴ λύσις.

Καὶ διὰ μὲν τὴν λύσιν τῶν ἐξισώσεων ὑπάρχουσιν ὠρισμένοι κανόνες· ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ εὔρεσις τῶν περιορισμῶν καὶ ἡ διερεύνησις τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων οὐδεμίαν συνήθως παρέχουσι δυσκολίαν· ἀλλὰ διὰ τὴν εὔρεσιν τῶν ἐξισώσεων οὐδεὶς δύναται νὰ δοθῇ ὠρισμένος κανὼν ἕνεκα τῆς ἀπείρου ποικιλίας τῶν προβλημάτων· ἀπαιτεῖται πρὸς τοῦτο ἄσκησις καὶ δεξιότης τοῦ πνεύματος· εἰς πολλὰς περιπτώσεις ὁδηγεῖ πρὸς τὴν εὔρεσιν τῆς ἐξισώσεως ὁ ἐπόμενος κανὼν.

Σημειοῦμεν διὰ τῶν ἀλγεβρικῶν σημείων ἐπὶ τῶν γραμμάτων, δι' ὧν παρίστανται οἱ ἄγνωστοι, καὶ ἐπὶ τῶν δεδομένων (ἀριθμῶν ἢ γραμμάτων) τὰς πράξεις, τὰς ὁποίας ἠθέλομεν ἐκτελέσει, ἂν, δοθέντων τῶν ἀγνώστων, ἠθέλομεν νὰ βεβαιωθῶμεν, ἂν πληροῦνται οἱ ὅροι τοῦ προβλήματος.

Ἔπονται προβλήματα τινὰ, ἐν οἷς ἐφαρμόζεται ὁ κανὼν οὗτος.

### Προβλήματα,

ὧν ὁ ἄγνωστος οὐδένα ἔχει περιορισμόν.

111. Εὐρεῖν ἀριθμόν, οὗτινος τὸ ἥμισυ καὶ τὸ τρίτον καὶ τὸ τέταρτον προσλαβόντα καὶ τὸν 21 ἀποτελοῦσι τὸν ἀριθμὸν 73.

Ἐὰν παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν διὰ τοῦ  $\chi$ , τὸ ἥμισυ αὐτοῦ θὰ παρασταθῇ διὰ τοῦ  $\frac{\chi}{2}$  καὶ τὸ τρίτον διὰ τοῦ  $\frac{\chi}{3}$  καὶ τὸ τέταρτον διὰ τοῦ  $\frac{\chi}{4}$ , τὸ δὲ ἄθροισμα τούτων καὶ τοῦ 21 θὰ παρασταθῇ διὰ τοῦ  $\frac{\chi}{2} + \frac{\chi}{3} + \frac{\chi}{4} + 21$ . Τοῦτο δὲ κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος θὰ εἶναι ἴσον τῷ 73· ὥστε ἔχομεν τὴν ἐξίσωσιν

$$\frac{\chi}{2} + \frac{\chi}{3} + \frac{\chi}{4} + 21 = 73,$$

ἐξ ἧς λύοντες εὐρίσκομεν  $\chi = 48$ .

112. Ἐὰν ἀριθμὸς τις αὐξηθῇ κατὰ μονάδα, τὸ τετράγωνον αὐτοῦ αὐξάνεται κατὰ 57· τίς ὁ ἀριθμὸς οὗτος;

Ἐὰν παρασταθῇ ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς διὰ τοῦ  $\chi$ , τὸ τετράγωνον αὐτοῦ θὰ παρασταθῇ διὰ τοῦ  $\chi^2$ · ἀλλ' ἂν ὁ ἀριθμὸς αὐξηθῇ κατὰ μονάδα, γίνεται  $\chi + 1$ , καὶ τὸ τετράγωνον αὐτοῦ γίνεται  $(\chi + 1)^2$ · διαφέρουσι δὲ τὰ τετράγωνα ταῦτα κατὰ 57· ὥστε ἔχομεν τὴν ἐξίσωσιν

$$(\chi + 1)^2 - \chi^2 = 57$$

καὶ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων  $2\chi + 1 = 57$ ,

ἐξ ἧς εὐρίσκομεν  $\chi = 28$ .

113. Εὐρεῖν ἀριθμόν, εἰς ὃν προστιθέμενοι οἱ 3, 5, 7, 10 συνιστῶσιν ἀναλογίαν.

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\chi$  παρασταθῇ ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς καὶ προστεθῶσιν εἰς αὐτὸν οἱ δοθέντες, θὰ προκύψωσιν οἱ ἀριθμοὶ

$$\chi + 3, \quad \chi + 5, \quad \chi + 7, \quad \chi + 10.$$

Ἐπειδὴ δὲ οὗτοι συνιστῶσιν ἀναλογίαν, θὰ εἶναι τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων ἴσον τῷ γινομένῳ τῶν μέσων, ὅθεν ἔπεται ἡ ἰσότης

$$(\chi + 3)(\chi + 10) = (\chi + 5)(\chi + 7)$$

καὶ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων  $13\chi + 30 = 12\chi + 35$ ,

ἐξ ἧς εὐρίσκομεν  $\chi = 5$

Τῷ ὄντι δὲ οἱ ἀριθμοὶ 8, 10, 12, 15 συνιστῶσιν ἀναλογίαν.

114. *Εὑρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις προστιθέμενος εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος  $\frac{3}{10}$  καθιστᾷ αὐτὸ ἴσον τῷ κλάσματι  $\frac{1}{2}$ .*

Παριστῶντες τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν διὰ τοῦ  $\chi$  καὶ προσθέτοντες αὐτὸν εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος  $\frac{3}{10}$ , εὐρίσκομεν τὴν

ἐξίσωσιν 
$$\frac{3+\chi}{10+\chi} = \frac{1}{2} \quad \text{ἐξ ἧς καὶ } \chi = 4.$$

115. *Εὑρεῖν ἀριθμὸν, οὗτινος τὸ τρίτον καὶ τὸ ἕκτον ἀποτελοῦσι τὸ ἥμισυ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.*

Παριστῶντες τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν διὰ τοῦ  $\chi$ , εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα

$$\frac{\chi}{3} + \frac{\chi}{6} = \frac{\chi}{2},$$

ἐξ ἧς μετὰ τὰς πράξεις τοῦ ἐδαφίου 105 προκύπτει  $0 = 0$ .  
ὥστε πᾶς ἀριθμὸς πληροῖ τοὺς ὄρους τοῦ προβλήματος.

116. *Εὑρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις προστιθέμενος εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος  $\frac{3}{5}$  καθιστᾷ αὐτὸ ἴσον τῇ μονάδι.*

Ἐὰν ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς παρασταθῇ διὰ τοῦ  $\chi$ , θὰ εἶναι

$$\frac{3+\chi}{5+\chi} = 1, \quad \text{ἐξ ἧς εὐρίσκομεν } 0 = 2.$$

τοῦτ' ἔστιν οὐδεὶς τοιοῦτος ὑπάρχει ἀριθμὸς καὶ τὸ ζητούμενον εἶναι ἀδύνατον.

### Προβλήματα,

ἐν οἷς ὁ ἄγνωστος ἀνάγκη νὰ εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς.

117. *Πεζὸς διανύων 5 στάδια καθ' ὥραν διώκεται ὑπὸ ἱππέως κινήσαντος 10 ὥρας μετ' αὐτὸν καὶ διανύοντος 9 στάδια καθ' ὥραν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ μετὰ πόσας ὥρας ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του ὁ ἱππεὺς θὰ φθάσῃ τὸν πεζόν;*

Τοῦτο θὰ γίνῃ, ὅταν τὰ διανυσθέντα ὑπ' ἀμφοτέρων στάδια θὰ εἶναι ἴσα (διότι ἐκ τοῦ αὐτοῦ τύπου ἀνεχώρησαν καὶ εἰς τὸν αὐτὸν τύπον θὰ φθάσωσι).

Ἐστω μετὰ  $\chi$  ὥρας· ἐπειδὴ ὁ ἱππεὺς διανύει εἰς μίαν ὥραν 9 στάδια, εἰς  $\chi$  ὥρας θὰ διανύσῃ  $9\chi$  στάδια· ἀλλὰ καὶ ὁ πεζὸς θὰ διανύσῃ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον  $5\chi$  στάδια· (διότι καθ' ἐκάστην ὥραν διανύει 5 στάδια)· εἶχε δὲ καὶ πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ ἱππέως διανύσει  $5 \cdot 10$

ἦτοι 50 στάδια. Ἐπειδὴ δὲ τὰ διχνοσθέντα στάδια εἶναι ἴσα, θὰ ἔχω-  
μεν τὴν ἐξίσωσιν

$$5\chi + 50 = 9\chi.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ὁ  $\chi$  θετικὸς ἀριθμὸς·

ἐκ τῆς ἐξισώσεως εὐρίσκομεν  $\chi = \frac{50}{4} = 12\frac{1}{2}$  ὥρας.

ΣΗΜ. Τὴν λύσιν ταύτην εὐρίσκομεν καὶ ἀμέσως παρατηροῦντες, ὅτι ἡ ἀρχικὴ ἀπόστασις τοῦ ἱππέως καὶ τοῦ πεζοῦ, ἣτις εἶναι 50 στάδια, ἐλατ-  
τοῦται καθ' ἐκάστην ὥραν (ἀφ' οὗ ἀναχωρήσῃ ὁ ἱππεὺς) κατὰ 4 στάδια.

118. Ἐργάτης χρειάζεται 15 ὥρας, ἵνα τελειώσῃ ἔργον τι· δεύτερος  
ἐργάτης χρειάζεται διὰ τὸ αὐτὸ ἔργον 12 ὥρας, καὶ τρίτος 20 ὥρας·  
εἰς πόσας ὥρας οἱ τρεῖς ἐργάται ὁμοῦ θὰ τελειώσωσι τὸ ἔργον;

Ἐστω εἰς  $\chi$  ὥρας· ἐπειδὴ ὁ πρῶτος χρειάζεται 15 ὥρας, ἵνα τε-  
λειώσῃ τὸ ἔργον, εἰς μίαν ὥραν ἐκτελεῖ τὸ  $\frac{1}{15}$  τοῦ ἔργου, καὶ ἐπο-

μένως εἰς  $\chi$  ὥρας ἐκτελεῖ τὰ  $\frac{\chi}{15}$  τοῦ ἔργου· ὁμοίως ὁ δεύτερος ἐκτελεῖ

τὰ  $\frac{\chi}{12}$  καὶ ὁ τρίτος τὰ  $\frac{\chi}{20}$  τοῦ ἔργου. Τὰ τρία ταῦτα μέρη τοῦ ἔργου  
πρέπει νὰ ἀποτελῶσιν ὅλον τὸ ἔργον. Ἄν λοιπὸν παραστήσωμεν τὸ  
ἔργον διὰ τῆς μονάδος 1, τὰ τρία αὐτοῦ μέρη θὰ παριστῶνται διὰ τῶν  
κλασμάτων  $\frac{\chi}{15}$ ,  $\frac{\chi}{12}$  καὶ  $\frac{\chi}{20}$ · καὶ θὰ ἔχωμεν τὴν ἐξίσωσιν

$$\frac{\chi}{15} + \frac{\chi}{12} + \frac{\chi}{20} = 1$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι καὶ ὁ  $\chi$  θετικὸς ἀριθμὸς·.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 5$ .

Εἶναι δὲ ἡ λύσις αὕτη παραδεκτὴ· διότι πληροὶ πάντας τοὺς ὅρους  
τοῦ προβλήματος.

119. Κρήνη πληροὶ δεξαμενὴν εἰς 7 ὥρας, δευτέρα τις κρήνη δὲ-  
ναται νὰ πληρώσῃ αὐτὴν εἰς 9 ὥρας καὶ τρίτη εἰς 12· διὰν δὲ ῥέωσι  
πᾶσαι συγχρόνως ἐπὶ 4 ὥρας, ἡ δεξαμενὴ χρειάζεται εἰσέτι 50 λίτρας,  
ἵνα πληρωθῇ ἐντελῶς. Πόσας λίτρας χωρεῖ ἡ δεξαμενὴ;

Ἐστωσαν  $\chi$  αἱ λίτραι, τὰς ὁποίας χωρεῖ ἡ δεξαμενὴ. Αἱ  $\chi$  αὗται  
λίτραι θὰ ἀποτελῶνται ἐκ τῶν λιτρῶν, τὰς ὁποίας χύνουσι αἱ κρήναι  
εἰς 4 ὥρας, καὶ ἐκ τῶν 50.

Ἄλλ' ἐκ τῆς πρώτης κρήνης ῥέουσι  $\chi$  λίτραι εἰς 7 ὥρας (διότι εἰς  
7 ὥρας πληροὶ τὴν δεξαμενὴν)· ὅθεν εἰς μίαν ὥραν ῥέουσι λίτραι

$\frac{\chi}{7}$ , καὶ εἰς 4 ὥρας ρέουσι λίτροι  $\frac{4\chi}{7}$ . ὁμοίως εὐρίσκομεν, ὅτι ἐκ τῶν

ἄλλων δύο κρηνῶν ρέουσιν εἰς 4 ὥρας λίτροι  $\frac{4\chi}{9}$  καὶ  $\frac{4\chi}{12}$  ἢ  $\frac{\chi}{3}$ .

$$\text{Ὡστε ἔχομεν τὴν ἐξίσωσιν} \quad \frac{4\chi}{7} + \frac{4\chi}{9} + \frac{\chi}{3} + 50 = \chi$$

καὶ τὸν περιορισμὸν  $\chi = \text{θετικῶ ἀριθμῶ.}$

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = -143\frac{2}{11}$ . ἀλλ' ἡ λύσις αὕτη ἀπορρίπτεται· διότι δὲν πληροῖ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος· ὥστε τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον ἐν τοῖς πράγμασιν.

120. Πατήρ τις ἀφίνει εἰς τοὺς τέσσαρας υἱούς του κληρονομίαν 3530 δραχ. Διατάσσει δὲ ἐν τῇ διαθήκῃ του νὰ λάβῃ ὁ πρῶτος διπλάσια τοῦ δευτέρου πλὴν 2000 δραχμῶν, ὁ δεύτερος τριπλάσια τοῦ τρίτου πλὴν 3000 δραχμῶν, καὶ ὁ τρίτος τετραπλάσια τοῦ τετάρτου πλὴν 4000 δραχμῶν. Πόσας ἔλαβεν ἕκαστος;

Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ εἶναι μὲν τέσσαρα τὰ ἀγνώστα, τουτέστιν αἱ τέσσαρες μερίδες, ἀλλ' ἐκ τῆς μερίδος τοῦ τελευταίου υἱοῦ εὐρίσκονται εὐκόλως αἱ τῶν λοιπῶν κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος. Διὰ τοῦτο παριστῶμεν τὴν μερίδα τοῦ τετάρτου διὰ τοῦ  $\chi$ , τότε ἡ μερίς τοῦ τρίτου θὰ εἶναι

$$4\chi - 4000.$$

ἢ τοῦ δευτέρου 3.  $(4\chi - 4000) - 3000$ , ἢ  $12\chi - 15000$ .

ἢ δὲ τοῦ πρώτου 2.  $(12\chi - 15000) - 2000$ , ἢτοι  $24\chi - 32000$ .

Ἐπειδὴ δὲ τῶν τεσσάρων υἱῶν αἱ μερίδες συναποτελοῦσι προδήλως τὴν ὅλην κληρονομίαν, ἔπεται ἡ ἐξίσωσις

$$\chi + (4\chi - 4000) + (12\chi - 15000) + (24\chi - 32000) = 3530.$$

Ὁ ἀγνώστος  $\chi$  πρέπει καὶ αὐτὸς νὰ εἶναι θετικὸς καὶ τὰς μερίδας πᾶσας νὰ καθιστᾷ θετικάς.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 1330$ , ἐκ δὲ ταύτης προκύπτουσιν αἱ μερίδες κατὰ σειράν —80, —960, 1320, 1330.

Ἡ λύσις αὕτη εἶναι ἀπορριπτέα ὡς μὴ πληροῦσα πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος· ὥστε τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον ἐν τοῖς πράγμασιν.

121. Ποσὸν τι δραχμῶν διενεμήθη μεταξὺ τεσσάρων ἀνθρώπων, καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἔλαβε τὸ ἕμισον πλὴν 6· ὁ δὲ δεύτερος τὸ τρίτον τοῦ ὑπολοίπου πλὴν 2· ὁ δὲ τρίτος τὸ τέταρτον τοῦ ὑπολοίπου πλὴν 1, καὶ ὁ τέταρτος ἔλαβε τὸς ἐπιλοίπους 13 δραχμάς. Πόσαι ἦσαν αἱ δραχμαί, καὶ πόσας ἔλαβεν ἕκαστος τῶν τριῶν πρώτων;

Ἐὰν παρασταθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν δραχμῶν διὰ τοῦ  $\chi$ , ὁ πρῶτος ἔλαβεν

$$\frac{1}{2}\chi - 6$$

ἔμεινε δὲ ὑπόλοιπον ἐκ δραχμῶν  $\chi - \left(\frac{1}{2}\chi - 6\right)$  ἢ  $\frac{1}{2}\chi + 6$

ὁ δεύτερος ἔλαβεν  $\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\chi + 6\right) - 2$ , ἥτοι  $\frac{1}{6}\chi$ .

ἀφαιρουμένης δὲ τῆς μερίδος ταύτης ἀπὸ τοῦ πρώτου ὑπολοίπου, μένει

ὑπόλοιπον  $\frac{1}{2}\chi + 6 - \frac{1}{6}\chi$ , ἥτοι  $\frac{1}{3}\chi + 6$ .

ὁ τρίτος ἔλαβεν  $\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}\chi + 6\right) - 1$ , ἥτοι  $\frac{1}{12}\chi + \frac{1}{2}$ .

ἀφαιρουμένης δὲ τῆς μερίδος τοῦ τρίτου ἀπὸ τοῦ δευτέρου ὑπολοίπου,

μένει ὑπόλοιπον  $\frac{1}{3}\chi + 6 - \left(\frac{1}{12}\chi + \frac{1}{2}\right)$ , ἥτοι  $\frac{1}{4}\chi + \frac{11}{2}$ .

τοῦτο δὲ εἶναι τὸ μερίδιον τοῦ τετάρτου ὅθεν εἶναι  $\frac{1}{4}\chi + \frac{11}{2} = 13$ .

Πρέπει δὲ νὰ εἶναι καὶ ὁ  $\chi$  θετικὸς καὶ νὰ καθιστᾷ καὶ τὰς μερίδας πάσας θετικάς.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 30$ · καὶ ἐκ τούτου τὰς μερίδας τῶν τεσσάρων ἀνθρώπων 9, 5, 3, 13·

ἢ δὲ λύσις αὕτη πληροῖ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

122. Δύο ἀτμάμαξαι ἀναχωροῦσι συγχρόνως ἐκ δύο πόλεων ἀπεχωσῶν 280 στάδια ἀπ' ἀλλήλων καὶ κινοῦνται ἐπὶ τῆς μεταξὺ τῶν πόλεων ὁδοῦ. Ἡ πρώτη διατρέχει καθ' ὥραν 45 στάδια, ἡ δὲ δευτέρα 30. Μετὰ πόσας ὥρας ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως καὶ εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς πρώτης πόλεως θὰ συναντηθῶσιν;

Εὐρεθέντος τοῦ πρώτου, εὐρίσκεται ἀμέσως καὶ τὸ δεύτερον. Ἐστω λοιπὸν ἡ συνάντησις μετὰ  $\chi$  ὥρας ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως τῶν ἀτμάμαξῶν. Ἡ μὲν πρώτη, ἐπειδὴ καθ' ὥραν διατρέχει 45 στάδια, θὰ διατρέξῃ κατὰ τὰς  $\chi$  ὥρας  $45\chi$  στάδια· ἡ δὲ δευτέρα θὰ διατρέξῃ  $30\chi$  στάδια. Ἀποτελοῦσι δὲ τὴν στιγμὴν τῆς συναντήσεως τὰ διανυσθέντα διαστήματα προφανῶς τὴν ἀπόστασιν τῶν δύο πόλεων· ὥστε εἶναι

$$45\chi + 30\chi = 280.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι καὶ ὁ  $\chi$  θετικὸς ἀριθμὸς.

Ἐκ τῆς ἐξισώσεως εὐρίσκομεν λύοντες  $\chi = 3\text{ῶρ. } 44'$ , ἥτις λύσις πληροῖ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

ΣΗΜ. Τὴν λύσιν εὐρίσκει τις καὶ ἄνευ ἐξισώσεως παρατηρῶν, ὅτι ἡ ἀρχικὴ ἀπόστασις τῶν ἀτμαμαξῶν ἐλαττοῦται καθ' ἐκάστην ὥραν κατὰ τὰ ὑπ' αὐτῶν διανυόμενα 75 στάδια.

123. Κύριος συνεφώνησεν ὑπηρέτην 230 δραχμὰς κατ' ἔτος καὶ μίαν ἐνδυμασίαν ἀποπέμφας δὲ αὐτὸν μετὰ 10 μῆνας, ἔδωκεν εἰς αὐτὸν 180 δραχμὰς καὶ τὴν ἐνδυμασίαν. Πόσον τιμᾶται ἡ ἐνδυμασία ;

Ἐστω  $\chi$  ἡ ἀξία τῆς ἐνδυμασίας. Ὁ ἐτήσιος μισθὸς τοῦ ὑπηρετοῦ σύγκριται ἐκ τῆς ἐνδυμασίας καὶ ἐκ τῶν 230 δραχμῶν, ἥτοι εἶναι  $230 + \chi$  ἐπομένως ὁ μηνιαῖος εἶναι  $\frac{230 + \chi}{12}$  καὶ διὰ 10 μῆνας ἔπρεπε νὰ λάβῃ

$\frac{10}{12}(230 + \chi)$ , ἢ  $\frac{5}{6}(230 + \chi)$ . ἔλαβε δὲ  $180 + \chi$ . ὥστε εἶναι

$$\frac{5}{6}(230 + \chi) = 180 + \chi.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι καὶ ὁ  $\chi$  θετικὸς ἀριθμὸς.

Ἐκ τῆς ἐξισώσεως λύοντες εὐρίσκομεν  $\chi = 70$ . ἡ δὲ λύσις αὕτη πληροῦ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

124. Θέλει τις μὲ 55 δραχμὰς νὰ ἀγοράσῃ 12 πήχεις ἐκ δύο ὑφασμάτων καὶ τοῦ μὲν ἐνὸς τιμᾶται ὁ πήχυς 5 δραχμὰς, τοῦ δὲ ἄλλου 3. Πόσους πήχεις θὰ ἀγοράσῃ ἐκ τοῦ πρώτου ὑφάσματος καὶ πόσους ἐκ τοῦ δευτέρου;

Ἐὰν παραστήσωμεν διὰ τοῦ  $\chi$  τοὺς πήχεις τοῦ πρώτου, οἱ τοῦ δευτέρου θὰ εἶναι  $12 - \chi$ .

Ἐπειδὴ εἷς πήχυς τοῦ πρώτου ἀξίζει 5 δραχμὰς, οἱ  $\chi$  πήχεις ἀξίζουν  $5\chi$  δραχμὰς.

Ἐπειδὴ εἷς πήχυς τοῦ δευτέρου ἀξίζει 3 δραχμὰς, οἱ  $12 - \chi$  πήχεις ἀξίζουν  $3 \cdot (12 - \chi)$ .

Καὶ ἐπειδὴ ἡ ὅλικὴ ἀξία τῶν πήχεων εἶναι 55 δραχμαί, συνάγεται ἡ ἐξίσωσις

$$5\chi + 3(12 - \chi) = 55.$$

πρέπει δὲ οἱ ἀριθμοὶ τῶν πήχεων νὰ εἶναι ἀμφότεροι θετικοί.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 9\frac{1}{2}$  καὶ  $12 - \chi = 2\frac{1}{2}$ .

ἡ δὲ λύσις αὕτη εἶναι παραδεκτὴ, ὡς πληροῦσα πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

125. Εἰς 32 λίτρας θαλασσίου ὕδατος περιέχεται 1 λίτρα ἄλατος. Πόσον γλυκὸ ὕδωρ πρέπει νὰ προσιεθῇ εἰς αὐτό, ἵνα τεσσαράκοντα λίτραι τοῦ κράματος περιέχωσιν  $\frac{1}{5}$  τῆς λίτρας ἄλατος ;



Ἄς προστεθῶσι  $\chi$  λίτραι γλυκέος ὕδατος· ὅτε τὸ κράμα θὰ ἔχη λίτρας  $\chi + 32$ . Ἐπειδὴ αἱ 40 λίτραι τοῦ κράματος περιέχουσιν  $\frac{1}{5}$  τῆς λίτρας ἄλατος, ἢ μία λίτρα τοῦ κράματος θὰ περιέχη ἄλατος  $\frac{1}{200}$  τῆς λίτρας, καὶ τὸ ὅλον κράμα, ἦτοι αἱ  $32 + \chi$  λίτραι, θὰ περιέχωσιν ἄλατος λίτρας  $\frac{32 + \chi}{200}$ , ἀλλὰ τὸ ἐν τῷ κράματι ὑπάρχον ἄλας εἶναι μία

λίτρα· ὅθεν ἔπεται ἡ ἐξίσωσις  $\frac{32 + \chi}{200} = 1$ .

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ὁ  $\chi$  θετικὸς ἀριθμὸς.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 168$ · ἡ δὲ λύσις αὕτη πληροῦ τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

126. *Εἶπέ τις*: ἐὰν μοι τριπλασιάσῃ τις ὅσα ἔχω, δίδω εἰς αὐτὸν 27 δραχμάς, ἐξεπληρώθη ἡ αἰτησίς του τρις καὶ ἔχασε πάντα ὅσα εἶχε. Πόσα εἶχεν;

Ἐστῶσαν  $\chi$  αἱ δραχμαί, τὰς ὁποίας εἶχεν ἐν ἀρχῇ· τὸ ποσὸν τοῦτο ἐτριπλασιάσθη, ἦτοι ἔγινε  $3\chi$ , καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔδωκεν 27 δραχμάς. Λοιπὸν τῷ ἔμειναν δραχμαί  $3\chi - 27$ · ἔπειτα πάλιν ἐτριπλασιάσθη τὸ ποσὸν τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ τριπλασιασθέντος ἔδωκεν 27 δραχμάς· ὥστε τῷ ἔμειναν  $3(3\chi - 27) - 27$ , ἢ  $9\chi - 108$ .

Ὅμοίως μετὰ τὸν τρίτον τριπλασιασμὸν καὶ τὴν πληρωμὴν τῶν 27 δραχμῶν τῷ ἔμειναν  $27\chi - 351$ · ἐπειδὴ δὲ ἔχασεν ὅλα ὅσα εἶχε, θὰ εἶναι  $27\chi - 351 = 0$ .

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ὁ  $\chi$  θετικὸς ἀριθμὸς.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 13$ · ἡ δὲ λύσις αὕτη πληροῦ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

### Προβλήματα,

ἐν οἷς ὁ ἄγνωστος ἀνάγκη νὰ εἶναι ἀκέραιος καὶ θετικὸς ἀριθμὸς.

127. Δώδεκα ἄτομα (ἄνδρες καὶ γυναῖκες) ἐδαπάνησαν ὁμοῦ διὰ τὸ δεῖπνον 55 δραχμάς· καὶ τῶν μὲν ἀνδρῶν ἕκαστος ἐπλήρωσε 5 δραχμάς, τῶν δὲ γυναικῶν ἑκάστη 3. Πόσοι ἦσαν οἱ ἄνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναῖκες;

Εὐρεθέντος τοῦ πλήθους τῶν ἀνδρῶν, εὐρίσκεται ἀμέσως καὶ τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν. Ἐστῶ λοιπὸν  $\chi$  ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν, τότε ὁ τῶν γυναικῶν θὰ εἶναι  $12 - \chi$ .

Ἐπειδὴ ἕκαστος τῶν ἀνδρῶν ἐπλήρωσε 5 δραχμάς, οἱ  $\chi$  ἄνδρες ἐπλήρωσαν δραχμάς  $5\chi$ .

Ἐπειδὴ ἕκαστη τῶν γυναικῶν ἐπλήρωσε 3 δραχμάς, αἱ  $(12-\chi)$  γυναῖκες ἐπλήρωσαν  $3(12-\chi)$ .

Καὶ ἐπειδὴ ἡ ὅλη δαπάνη τοῦ δεῖπνου εἶναι 55 δραχμαί, ἔπεται ἡ ἐξίσωσις

$$5\chi + 3(12 - \chi) = 55.$$

πρέπει δὲ καὶ ὁ τῶν ἀνδρῶν καὶ ὁ τῶν γυναικῶν ἀριθμὸς νὰ εἶναι ἀκέραιοι καὶ θετικοί.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 9\frac{1}{2}$  καὶ  $12 - \chi = 2\frac{1}{2}$ .

ἄλλ' ἡ λύσις αὕτη ἀπορρίπτεται, ὡς μὴ πληροῦσα πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

128. Ἐρωτηθεὶς τις, πόσα τέκνα ἔχει, ἀπεκρίθη· ἀγοράσας μῆλα ἠθέλησα νὰ δώσω 7 εἰς ἕκαστον τέκνον μου, ἀλλὰ μοῦ ἔλειψαν 4, τότε ἔδωκα 4 μῆλᾶ εἰς ἕκαστον καὶ μοῦ ἐπερίσσευσαν 3. Πόσα τέκνα εἶχεν ὁ ἄνθρωπος οὗτος;

Ἐστω  $\chi$  ὁ ἀριθμὸς τῶν τέκνων· κατὰ τὴν πρώτην διανομὴν ἦσαν τὰ μῆλα  $7\chi - 4$ · κατὰ δὲ τὴν δευτέραν  $4\chi + 3$ · καὶ ἐπειδὴ ὁ ἀριθμὸς τῶν μῆλων ἦτο ὁ αὐτὸς κατ' ἀμφοτέρως τὰς διανομὰς, ἔπεται

$$7\chi - 4 = 4\chi + 3.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ὁ  $\chi$  θετικὸς καὶ ἀκέραιος ἀριθμὸς.

Ἡ ἐκ τῆς ἐξίσωσεως ταύτης προκύπτουσα λύσις  $\chi = 2\frac{1}{3}$  ἀπορρίπτεται ὡς μὴ πληροῦσα τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

129. Εὐρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις εἴτε διὰ 7 εἴτε διὰ 9 διαιρεθῆ νὰ ἀφίνη ἐπόλοιπον 3, τὰ δὲ δύο πηλίκᾶ νὰ διαφέρωσι κατὰ 4.

Ἐστω  $\chi$  ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς· ἐπειδὴ διαιρούμενος διὰ τοῦ 7 ἢ διὰ τοῦ 9 ἀφίνει ἐπόλοιπον 3, ἔπεται, ὅτι κατὰ 3 ἐλαττούμενος διαιρεῖται ἀκριβῶς καὶ ὑπὸ τοῦ 7 καὶ ὑπὸ τοῦ 9· καὶ τὰ πηλίκᾶ εἶναι

$\frac{\chi-3}{7}$  καὶ  $\frac{\chi-3}{9}$ . Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα διαφέρουσι κατὰ 4, ἔπεται ἡ ἐξί-

σωσις

$$\frac{\chi-3}{7} - \frac{\chi-3}{9} = 4.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ὁ  $\chi$  ἀκέραιος καὶ θετικὸς ἀριθμὸς.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 129$ · ἡ δὲ λύσις αὕτη πληροῖ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

### Προβλήματα,

ἐν οἷς ὁ ἄγνωστος ἀνάγκη νὰ περιεχῆται μεταξὺ ὁρίων τινῶν.

130. Ὅταν ἐργάται ἐξετέλεσαν τὸ  $\frac{1}{5}$  ἔργου τινὸς ἐργαζόμενοι 4 ὥρας καθ' ἡμέραν ἐπὶ 9 ἡμέρας· πόσας ὥρας πρέπει νὰ ἐργάζωνται καθ' ἡμέραν 15 ἐργάται, ἵνα ἀποπεραιώσωσι τὸ ἔργον εἰς 3 ἡμέρας;

Ἐστω  $\chi$  ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς τῶν ὥρων. Ἐπειδὴ ἕκαστος τῶν 15 ἐργατῶν θὰ ἐργάζεται  $\chi$  ὥρας τὴν ἡμέραν, εἰς τρεῖς ἡμέρας θὰ ἐργασθῆ 3 $\chi$  ὥρας· χρειάζονται λοιπὸν οἱ 15 ἐργάται διὰ τὰ μένοντα  $\frac{4}{5}$  τοῦ ἔργου 3 $\chi$  ὥρας· ἐπομένως εἰς μόνος ἐργάτης θὰ χρειασθῆ διὰ τὰ αὐτὰ  $\frac{4}{5}$  τοῦ ἔργου 15πλάσιον χρόνον ἤτοι 15·3· $\chi$ .

Ἀφ' ἐτέρου οἱ 8 ἐργάται διὰ τὸ  $\frac{1}{5}$  τοῦ ἔργου χρειάζονται ὥρας 4·9· ἐπομένως εἰς μόνος χρειάζεται (διὰ τὸ  $\frac{1}{5}$ ) 4·9·8 ὥρας, καὶ διὰ τὰ  $\frac{4}{5}$  χρειάζεται ὥρας 4·9·8·4. Ἐξισοῦντες δὲ τὰς ὥρας, τὰς ὁποίας χρειάζεται εἰς ἐργάτης διὰ τὰ  $\frac{4}{5}$  τοῦ ἔργου, εὐρίσκομεν

$$15 \cdot 3\chi = 4 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 4.$$

πρέπει δὲ ὁ  $\chi$  νὰ εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς καὶ νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὸν 24· διότι τοιοῦτον εἶναι φύσει τὸ ζητούμενον.

Ἄλλ' ἡ ἐξίσωσις λυομένη δίδει  $\chi = 25\frac{3}{5}$ . ἐπομένως ἡ λύσις αὕτη ἀπορρίπτεται ὡς μὴ πληροῦσα τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος· ὥστε τὸ προτεινόμενον εἶναι ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθῆ.

131. Αἱ ἡλικίαι δύο ἀνθρώπων εἶναι τοῦ μὲν 50, τοῦ δὲ 60 ἔτη. Ζητεῖται πότε ἡ ἡλικία τοῦ πρώτου θὰ εἶναι ἡ ἡτο πρὸς τὴν τοῦ δευτέρου ὡς ὁ 40 πρὸς τὸν 41.

Αἱ παραστάσεις  $50 + \chi$  καὶ  $60 + \chi$  ἐκφράζουσι τὰς ἡλικίας τῶν ἀνθρώπων μετὰ παρέλευσιν  $\chi$  ἐτῶν· ἀλλ' αἱ αὐταὶ παραστάσεις ἐκφράζουσι καὶ τὰς ἡλικίας αὐτῶν πρὸ  $\chi$  ἐτῶν, ἂν τὰ παρελθόντα ἔτη σημαίνωνται ὑπὸ ἀρνητικῶν ἀριθμῶν. Ἐπομένως ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\frac{50 + \chi}{60 + \chi} = \frac{40}{41}.$$

πρέπει δὲ ὁ ἀριθμὸς  $50 + \chi$  ὡς ἀριθμὸς ἡλικίας νὰ εἶναι θετικὸς, καὶ ὁ  $60 + \chi$  (ἢ μεγαλητέρα ἡλικία) νὰ μὴ ὑπερβαίνει τὴν δυνατὴν ἡλικίαν τοῦ ἀνθρώπου. (Ἐκ τοῦ προβλήματος τούτου βλέπομεν, ὅτι οἱ περιορισμοὶ ἐνίοτε δὲν δύνανται νὰ ἐκφρασθῶσιν ἀκριβῶς).

Ἡ ἐξίσωσις λυομένη δίδει  $\chi = 350$ . ἀλλὰ μετὰ παρέλευσιν 350 ἐτῶν οὐδέτερος τῶν ἀνθρώπων θὰ ζῆ. ὥστε ἡ λύσις αὕτη εἶναι ἀπορριπτέα καὶ τὸ προτεινόμενον εἶναι ἀδύνατον ἐν τοῖς πράγμασιν.

132. Πατήρ τις εἶναι 37 ἐτῶν, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ 9· πότε ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς ἦτο ἢ θὰ εἶναι διπλασία τῆς τοῦ υἱοῦ;

Παριστῶντες διὰ τοῦ  $\chi$  τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν (θετικὸν μὲν, ἂν τὰ ἔτη εἶναι τοῦ μέλλοντος χρόνου, ἀρνητικὸν δέ, ἂν τοῦ παρελθόντος) εὐρίσκομεν τὴν ἐξίσωσιν

$$37 + \chi = 2(9 + \chi).$$

οἱ δὲ περιορισμοὶ εἶναι ὅμοιοι τοῖς τοῦ προηγουμένου προβλήματος.

Ἡ ἐξίσωσις αὕτη λυομένη δίδει  $\chi = 19$ . ἡ δὲ λύσις αὕτη εἶναι παραδεκτὴ ὡς πληροῦσα τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

133. Νὰ μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς 56 εἰς δύο μέρη τοιαῦτα, ὥστε τὸ μεγαλύτερον διὰ τοῦ μικροτέρου διαιρεθὲν νὰ παρέχῃ πηλίκον 5 καὶ ὑπόλοιπον 2.

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\chi$  παραστήσωμεν τὸ μικρότερον τῶν μερῶν, τὸ μεγαλύτερον θὰ εἶναι  $56 - \chi$ . ἐπειδὴ δὲ τοῦτο διαιρούμενον διὰ τοῦ  $\chi$  ἀφίνει ὑπόλοιπον 2, ἔπεται, ὅτι κατὰ δύο ἐλαττωθὲν διαιρεῖται ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ  $\chi$  καὶ παρέχει πηλίκον 5· τοῦτ' ἔστι

$$\frac{56 - \chi}{\chi} = 5.$$

πρέπει δὲ ἀμφότερα τὰ μέρη νὰ εἶναι θετικοὶ καὶ ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Ἡ ἐξίσωσις λυομένη δίδει  $\chi = 9$ . ἔθεν τὰ ζητούμενα μέρη τοῦ 56 εἶναι 9 καὶ 47· ἡ δὲ λύσις αὕτη πληροὶ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

134. Νὰ μερισθῇ ὁ 51 εἰς δύο μέρη τοιαῦτα, ὥστε τὸ τρίτον τοῦ πρώτου καὶ τὸ πέμπτον τοῦ δευτέρου νὰ ἀποτελῶσι τὸν 21.

Ἐστω  $\chi$  τὸ πρῶτον μέρος· τότε τὸ δεύτερον θὰ εἶναι  $51 - \chi$ · εἶναι δέ, ὡς δηλοῖ ἡ ἐκφώνησις τοῦ προβλήματος,

$$\frac{\chi}{3} + \frac{51 - \chi}{5} = 21.$$

πρέπει δὲ ὁ  $\chi$  νὰ εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς καὶ μικρότερος τοῦ 51.

Ἡ ἐξίσωσις λυομένη δίδει  $\chi = 81$ . ἐπομένως ἡ λύσις αὕτη ἀπορριπτεται ὡς μὴ πληροῦσα πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

Εἰς τὰ 9 τέκνα του ἔδωκεν ἄνθρωπός τις 53 δραχμάς καὶ ἕκαστον μὲν κοράσιον ἔλαβε 5 δραχμάς, ἕκαστος δὲ υἱὸς 3· πόσοι ἦσαν οἱ υἱοὶ καὶ πόσα τὰ κοράσια;

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\chi$  παραστήσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν κορασιῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν θὰ εἶναι  $9-\chi$ .

Ἐπειδὴ δὲ ἕκαστον κοράσιον ἔλαβε 5 δραχμάς, τὰ  $\chi$  κοράσια ἔλαβον  $5\chi$  δραχμάς.

Καὶ ἐπειδὴ ἕκαστος υἱὸς ἔλαβε 3 δραχμάς, οἱ  $9-\chi$  υἱοὶ ἔλαβον  $3(9-\chi)$  δραχμάς.

Ἄλλ' ὅλα ὁμοῦ τὰ τέκνα ἔλαβον 53 δραχμάς· ὅθεν συνάγεται ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος

$$5\chi + 3(9-\chi) = 53.$$

πρέπει δὲ ὁ ἀριθμὸς  $\chi$  νὰ εἶναι ἀκέραιος καὶ θετικὸς καὶ μικρότερος τοῦ 9.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = 13$ · ἡ δὲ λύσις αὕτη ἀπορρίπτεται ὡς μὴ πληροῦσα τοὺς περιορισμοὺς τοῦ προβλήματος· τὸ πρόβλημα λοιπὸν εἶναι ἀδύνατον· (τὸ ἀδύνατον τοῦ προβλήματος γίνεται φανερὸν καὶ ἐκ τούτου, ὅτι, καὶ ἂν ἦσαν κοράσια ὅλα τὰ τέκνα, πάλιν θὰ ἐλάμβανον μόνον 45 δραχμάς καὶ ὄχι 53).

135. Δύο πίθοι περιέχουσιν ὁ μὲν 400 ὀκάδας οἴνου, ὁ δὲ 280· ἐὰν ἀνοιχθῶσιν αἱ στρόφιγγες αὐτῶν, ἐκρέουσιν ἐκ μὲν τοῦ πρώτου 9 ὀκάδες τὴν ὥραν, ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου 7. Ζητεῖται, ἂν ἀνοιχθῶσι συγχρόνως ἀμφότεραι αἱ στρόφιγγες, μετὰ πόσας ὥρας θὰ ὑπολειφθῶσιν ἐν τοῖς πίθοις ἴσα ποσὰ οἴνου.

Ἐστω μετὰ  $\chi$  ὥρας· τότε θὰ περιέχωνται ἐν μὲν τῷ πρώτῳ  $400-9\chi$ , ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ  $280-7\chi$ · ὥστε θὰ εἶναι

$$400-9\chi = 280-7\chi.$$

πρέπει δὲ ὁ ἀριθμὸς  $\chi$  νὰ εἶναι θετικὸς καὶ νὰ καθιστᾷ ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ἐξίσωσεως θετικὰ· διότι μετὰ τὴν παρέλευσιν τῶν  $\chi$  ὥρῶν πρέπει νὰ μένη πράγματι οἶνος ἐν τοῖς πίθοις.

Ἡ ἐξίσωσις λυομένη δίδει  $\chi = 60$ · ἀλλὰ μετὰ 60 ὥρας οὐδέτερος τῶν πίθων περιέχει οἶνον· διότι ὁ μὲν πρῶτος κενοῦται εἰς  $\frac{400}{9}$  ὥρας, ὁ δὲ δεύτερος εἰς 40· ἐπομένως ἡ λύσις αὕτη ἀπορρίπτεται καὶ τὸ προτεινόμενον δὲν δύναται νὰ πραγματοποιηθῇ.

136. Δύο ἄνθρωποι ἔχουσιν ὁ μὲν 100, ὁ δὲ 50 δραχμάς· δαπανῶσι δὲ καθ' ἑκάστην ὁ μὲν πρῶτος 3 δραχμάς, ὁ δὲ δεύτερος 2· μετὰ πόσας ἡμέρας θὰ ἔχωσιν ἴσας δραχμάς;

Ἐστω μετὰ  $\chi$  ἡμέρας· τότε ὁ μὲν πρῶτος θὰ ἔχη  $100 - 3\chi$ , ὁ δὲ δεύτερος  $50 - 2\chi$ , καὶ θὰ εἶναι  $100 - 3\chi = 50 - 2\chi$ .

πρέπει δὲ ὁ  $\chi$  νὰ εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς καὶ νὰ καθιστᾷ ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ἐξίσωσως θετικά· διότι μετὰ τὴν παρέλευσιν τῶν  $\chi$  ἡμερῶν πρέπει νὰ ἔχωσιν ἀμφότεροι ποσὸν τι δραχμῶν.

Ἡ ἐξίσωσις λυομένη δίδει  $\chi = 50$ · ἀλλ' ἡ λύσις αὕτη ἀπορρίπτεται· διότι οὐδέτερος τῶν ἀνθρώπων ἔχει τι μετὰ 34 ἡμέρας· ὥστε τὸ προτεινόμενον εἶναι ἀδύνατον ἐν τοῖς πράγμασιν.

### Παρατήρησις.

137. Ἐκ τῶν προηγουμένων γίνεται καταφανές, ὅτι ἡ ἐξίσωσις μόνη δὲν ἐξαρκεῖ συνήθως εἰς τὴν πιστὴν καὶ τελείαν ἀλγεβρικὴν ἔκφρασιν τοῦ προβλήματος· ἀλλ' εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπιβάλλωνται ἐπὶ τοῦ ἀγνώστου καὶ περιορισμοὶ τινες, ἧτοι ὅροι ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ἀγνώστου ποσοῦ πηγάζοντες καὶ ὅλως ἄσχετοι ὄντες πρὸς τὴν διὰ τῆς ἐξίσωσως ἐκφραζομένην σχέσιν τῶν γνωστῶν πρὸς τὸν ἀγνωστον. Καὶ πάντα τὰ προβλήματα, ἐν οἷς ἡ σχέσις τοῦ γνωστοῦ πρὸς τὸν ἀγνωστον εἶναι ἡ αὐτή, ἄγουσιν εἰς τὴν αὐτὴν ἐξίσωσιν, οἷαςδὴποτε φύσεως ποσὰ καὶ ἂν περιέχωσι (τοιαῦτα λ. χ. εἶναι τὰ προβλήματα τῶν ἐδαφίων 124 καὶ 127), δύνανται ὅμως νὰ διαφέρωσι κατὰ τοὺς περιορισμούς. Πόσον δὲ σπουδαίως ἐπιδρῶσιν οἱ περιορισμοὶ εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, ἐμάθομεν ἐκ τῶν λυθέντων προβλημάτων.

Πολλάκις εἶναι δυνατὸν δι' ἐλαφροῦς τινος μεταβολῆς ἢ γενικεύσεως τῶν ὄρων τοῦ προβλήματος νὰ ἄρωμεν τοὺς περιορισμούς, ἢ νὰ καταστήσωμεν αὐτοὺς ὀλιγώτερον στενοῦς, ὥστε ἡ ἐκ τῆς ἐξίσωσως εὕρισκομένη λύσις νὰ εἶναι ἐφαρμοστή. Οὕτως ἐν τῷ τελευταίῳ προβλήματι, ἂν παραδεχθῶμεν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν, ἃς θὰ ἔχωσιν οἱ ἄνθρωποι, δύναται καὶ ἀρνητικὸν νὰ εἶναι ἢτοι ἀντὶ περισυίας νὰ ἔχωσιν ἴσον χρέος, ὁ περιορισμὸς ἐπὶ τοῦ ἀγνώστου αἴρεται καὶ ἡ εὕρισκομένη λύσις εἶναι ἐφαρμοστή. Ὅμοίως ἐν τοῖς προβλήμασι τῶν ἐδαφίων 131 καὶ 132 παρεδέχθημεν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι τὸ προτεινόμενον δύναται νὰ γίνῃ ἢ εἰς τὸ παρελθὸν ἢ εἰς τὸ μέλλον. Αἱ γενικεύσεις αὗται τῶν ὄρων τοῦ προβλήματος δέον εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς νὰ γίνωνται πρὸ τῆς συντάξεως τῆς ἐξίσωσως· οὐχὶ δὲ νὰ λύωμεν πρῶτον τὴν ἐξίσωσιν καὶ ἔπειτα νὰ ζητῶμεν τὴν σημασίαν τῆς τοιαύτης ἢ τοιαύτης τιμῆς τοῦ ἀγνώστου· διότι ὁ ἀγνωστος δὲν δύναται βεβαίως διὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκτελεσθεισῶν πράξεων νὰ ἀποκτήσῃ ποτὲ σημασίαν, τὴν ὁποίαν ἡμεῖς ἐξ ἀρχῆς δὲν ἐδώκαμεν εἰς αὐτόν.

### Προβλήματα γενικά.

138. "Όταν τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος εἶναι ἀριθμοί, ἐπὶ τοῦ εὐρεθέντος ἀγνώστου ἀριθμοῦ οὐδὲν ἔχνος τῶν πρὸς εὔρεσιν αὐτοῦ γενομένων πράξεων σφύζεται. Ἄλλ' ἐν τῇ ἀλγέβρα, ἐπειδὴ οἱ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν γινόμενοι συλλογισμοὶ εἶναι ἀδιάφοροι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν ἀριθμῶν καὶ πρὸς τὸ εἶδος αὐτῶν, (ὡς στηριζόμενοι ἐπὶ τῶν γενικῶν σχέσεων τῶν ἀριθμῶν), δύναται ἕκαστος τῶν δοθέντων ἀριθμῶν νὰ παριστᾶται δι' ἐνὸς γράμματος καὶ τότε τὰ γράμματα ταῦτα διασφύζονται μέχρι τέλους ἐν τῇ λύσει καὶ εὐρίσκονται ἐπ' αὐτῶν σεσημειωμένοι αἱ πράξεις, αἵτινες πρέπει νὰ ἐκτελεσθῶσιν ἐπ' αὐτῶν, ἵνα εὐρεθῇ ἐξ αὐτῶν ὁ ἀγνώστος. Τοῦτο δὲ καὶ τὴν ἐξάρτησιν τοῦ ἀγνώστου ἀπὸ τῶν γνωστῶν σαφεστῆραν ποιεῖ καὶ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος καθιστᾷ γενικὴν, δηλαδὴ ἀρμόζουσαν εἰς πάντα τὰ προβλήματα, ὅσα μόνον κατὰ τὸ μέγεθος (ἢ καὶ τὸ εἶδος) τῶν δεδομένων ἀριθμῶν διαφέρουσι.

Πρόβλημα, οὗτινος τὰ δεδομένα παρίστανται διὰ γραμμάτων, λέγεται γενικόν.

139. Ἡ ἐκ τῆς λύσεως γενικοῦ προβλήματος προκύπτουσα τιμὴ τοῦ ἀγνώστου περιέχει ἐν γένει τὰ γράμματα, δι' ὧν παρίστανται τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος· ὥστε εἶναι ἀλγεβρικὴ πηράστασις ἢ τύπος· κατὰ τὰς διαφοροὺς δὲ τιμὰς τῶν γραμμάτων τούτων ἢ κατὰ τὰς διαφοροὺς ὑποθέσεις, τὰς ὁποίας κάνομεν περὶ αὐτῶν, δύναται τὸ πρόβλημα νὰ καθιστᾶται δυνατὸν ἢ ἀδύνατον ἢ ἀόριστον. Ἡ ἔρευνα τῶν διαφορῶν τούτων περιπτώσεων λέγεται διερεύνησις τοῦ γενικοῦ προβλήματος.

Παραδείγματα τοιούτων προβλημάτων καὶ τῆς διερεύνησεως αὐτῶν ἔστωσαν τὰ ἐπόμενα.

1ον

140. Πατήρ τις εἶναι  $\alpha$  ἐτῶν, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ  $\beta$ . Πότε ἢ ἡλικία τοῦ πατρὸς θὰ εἶναι, ἢ πότε ἦτο, διπλασία τῆς ἡλικίας τοῦ υἱοῦ;

Ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος τούτου εἶναι (παραβλ. ἐδ. 132)

$$\alpha + \chi = 2(\beta + \chi).$$

**Περιορισμοί.** Οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$ ,  $\beta$  καὶ  $\beta + \chi$ , ὡς ἀριθμοὶ ἡλικίας, πρέπει νὰ εἶναι θετικοί· νὰ εἶναι δὲ καὶ  $\alpha > \beta$ . μηδὲ πρέπει νὰ ὑπερβαίῃ τις ἐξ αὐτῶν τὴν δυνατὴν ἡλικίαν τῶν ἀνθρώπων.

Ἐκ τῆς ἐξίσωσεως εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ ἀγνώστου.

$$\chi = \alpha - 2\beta.$$

**Διερεύνησις.** Ἐάν εἶναι  $\alpha < 2\beta$ , ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$  εἶναι ἀρνητικὴ τοῦτ' ἔστι τὸ προτεινόμενον συνέβη εἰς τὸ παρελθόν· εἶναι δὲ παραδεκτὴ ἢ λύσις αὕτη· διότι αἱ ἡλικίαι ἦσαν τότε

$$\alpha + (\alpha - 2\beta) \quad \text{καὶ} \quad \beta + (\alpha - 2\beta),$$

ἤτοι  $2(\alpha - \beta)$  καὶ  $\alpha - \beta$  καὶ εἶναι ἀμφότεραι θετικαί.

Ἐάν δὲ εἶναι  $\alpha > 2\beta$ , ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$  εἶναι θετικὴ· τοῦτ' ἔστι τὸ προτεινόμενον θὰ γίνῃ εἰς τὸ μέλλον, ὅταν ὁ μὲν πατήρ θὰ εἶναι  $2(\alpha - \beta)$  ἐτῶν, ὁ δὲ υἱὸς  $\alpha - \beta$ · εἶναι δὲ παραδεκτὴ ἢ λύσις αὕτη, ἔάν ἡ μεγαλύτερα ἡλικία  $2(\alpha - \beta)$  δὲν ὑπερβαίνῃ τὴν δυνατὴν ἡλικίαν τῶν ἀνθρώπων.

2ον

141. Ἐργάτης χρειάζεται  $\alpha$  ὥρας, ἵνα τελειώσῃ ἔργον  $\iota$ , δεῦτερος ἐργάτης χρειάζεται  $\beta$  ὥρας διὰ τὸ αὐτὸ ἔργον καὶ τρίτος  $\gamma$  ὥρας· εἰς πόσας ὥρας οἱ τρεῖς ἐργάται ὁμοῦ θὰ τελειώσωσι τὸ ἔργον;

**Περιορισμοί.** Οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ὡς καὶ ὁ  $\chi$ , πρέπει νὰ εἶναι πάντες θετικοί.

Ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος εἶναι (παρβλ. ἐδ. 118)

$$\frac{\chi}{\alpha} + \frac{\chi}{\beta} + \frac{\chi}{\gamma} = 1.$$

καὶ λύοντες εὐρίσκομεν  $\chi = \frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}$ .

εἶναι δὲ ἡ λύσις αὕτη παραδεκτὴ.

3ον

142. Εὐρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις ἀφαιρούμενος ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν ὄρων τοῦ κλάσματος  $\frac{\alpha}{\beta}$  νὰ καθιστᾷ αὐτὸ ἴσον τῷ κλάσματι  $\frac{\gamma}{\delta}$ .

**Περιορισμοί.** Οἱ παρονομασταὶ  $\beta$  καὶ  $\delta$  τῶν δοθέντων κλασμάτων πρέπει νὰ διαφέρωσι τοῦ 0.

Ἡ δὲ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\frac{\alpha - \chi}{\beta - \chi} = \frac{\gamma}{\delta}$$

ἐξ ἧς ἔπεται, ἂν ὑποθέσωμεν τὸν ἀριθμὸν  $\beta - \chi$  διάφορον τοῦ 0,

$$\chi(\gamma - \delta) = \beta\gamma - \alpha\delta. \quad (1)$$

Ἐάν ὑποθέτοντες τὴν διαφορὰν  $\gamma - \delta$  διάφορον τοῦ μηδενός, ταυτέστι τὸ δοθὲν κλάσμα  $\frac{\gamma}{\delta}$  διάφορον τῆς μονάδος 1, εὐρίσκομεν

$$\chi = \frac{\beta\gamma - \alpha\delta}{\gamma - \delta}. \quad (2)$$



**Διερεύνησις.** Πλὴν τῶν δύο περιπτώσεων, τὰς ὁποίας ἐξηρέσαμεν, ἵνα φθάσωμεν εἰς τὴν λύσιν ταύτην, εἰς πάσας τὰς λοιπὰς ἡ λύσις εἶναι παραδεκτὴ.

Ἐὰν εἶναι  $\gamma = \delta$ , ἡ ἐξίσωσις (1) γίνεται  $0 = \gamma(\beta - \alpha)$ , καὶ τὸ προτεινόμενον εἶναι ἐπομένως ἀδύνατον, ἂν δὲν εἶναι καὶ  $\alpha = \beta$ . ἂν δὲ καὶ τοῦτο συμβαίη, ἡ ἐξίσωσις (1) καταντᾷ  $0 = 0$  καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ἀόριστον, ἥτοι πᾶς ἀριθμὸς ποιεῖ τὸ ζητούμενον.

Ἐάν ποτε ὁ τύπος (2) δῶσῃ  $\chi = \beta$ , ἡ λύσις αὕτη πρέπει νὰ ἀπορριφθῇ· διότι  $\beta - \chi$  ὑπετέθη (ἵνα ἐξελειφθῶσιν οἱ παρονομασται) διάφορον τοῦ 0· τοῦτο συμβαίνει, ὅταν εἶναι  $\alpha = \beta$ . τουτέστιν, ὅταν τὸ δοθὲν κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$  εἶναι ἴσον τῇ μονάδι 1· καὶ ὄντως τότε ὁ τύπος γίνεται

$$\chi = \frac{\beta(\gamma - \delta)}{\gamma - \delta} = \beta.$$

ὅτι δὲ τότε τὸ προτεινόμενον εἶναι ἀδύνατον, βλέπει τις εὐκόλως

4<sup>ον</sup>

143. *Εὑρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις ἀφαιρούμενος ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν ὄρων τοῦ κλάσματος  $\frac{\alpha}{\beta}$  νὰ καθιστᾷ αὐτὸ ἴσον τῷ ἀντιστρόφῳ αὐτοῦ.*

Ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος εἶναι  $\frac{\alpha - \chi}{\beta - \chi} = \frac{\beta}{\alpha}$ .

**Περιορισμός.** Ὁ  $\beta$  πρέπει νὰ διαφέρῃ τοῦ 0, ὁμοίως καὶ ὁ  $\alpha$ .

Ὅθεν ὑποθέτοντες τὸν παρονομαστήν  $\beta - \chi$  διάφορον τοῦ 0, ἥτοι  $\chi$  διάφορον τοῦ  $\beta$ , εὐρίσκομεν  $(\alpha - \beta)\chi = \alpha^2 - \beta^2$ . (1)

Καὶ ἂν  $\alpha - \beta$  διαφέρῃ τοῦ 0, τουτέστιν ἂν τὸ δοθὲν κλάσμα διαφέρῃ τῆς μονάδος 1, ἔχομεν  $\chi = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha - \beta}$  ἥτοι  $\chi = \alpha + \beta$ . (2)

**Διερεύνησις.** Ἡ λύσις αὕτη ἀρμόζει εἰς πᾶσαν περίπτωσιν πλὴν τῶν δύο ἐξαιρεθεῶν. Καὶ ἂν μὲν εἶναι  $\alpha = \beta$ , ἡ ἐξίσωσις (1) γίνεται  $0 = 0$ . ὅθεν πᾶς ἀριθμὸς ποιεῖ τὸ ἐπιταχθὲν καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ἀόριστον. Ἡ δὲ ἐξαιρεθεῖσα λύσις  $\chi = \beta$  τότε μόνον διδεται ὑπὸ τοῦ τύπου (2), ὅταν  $\alpha = 0$ , ὅτε προδήλως τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον.

5<sup>ον</sup>

144. *Εὑρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις ἀφαιρούμενος ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν ὄρων τοῦ δοθέντος κλάσματος  $\frac{\alpha}{\beta}$  καθιστᾷ αὐτὸ ἴσον τῷ τετραγώνῳ αὐτοῦ.*

**Περιορισμός.** Ὁ παρονομαστής  $\beta$  διαφέρει τοῦ 0.

Ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\frac{\alpha - \chi}{\beta - \chi} = \frac{\alpha^2}{\beta^2}$$

ὅθεν ὑποθέτοντες  $\beta - \chi$  διάφορον τοῦ 0, εὐρίσκωμεν

$$(\alpha^2 - \beta^2)\chi = \alpha\beta(\alpha - \beta). \quad (1)$$

Καὶ ἂν  $(\alpha^2 - \beta^2)$  διαφέρει τοῦ 0, ἔπεται ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$

$$\chi = \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta}. \quad (2)$$

**Διερεύνησις.** Ἡ λύσις αὕτη ἀρμόζει εἰς πᾶσαν περίπτωσιν, πλὴν τῶν δύο ἐξαιρηθεισῶν.

Ἄν εἶναι  $\alpha^2 = \beta^2$ , θὰ εἶναι ἢ  $\alpha = \beta$ , ἢ  $\alpha = -\beta$ · διότι καὶ τῶν ἀντιθέτων ἀριθμῶν τὰ τετράγωνα εἶναι ἴσα· καὶ ἂν μὲν εἶναι  $\alpha = \beta$ , ἡ ἐξίσωσις (1) γίνεται  $0 = 0$  καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ἀόριστον, ἦτοι πᾶς ἀριθμὸς ποιεῖ τὸ ἐπιταχθέν· ἂν δὲ εἶναι  $\alpha = -\beta$ , ἡ αὐτὴ ἐξίσωσις γίνεται  $0 = 2\beta^3$ , καὶ ἐπομένως τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον.

Ἡ ἐξαιρηθεῖσα λύσις  $\chi = \beta$  οὐδέποτε δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου (2)· διότι, ἂν ἦτο  $\frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} = \beta$ , θὰ ἦτο καὶ  $\alpha\beta = \alpha\beta + \beta^2$ · ὅθεν καὶ  $\beta^2 = 0$ , ἦτοι  $\beta = 0$ · ὅπερ ἐναντίον τῇ ὑποθέσει.

### Παρατηρήσεις.

145. Ἐκ τῶν δύο τελευταίων προβλημάτων βλέπομεν, ὅτι δύναται πρόβλημά τι, κατὰ τινα ὑπόθεσιν ἐπὶ τῶν δεδομένων αὐτοῦ, νὰ καταντᾷ ἀόριστον (τουτέστι νὰ λύηται ὑπὸ παντός ἀριθμοῦ), κατὰ πᾶσαν δὲ ἄλλην ὁσονδήποτε ὀλίγον διαφέρουσαν ὑπόθεσιν νὰ ἔχῃ λύσιν ἐντελῶς ὠρισμένην.

Δυνατὸν δὲ εἶναι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει νὰ ζητηθῇ πρὸς ποίαν τιμὴν πλησιάζει ἡ τιμὴ τοῦ ἀγνώστου, ὅταν τὰ δεδομένα πλησιάζωσι πρὸς τὴν κατάστασιν ἐκείνην, ἣτις καθιστᾷ τὸ πρόβλημα ἀόριστον.

Τὴν τοιαύτην τιμὴν τοῦ ἀγνώστου πκρέχει ὁ γενικὸς τύπος τῆς τιμῆς αὐτοῦ, ἀφοῦ ἐξαλειφθῇ ὁ τὴν ἐξίσωσιν μηδενίζων καὶ τὴν λύσιν ἀόριστον καθιστῶν κοινὸς παράγων, ἐὰν τοιοῦτος παράγων ὑπάρχῃ. Οὕτως ἐν τῷ τελευταίῳ προβλήματι ὁ τύπος (2) ἀληθεύει, ὁσονδήποτε ὀλίγον καὶ ἂν διαφέρωσι τὰ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  (ἀρκεῖ νὰ διαφέρωσι)· καὶ ἐξ αὐτοῦ φαίνεται, ὅτι, ὅσῳ πλησιάζουσι ταῦτα νὰ γίνωσιν ἴσα, τόσῳ ἡ τιμὴ τοῦ ἀγνώστου προσεγγίζει πρὸς τὸ  $\frac{\alpha \cdot \alpha}{\alpha + \alpha}$  ἦτοι τὸ  $\frac{\alpha}{2}$ . Ὅμοίως ἐν τῷ προβλήματι

τοῦ ἐδ. 143 φαίνεται ἐκ τοῦ τύπου (2), ὅτι ἡ τιμὴ τοῦ ἀγνώστου προσεγγίζει πρὸς τὸ  $2\alpha$ , ὅταν τὸ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  τείνωσι νὰ καταστῶσιν ἴσα.

146. Ὡσαύτως εἶναι δυνατόν κατὰ τινὰ ὑπόθεσιν ἐπὶ τῶν δεδομένων αὐτοῦ νὰ καθιστᾶται ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος ἀδύνατος, κατὰ πᾶσαν δὲ ἄλλην ὁσονδήποτε ὀλίγον διαφέρουσαν αὐτῆς νὰ ἔχῃ λύσιν ἐντελῶς ὠρισμένην. Οὕτως ἐν τῷ τελευταίῳ προβλήματι, ἂν ὑποθεθῇ  $\alpha = -\beta$ , ἡ ἐξίσωσις γίνεται ἀδύνατος· διὰ πᾶσαν δὲ ἄλλην ὑπόθεσιν μικρὸν αὐτῆς διαφέρουσαν ἡ ἐξίσωσις λύεται.

Ἐν τῇ τοιαύτῃ περιπτώσει, ὅσον τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος πλησιάζουσι πρὸς τὴν κατάστασιν ἐκείνην, ἣτις καθιστᾷ τὴν ἐξίσωσιν ἀδύνατον, τόσον ἡ τιμὴ τοῦ ἀγνώστου αὐξάνει καὶ δύναται νὰ ὑπερβῇ πάντα δοθέντα ἀριθμὸν.

Διότι, τῆς ἐξισώσεως ἀχθείσης εἰς τὴν μορφήν  $\alpha\chi = \beta$ , ἡ τιμὴ τοῦ ἀγνώστου εἶναι  $\chi = \frac{\beta}{\alpha}$  καὶ ὁ μὲν  $\alpha$  πλησιάζει τότε πρὸς τὸ 0, ὁ δὲ  $\beta$  πρὸς ἀριθμὸν διάφορον τοῦ 0. Ἀλλὰ κλάσμα, οὔτινος ὁ παρονομαστῆς πλησιάζει πρὸς τὸ 0, ὁ δὲ ἀριθμητῆς πρὸς ἄλλον ὁσονδήποτε ἀριθμὸν, αὐξάνει καὶ δύναται νὰ ὑπερβῇ πάντα δοθέντα ἀριθμὸν· διότι, ὅταν ὁ παρονομαστῆς γίνῃ  $\frac{1}{10}$ , τὸ κλάσμα γίνεται  $10\beta$ , ὅταν ὁ παρονομαστῆς γίνῃ  $\frac{1}{100}$ , τὸ κλάσμα γίνεται  $100\beta$ , ὅταν  $\frac{1}{1000}$ , τὸ κλάσμα γίνεται  $1000\beta$ · καὶ οὕτω καθεξῆς.

6ον

Ἐν τῇ ὁμαλῇ κινήσει λέγεται ταχύτης τὸ καθ' ἐκάστην μονάδα τοῦ χρόνου διανυόμενον διάστημα.

147. Δύο κινητὰ κινουῦνται πρὸ ἀορίστου χρόνου ἐπὶ εὐθείας γραμμῆς κίνησιν ὁμαλὴν, καὶ τοῦ μὲν πρώτου ἡ ταχύτης εἶναι  $\tau$ , τοῦ δὲ δευτέρου  $\tau'$ . εὐρίσκονται δὲ τὴν στιγμήν ταύτην εἰς τὰ σημεῖα  $A$  καὶ  $B$ , ὧν ἡ ἀπόστασις εἶναι  $a$ . Ζητεῖται ὁ μεταξὺ τῆς παρουσίας στιγμῆς καὶ τῆς συναντήσεως αὐτῶν χρόνος.

A

B

**Περιορισμός.** Ὁ ἀριθμὸς  $\alpha$ , ὁ τὴν ἀπόστασιν  $AB$  ἐκφράζων, ὑποτίθεται θετικός· ἐκάτερος δὲ τῶν ἀριθμῶν  $\tau$  καὶ  $\tau'$  ὑποτίθεται (κατὰ τὰ ἐν τῷ ἐδ. 66 εἰρημένα) θετικός μὲν, ἂν τὸ ὑπ' αὐτοῦ ἐκφραζόμενον διάστημα διανύηται κατὰ τὴν φορὰν  $AB$ , ἀρνητικός δὲ, ἂν κατὰ τὴν ἐναντίαν  $BA$ .

Ἴνα λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο, εὐρίσκομεν ἐν πρώτοις καταπόσουν θὰ μεταβληθῆ ἢ ἀπόστασις τῶν δύο κινητῶν ἐντὸς μιᾶς χρονικῆς μονάδος ἀπὸ τῆς παρουσίας στιγμῆς. Καὶ πρὸς τοῦτο διακρίνομεν τὰς ἐξῆς τέσσαρας περιπτώσεις, αἵτινες εἶναι αἱ μόναι δυναταί.

- 1) Ἐὰν ἀμφοτέρωι οἱ ἀριθμοὶ  $\tau$  καὶ  $\tau'$  εἶναι θετικοί.
- 2) Ἐὰν ἀμφοτέρωι εἶναι ἀρνητικοί.
- 3) Ἐὰν ὁ  $\tau$  εἶναι θετικός, ἀλλ' ὁ  $\tau'$  ἀρνητικός.
- 4) Ἐὰν ὁ  $\tau'$  εἶναι θετικός, ἀλλ' ὁ  $\tau$  ἀρνητικός.

1η) Ἐὰν ἀμφοτέρωι αἱ ταχύτητες εἶναι θετικαί, αἱ θέσεις τῶν κινητῶν εἰς τὸ τέλος μιᾶς χρονικῆς μονάδος θὰ εἶναι  $A_1$  καὶ  $B_1$  (ἐνθα ἡ  $AA_1$  ἔχει μῆκος  $\tau$  καὶ ἡ  $BB_1$  ἔχει μῆκος  $\tau'$ ) καὶ ἡ ἀπόστασις αὐτῶν θὰ εἶναι  $A_1B_1$ . εἶναι δὲ προφανῶς

$$\begin{array}{ccccccc} & A & A_1 & & & B & B_1 \\ \hline A_1B_1 & = & AB & + & BB_1 & - & AA_1 = \alpha + \tau' - \tau. \end{array}$$

2α) Ἐὰν ἀμφοτέρωι αἱ ταχύτητες εἶναι ἀρνητικαί, αἱ θέσεις τῶν δύο κινητῶν εἰς τὸ τέλος μιᾶς χρονικῆς μονάδος θὰ εἶναι  $A'$  καὶ  $B'$  (ἐνθα  $A'A = AA_1$  καὶ  $B'B = BB_1$ )

ἡ δὲ ἀπόστασις αὐτῶν θὰ εἶναι  $A'B'$ . εἶναι δὲ

$$A'B' = A'A + AB - B'B$$

καὶ ἐπειδὴ τὸ μῆκος τῆς  $A'A$  παρίστανται νῦν ὑπὸ τοῦ θετικοῦ ἀριθμοῦ  $-\tau$ , (διότι ὁ  $\tau$  εἶναι νῦν ἀρνητικός. τὸ δὲ μῆκος τῆς  $B'B$  παρίστανται διὰ τοῦ θετικοῦ ἀριθμοῦ  $-\tau'$ ), ἔπεται

$$A'B' = -\tau + \alpha + \tau' = \alpha + \tau' - \tau.$$

3η) Ἐὰν ὁ  $\tau$  εἶναι θετικός, ἀλλ' ὁ  $\tau'$  ἀρνητικός, αἱ θέσεις τῶν δύο κινητῶν εἰς τὸ τέλος μιᾶς χρονικῆς μονάδος θὰ εἶναι  $A_1$  καὶ  $B'$ , ἡ δὲ ἀπόστασις αὐτῶν θὰ εἶναι ἡ  $A_1B'$ . ἀλλ' εἶναι προδήλως

$$\begin{array}{ccccccc} & A & A_1 & & & B' & B \\ \hline A_1B' & = & AB & - & AA_1 & - & B'B. \end{array}$$

καὶ ἐπειδὴ τὸ μῆκος τῆς  $AA_1$  παρίστανται ὁ θετικός ἀριθμὸς  $\tau$ , τὸ δὲ μῆκος τῆς  $B'B$  παρίστανται ὁ θετικός ἀριθμὸς  $-\tau'$ , συνάγεται καὶ πάλιν

$$A_1B' = \alpha + \tau' - \tau.$$

4η) Ἐὰν τέλος εἶναι  $\tau$  ἀρνητικόν, ἀλλὰ  $\tau'$  θετικόν, αἱ θέσεις τῶν δύο κινητῶν εἰς τὸ τέλος μιᾶς χρονικῆς μονάδος θὰ εἶναι  $A'$  καὶ  $B_1$ , ἡ δὲ ἀπόστασις αὐτῶν θὰ εἶναι  $A'B_1$ .

$$\begin{array}{ccccccc} & A' & A & & & B & B_1 \\ \hline \text{εἶναι δὲ } A'B_1 & = & A'A & + & AB & + & BB_1. \end{array}$$

καὶ τὸ μὲν μῆκος τῆς  $A'A$  παρίσταται ὑπὸ τοῦ θετικοῦ ἀριθμοῦ— $\tau$ , τὸ δὲ μῆκος τῆς  $BB_1$  ὑπὸ τοῦ  $\tau'$  ὥστε εἶναι καὶ πάλιν

$$A'B_1 = \alpha + \tau' - \tau.$$

Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι κατὰ πάσας τὰς δυνατὰς περιπτώσεις ἡ ἀπόστασις τῶν κινητῶν εἰς τὸ τέλος μιᾶς χρονικῆς μονάδος (ἀπὸ τῆς παρούσης στιγμῆς) θὰ εἶναι  $\alpha + \tau' - \tau$ , ἥτοι εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα προστίθεται εἰς τὴν ἀπόστασιν  $\alpha$  ὁ ἀριθμὸς  $\tau' - \tau$ .

Ἐπειδὴ δὲ καὶ εἰς ἐκάστην ἐπομένην χρονικὴν μονάδα συμβαίνει προδήλως τὸ αὐτό, ἥτοι προστίθεται εἰς τὴν ἀπόστασιν ὁ ἀριθμὸς  $(\tau' - \tau)$ , ἔπεται, ὅτι μετὰ παρέλευσιν δύο χρονικῶν μονάδων ἡ ἀπόστασις θὰ εἶναι  $\alpha + 2(\tau' - \tau)$  μετὰ παρέλευσιν τριῶν  $\alpha + 3(\tau' - \tau)$  κτλ., καὶ μετὰ παρέλευσιν τοῦ χρόνου  $\chi$  ἡ ἀπόστασις τῶν κινητῶν θὰ εἶναι  $\alpha + \chi(\tau' - \tau)$ .

Ὁ αὐτὸς δὲ τύπος ἐκφράζει τὴν ἀπόστασιν τῶν κινητῶν καὶ ἐν τῷ παρελθόντι, ἂν ὁ παρελθὼν χρόνος παριστᾶται ὑπὸ ἀρνητικῶν ἀριθμῶν διότι κατὰ τὸν χρόνον—1, ἢ 1', ἥτοι πρὸ μιᾶς χρονικῆς μονάδος (ἀπὸ τῆς παρούσης στιγμῆς) ἡ ἀπόστασις ἦτο  $\alpha - (\tau' - \tau)$ , ἢ  $\alpha + 1'(\tau' - \tau)$ , διότι, ἀξήθεϊσα κατὰ  $\tau' - \tau$  εἰς τὸ διάστημα μιᾶς χρονικῆς μονάδος, γίνεται  $\alpha$  ὁμοίως κατὰ τὸν χρόνον—2 ἦτο  $\alpha + 2(\tau' - \tau)$ , καὶ γενικῶς κατὰ τὸν χρόνον, ὄντινα παριστᾷ ὁ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς  $\chi$ , ἡ ἀπόστασις ἦτο  $\alpha + \chi(\tau' - \tau)$ .

Τούτου τεθέντος, ἐπειδὴ κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς συναντήσεως ἡ ἀπόστασις τῶν κινητῶν γίνεται 0, θὰ εἶναι

$$\alpha + \chi(\tau' - \tau) = 0 \quad (1)$$

καὶ ἐκ τῆς ἐξισώσεως ταύτης εὐρίσκομεν τὸν χρόνον τὸν ἀπὸ τῆς παρούσης στιγμῆς μέχρι τῆς συναντήσεως

$$\chi = \frac{\alpha}{\tau - \tau'}. \quad (2)$$

**Διερεῦνησις.** Ἐὰν ἡ διαφορὰ  $\tau - \tau'$  εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς, ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$  εἶναι θετικὴ καὶ ἡ συνάντησις γίνεται εἰς τὸ μέλλον ἂν δὲ ἡ αὐτὴ διαφορὰ  $\tau - \tau'$  εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς, ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$  ἀποβαίνει ἀρνητικὴ καὶ ἡ συνάντησις ἐγένετο εἰς τὸ παρελθόν. ἂν δὲ τέλος εἶναι  $\tau = \tau'$ , ἡ ἐξίσωσις (1) γίνεται  $\alpha = 0$  ἐπομένως οὐδεμίαν ὑπάρχει λύσιν· ἀλλὰ καὶ τὸ πρόβλημα τότε προφανῶς εἶναι ἀδύνατον (146). Ὅσον δὲ αἱ ταχύτητες πλησιάζουσι νὰ γίνωσιν ἴσαι, τόσον τὸ σημεῖον τῆς συναντήσεως ἀπομακρύνεται ἀπὸ τῶν  $A$  καὶ  $B$  καὶ ὁ χρόνος ὁ ἀπὸ τῆς παρούσης στιγμῆς μέχρι τῆς συναντήσεως ἀυξάνει καὶ κατανατᾷ ὅσον θέλωμεν μέγας.

ΣΗΜ. Ὁ τύπος  $\alpha + \chi(\tau' - \tau)$  δίδει τὴν ἀπόστασιν θετικὴν μὲν πρὸ τῆς συναντήσεως (ὑποτιθεμένης τῆς συναντήσεως ἐν τῷ μέλλοντι), ἀρνητικὴν δὲ μετ' αὐτὴν· τουτέστι θετικὴν μὲν, ἂν ἡ πρὸς ἄλληλα θέσις τῶν κινήτων εἶναι AB, ἀρνητικὴν δὲ, ἂν εἶναι BA.

7ον

148. Πατήρ τις διέταξεν ἐν τῇ διαθήκῃ του τὴν διανομὴν τῆς περιουσίας αὐτοῦ εἰς τοὺς υἱοὺς του ὡς ἐξῆς. Ὁ πρῶτος νὰ λάβῃ  $\alpha$  δραχμὰς καὶ τὸ  $\frac{1}{\nu}$  τοῦ ὑπολοίπου· μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς μερίδος τοῦ πρώτου νὰ λάβῃ ὁ δεύτερος  $2\alpha$  δραχμὰς καὶ τὸ  $\frac{1}{\nu}$  τοῦ νέου ὑπολοίπου· μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν μερίδων τούτων νὰ λάβῃ ὁ τρίτος  $3\alpha$  δραχμὰς καὶ τὸ  $\frac{1}{\nu}$  τοῦ μένοντος τότε ὑπολοίπου, καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς· συνέβη δὲ κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον νὰ διανεμηθῇ ἡ ὅλη περιουσία ἐξ ἴσου εἰς τοὺς υἱοὺς, μηδενὸς ὑπολειφθέντος καταλοίπου. Ζητεῖται πόσοι ἦσαν οἱ υἱοί, πόση ἡ περιουσία καὶ πόση ἡ μερὶς ἐκάστου.

Ἐκ τοῦ πλήθους τῶν υἱῶν εὐρίσκονται καὶ τὰ ἄλλα εὐκόλως· ἔστω δὲ τοῦτο  $\chi$ .

Ἐπειδὴ οὐδὲν ἔμεινεν, ὁ τελευταῖος υἱὸς ἔλαβε μόνον τσάκις τὸ  $\alpha$ , ὅσας μονάδας ἔχει ὁ τὴν τάξιν αὐτοῦ δεικνύων ἀριθμὸς, ἦτοι ὁ  $\chi$ · ὥστε ἔλαβε μόνον  $\chi \cdot \alpha$ · τότε δὲ ἔλαβε καὶ ἕκαστος τῶν ἄλλων· ὥστε οἱ  $\chi$  υἱοὶ ἔλαβον δραχμὰς  $\chi^2 \cdot \alpha$ · τότε ἄρα ἦτο ἡ περιουσία.

Ἄλλὰ κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος ὁ πρῶτος υἱὸς ἔλαβεν  $\alpha$  δραχμὰς καὶ ἐκ τοῦ ὑπολοίπου (δηλαδὴ ἐκ τοῦ  $(\chi^2\alpha - \alpha)$ ) τὸ  $\frac{1}{\nu}$  μέρος· ὥστε ἔλαβεν οὗτος

$$\alpha + \frac{\chi^2\alpha - \alpha}{\nu}.$$

Ἐπειδὴ δὲ πάντες ἔλαβον ὅσα καὶ ὁ τελευταῖος, ἦτοι  $\chi\alpha$ , ἔπεται ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος

$$\chi\alpha = \alpha + \frac{\chi^2\alpha - \alpha}{\nu}. \quad (1)$$

ἀνάγκη δὲ νὰ εἶναι ὁ  $\chi$  ἀκέραιος καὶ θετικὸς ἀριθμὸς.

Ἴνα λύσωμεν τὴν ἐξίσωσιν (1), διαιροῦμεν πάντας τοὺς ὄρους διὰ  $\alpha$

και ἀπαλλάσσομεν αὐτὴν ἀπὸ τῶν παρονομαστῶν· οὕτω προκύπτει

$$v\chi = v + \chi^2 - 1. \quad \text{ὅθεν} \quad v(\chi - 1) = \chi^2 - 1 = (\chi - 1)(\chi + 1).$$

Καὶ ἐπειδὴ  $\chi - 1$  διαφέρει τοῦ 0, δικαιροῦντες δι' αὐτοῦ λαμβάνομεν

$$v = \chi + 1, \quad \text{ἢτοι} \quad \chi = v - 1,$$

ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι ὁ  $\chi$  θὰ εἶναι ἀκέραιος καὶ θετικὸς, ἂν εἶναι καὶ ὁ  $v$  τοιοῦτος.

Εὐρεθέντος τοῦ πλήθους τῶν υἱῶν	v - 1
ἡ μερὶς ἐκάστου εἶναι	α(v-1)·
καὶ ἡ περιουσία εἶναι	α(v-1) <sup>2</sup> .

**Παρατήρησις.** Ἐν τῇ εὐρέσει τῆς ἐξισώσεως ἐλήφθη μὲν ὑπ' ὄψιν, ὅτι ὅλαι αἱ μερίδες εἶναι ἴσαι, ἐξισώθησαν ὁμῶς μόνον αἱ μερίδες τοῦ πρώτου καὶ τοῦ τελευταίου· μένει λοιπὸν νὰ δεῖξωμεν, ὅτι κατὰ τὴν λύσιν, ἣν εὐρομεν, καὶ τῶν ἄλλων αἱ μερίδες εἶναι ἴσαι τῇ τοῦ τελευταίου. Πρὸς τοῦτο ἀποδεικνύομεν, ὅτι οἰοσδήποτε ἐκ τῶν υἱῶν, ἔστω ὁ τὴν τάξιν  $\pi$  ἔχων, θὰ λάβῃ τὴν μερίδα  $\alpha(v-1)$ , ἂν πάντες οἱ προηγούμενοι αὐτοῦ λάβωσι τὴν αὐτὴν μερίδα. Καὶ ὄντως τοῦ τὴν τάξιν  $\pi$  ἔχοντος προηγούνται  $\pi - 1$  υἱοί, καὶ ἕκαστος ἔλαβεν ἐξ ὑποθέσεως μερίδα  $\alpha(v-1)$ . ὥστε ἔλαβον ὅλοι  $\alpha(v-1)(\pi-1)$ . ἦτο δὲ ἡ περιουσία  $\alpha(v-1)^2$ , ὥστε ἔμειναν  $\alpha(v-1)^2 - \alpha(v-1)(\pi-1)$ . ἦτοι  $\alpha(v-1)(v-\pi)$ . ἐκ δὲ τούτων ἔλαβεν ὁ τὴν τάξιν  $\pi$  ἔχων υἱὸς  $\alpha\pi$  δραχμὰς καὶ τοῦ ὑπολοίπου  $\alpha(v-1)(v-\pi) - \alpha\pi$  τὸ νὸν μέρος· ὥστε ἔλαβεν ἐν συνόλῳ

$$\alpha\pi + \frac{\alpha(v-1)(v-\pi) - \alpha\pi}{v}, \quad \text{ἢτοι} \quad \frac{\alpha(v-1)(v-\pi) + \pi\alpha v - \alpha\pi}{v}$$

$$\text{ἢ} \quad \frac{\alpha(v-1)(v-\pi) + \alpha\pi(v-1)}{v} = \frac{\alpha(v-1)(v-\pi + \pi)}{v} = \alpha(v-1).$$

Ἐκ τούτου ἔπεται, ὅτι ὁ δεῦτερος υἱὸς θὰ λάβῃ καὶ αὐτὸς μερίδα  $\alpha(v-1)$ , διότι ὁ προηγούμενος αὐτοῦ τὴν αὐτὴν ἔλαβε μερίδα· καὶ ὁ τρίτος θὰ λάβῃ μερίδα  $\alpha(v-1)$ . διότι οἱ προηγούμενοι αὐτοῦ τὸ αὐτὸ ἔλαβον, καὶ καθ' ἑξῆς· ὥστε ἀπεδείχθη ἡ ἰσότης πασῶν τῶν μερίδων.

Πρὸς ἀσκησιν προτείνομεν εἰς λύσιν καὶ τὰ ἐπόμενα προβλήματα.

1) Πατὴρ ἐρωτηθεὶς περὶ τῆς ἡλικίας τοῦ υἱοῦ του ἀπεκρίθη· μετὰ 20 ἔτη ἡ ἡλικία τοῦ υἱοῦ μου θὰ εἶναι τετραπλασία τῆς περυσινήs.

Ποία ἡ ἡλικία τοῦ υἱοῦ; (Ἄπ. 8).

2) Ἀλώπηξ εἶχε κάμη 60 πηδήματα, ὅταν λαγωνικὸν ἤρχισε νὰ διώκῃ αὐτὴν· κάμνει δὲ ἡ ἀλώπηξ 9 πηδήματα, ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ λαγωνικὸν κάμνει 6· ἀλλὰ 3 πηδήματα τοῦ λαγωνικοῦ ἰσοδυναμοῦσι πρὸς 7

τῆς ἀλώπεκος. Πόσα πηδήματα θὰ κάμῃ τὸ λαγωνικόν, μέχρις οὗ φθάσῃ τὴν ἀλώπεκα; (Ἄπ. 72).

ΣΗΜ. Τὸ πρόβλημα τοῦτο λύομεν εὐκολώτατα παρατηροῦντες, ὅτι, ἂν ληθῆῃ μὴδὲ τοῦ χρόνου ὁ χρόνος τῶν 6 πηδημάτων τοῦ λαγωνικοῦ, ἢ τῶν 9 τῆς ἀλώπεκος, καθ' ἑκάστην μονάδα χρόνου ἢ ἀρχικὴ ἀπόστασις αὐτῶν ἐλαττοῦται κατὰ 5 πηδήματα ἀλώπεκος.

3) Διόφαντος ὁ συγγραφεὺς τοῦ ἀρχαιοτάτου σωζομένου βιβλίου ἀλγέβρας ἐζήσῃ τὸ ἕκτον τῆς ζωῆς του ὡς παῖς καὶ τὸ δωδέκατον ὡς νεανίας, ἔπειτα νυμφευθεὶς ἐζήσῃ τὸ ἕβδομον καὶ 5 ἔτη πρὶν ἀποκτήσῃ υἱόν, ὅστις ἀπέθανε 4 ἔτη πρὸ τοῦ πατρὸς του, ζήσας τὸ ἡμισυ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Πόσον ἐζήσεν ὁ Διόφαντος; (Ἄπ. 84 ἔτη).

4) Ἐχων τις 100000 δραχμὰς μεταχειρίζεται μέρος αὐτῶν εἰς ἀγορὰν οἰκίας· τὸ τρίτον τοῦ ὑπολοίπου τοκίζει πρὸς 4%, τὰ δὲ λοιπὰ  $\frac{2}{3}$  πρὸς 3%· ἀπολαμβάνει δὲ ἐκ τῶν τοκισθέντων χρημάτων ἐτήσιον εἰσόδημα 2000 δραχμῶν· ποία ἡ τιμὴ τῆς οἰκίας καὶ ποῖα τὰ τοκισθέντα πρὸς 4% καὶ 3% χρήματα. (Ἄπ. 40000, 20000, 40000).

5) Ἐχει τις εἰς τόκον κεφάλαιόν τι πρὸς 5% κατ' ἔτος· μετὰ δύο ἔτη ἀφαιρεῖ τὸ τέταρτον τοῦ κεφαλαίου, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἀφίνει εἰς τόκον 8 μῆνας, μετὰ τοὺς ὁποίους ἀφαιρεῖ πάλιν τὸ τέταρτον (τοῦ νέου κεφαλαίου), τὸ δὲ ὑπόλοιπον λαμβάνει μετὰ 16 μῆνας. Ἐλαβε δὲ ἐν τῷ διαστήματι τῶν 48 μηνῶν τόκον 26000 δραχμὰς. Ζητεῖται τὸ ἀρχικόν κεφάλαιον. (Ἄπ. 160000).

6) Δεξαμενὴ πλήρης ὕδατος κενοῦται διὰ δύο ἀνίσων κρουῶν· ἀνοίγεται ὁ πρῶτος καὶ ἐκρέει τὸ τέταρτον τοῦ περιεχομένου ὕδατος· τότε ἀνοίγεται καὶ ὁ ἕτερος καὶ ἐκρέει ἐξ ἀμφοτέρων τὸ ὕδωρ. Οὕτω δὲ κενοῦνται καὶ τὰ λοιπὰ τρία τέταρτα τῆς δεξαμενῆς εἰς μίαν ὥραν καὶ ἐν τέταρτον περισσότερον, ἢ ὅσον ἐχρειάσθη ὁ πρῶτος κρουὸς διὰ τὴν κενώσῃ τὸ τέταρτον τῆς δεξαμενῆς. Ἐὰν δὲ ἀμφότεροι οἱ κρουνοὶ ἠνοίγοντο ἐξ ἀρχῆς, ἢ δεξαμενὴ θὰ ἐκενοῦτο ἐν τέταρτον τῆς ὥρας ταχύτερον. Εἰς πόσας ὥρας ἕκαστος τῶν κρουῶν θὰ ἐκένου μόνος τὴν δεξαμενὴν; (Ἄπ. ὁ α' εἰς 4, ὁ β' εἰς 12).

7) Ὁρολογίου δεικνύοντος ἀκριβῶς μεσημβρίαν συμπίπτουσιν οἱ δεικται ἐπὶ τοῦ 12· μετὰ πόσῃ ὥραν θὰ γίνῃ ἡ πρώτη σύμπτωσις τῶν δύο δεικτῶν καὶ πόσαι συμπτώσεις θὰ γίνωσιν εἰς τὸ διάστημα 12 ὥρῶν; (Ἄπ. 1 ὥρ.  $5\frac{5}{11}$ , συμπτώσεις 11.)



ΣΗΜ. Τὸ πρόβλημα τοῦτο λύομεν εὐκολώτατα παρατηροῦντες, ὅτι ἀπὸ μὲν τῆς 12<sup>ης</sup> μέχρι τῆς 1<sup>ης</sup> οὐδεμία συμβαίνει σύμπτωσις, ἐν ἑκάστη δὲ τῶν ἄλλων ὥρῶν 1—2, 2—3, . . . , 11—12 συμβαίνει μία καὶ μόνη ὥστε γίνονται ἐν 12 ὥραις 11 συμπτώσεις· ἐπειδὴ δὲ ἀμφότεροι οἱ δείκται κινουῦνται ὁμαλῶς, ἔπεται, ὅτι ὁ μεταξὺ δύο διαδοχικῶν συμπτώσεων παρερχόμενος χρόνος εἶναι  $\frac{12}{11}$  τῆς ὥρας, ἥτοι 1 ὥρα 5'  $\frac{5}{11}$  τοῦ πρώτου λεπτοῦ.

8) Ἐὰν τὸ αὐτὸ ὥρολόγιον ἔχη τρεῖς δείκτας (τῶν ὥρῶν, τῶν πρώτων λεπτῶν καὶ τῶν δευτέρων λεπτῶν) καὶ συμπίπτωσιν οἱ δείκται ἐπὶ τοῦ 12, μετὰ πόσα δεύτερα λεπτὰ ὁ τῶν δευτέρων λεπτῶν δείκτης θὰ διαιρῆ εἰς δύο ἴσα μέρη τὴν ὑπὸ τῶν ἄλλων δύο ἀποτελουμένην γωνίαν :

$$\left( \text{Ἀπ. } 60' + \frac{780}{1427} \right).$$

9) Ἀμάξης τῶν μὲν ἐμπροσθίων τροχῶν ἡ περιφέρεια εἶναι  $\alpha$  ποδῶν, τῶν δὲ ὀπισθίων  $\beta$ . Διανυσάσης δὲ τῆς ἀμάξης διάστημά τι, παρατηρήθη, ὅτι οἱ ἐμπρόσθιοι τροχοὶ ἔκαμαν  $\nu$  περιστροφὰς περισσοτέρας ἢ οἱ ὀπίσθιοι. Εὗρεῖν τὸ διανυσθὲν ὑπὸ τῆς ἀμάξης διάστημα.  $\left( \text{Ἀπ. } \frac{\alpha\beta\nu}{\beta-\alpha} \right).$

10) Εὗρεῖν ἐν τῷ προβλήματι τῶν δύο κινητῶν (ἐδ. 147) πότε ἡ ἀπ' ἀλλήλων ἀπόστασις τῶν κινητῶν εἶναι  $\beta$ .  $\left( \text{Ἀπ. } \chi = \frac{\alpha \pm \beta}{\tau - \tau'} \right).$

11) Δύο ὥρολόγια ἔδειξαν συγχρόνως τὸ μὲν ἐν 7 ὥρ. 5', τὸ δὲ ἄλλο 8· ἔπειτα πάλιν τὸ μὲν πρῶτον 9 ὥρ. 58', τὸ δὲ ἄλλο τὴν αὐτὴν στιγμήν 10 ὥρ. Πότε τὰ δύο ταῦτα ὥρολόγια θὰ δεῖξωσι τὴν αὐτὴν ὥραν ;

12) Κινητὸν τι ἀπέγει ἀπὸ ἄλλου κινητοῦ, πρὸς ὃ διευθύνεται, ἀπόστασιν  $\alpha$ , ἡ δὲ ταχύτης του εἶναι διπλασία τῆς ταχύτητος ἐκείνου (καὶ τῆς αὐτῆς διευθύνσεως)· πόσον διάστημα θὰ διανύσῃ ἵνα τὸ φθάσῃ ;  $\left( \text{Ἀπ. } 2\alpha \right).$

13) Ἀτμάμαξά τις ἀνεχώρησε δύο ὥρας ὕστερον ἄλλης ἐκ τοῦ αὐτοῦ σταθμοῦ καὶ διατρέχει τὴν αὐτὴν ὁδόν, ἡ δὲ ταχύτης αὐτῆς εἶναι τὰ  $\frac{5}{3}$  τῆς ταχύτητος τῆς ἄλλης, μετὰ πόσας ὥρας θὰ φθάσῃ αὐτήν ;

$$\left( \text{Ἀπ. } 3 \right).$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

ΛΥΣΙΣ ΟΣΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

ΜΕΤ' ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ

149. Καλείται σύστημα εξισώσεων τὸ ὅσυνολον πολλῶν εξισώσεων, τὰς ὁποίας πρέπει νὰ ἐπαληθεύωσιν αἱ αὐταὶ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων.

Δύο συστήματα εξισώσεων λέγονται ἰσοδύναμα, ἔαν αἱ αὐταὶ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων ἐπαληθεύωσιν ἀμφότερα.

Φανερόν δέ, ὅτι, ὅταν μόνον εἰς τὸν προσδιορισμὸν τῶν ἀγνώστων ἀποβλέπωμεν, δυνάμεθα, ἔχοντες δύο συστήματα ἰσοδύναμα, νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὸ ἓν διὰ τοῦ ἑτέρου.

Ἐκ δοθέντος συστήματος εὐρίσκομεν ἄλλο προφανῶς ἰσοδύναμον, ἔαν ἀντικαταστήσωμεν μίαν εξίσωσιν δι' ἄλλης ἰσοδυναμου πρὸς αὐτήν· τὸ αὐτὸ δὲ συμβαίνει, καὶ ἂν περισσοτέρας ἀντικαταστήσωμεν, ἐκάστην δι' ἄλλης ἰσοδυναμου πρὸς αὐτήν.

Παραδείγματος χάριν τὸ σύστημα

$$2x - \psi = 8$$

$$\frac{x}{2} + \psi = 4$$

εἶναι ἰσοδύναμον τῷ ἐξῆς

$$2x - \psi = 8$$

$$x + 2\psi = 8.$$

Ἐκ δοθέντος συστήματος εὐρίσκομεν ἄλλο ἰσοδύναμον καὶ διὰ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν εξισώσεων πρὸς ἀλλήλας, κατὰ τὰ ἐξῆς θεωρήματα.

150. ΘΕΩΡΗΜΑ Α΄. Ἐὰν ἐν συστημῶν εξισώσεων προσθέσωμεν ὅσας δήποτε εξισώσεις κατὰ μέλη καὶ ἀντικαταστήσωμεν μίαν τῶν προστεθεισῶν διὰ τῆς προκυνψάσης, εὐρίσκομεν σύστημα ἰσοδύναμον τῷ πρώτῳ.

Ἐστω τὸ σύστημα τῶν εξισώσεων

$$A = A'$$

$$B = B'$$

$$\Gamma = \Gamma'$$

(1)

ἔνθα πρὸς συντομίαν παρεστήσαμεν ἕκαστον τῶν μελῶν δι' ἑνὸς μόνο γράμματος·

λέγω, ὅτι τὸ σύστημα τοῦτο εἶναι ἰσοδύναμον τῷ ἐπομένῳ

$$A + B = A' + B'$$

$$B = B'$$

$$\Gamma = \Gamma'$$

ἢ καὶ τῶ ἐξῆς

$$\begin{aligned} A + B + \Gamma &= A' + B' + \Gamma' \\ B &= B' \\ \Gamma &= \Gamma', \end{aligned}$$

ἅτινα εὐρέθησαν ἀντικατασταθείσης τῆς πρώτης ἐξισώσεως τοῦ δοθέντος συστήματος δι' ἐκείνης, ἥτις προέκυψεν ἐκ τῆς προσθέσεως αὐτῆς τῆς πρώτης καὶ τῶν ἄλλων κατὰ μέλη.

Διότι, ἂν εὐρεθῶσι τιμαὶ τῶν ἀγνώστων ποιῶσαι τὰς παραστάσεις  $A, B, \Gamma$  ἴσας ταῖς  $A', B', \Gamma'$ , αἱ αὐταὶ τιμαὶ θὰ ποιήσωσι καὶ τὴν παράστασιν  $A + B$  ἴσην τῇ  $A' + B'$  (διότι, ἂν εἰς ἴσα προσθεῶσιν ἴσα, καὶ τὰ ἀθροίσματα εἶναι ἴσα): ὡσαύτως καὶ τὴν παράστασιν  $A + B + \Gamma$  θὰ ποιήσωσιν ἴσην τῇ  $A' + B' + \Gamma'$ . ὥστε, ἀληθεύοντος τοῦ δοθέντος συστήματος, ἀληθεύουσι καὶ τὰ ἄλλα· ἂν δὲ πάλιν εὐρεθῶσι τιμαὶ τῶν ἀγνώστων ἐπαληθεύουσι τὸ δεύτερον σύστημα, ἥτοι ποιούσιν τὰς παραστάσεις  $A + B, B, \Gamma$  ἴσας ταῖς  $A' + B', B', \Gamma'$ , αἱ αὐταὶ τιμαὶ θὰ ποιήσωσι καὶ τὴν παράστασιν  $A$  ἴσην τῇ  $A'$  (διότι, ἂν ἀπὸ τῶν ἴσων  $A + B$  καὶ  $A' + B'$  ἀφαιρεθῶσιν ἴσα, τὰ  $B$  καὶ  $B'$  τὰ ὑπόλοιπα θὰ εἶναι ἴσα), ἥτοι θὰ ἐπαληθεύωσι καὶ τὸ πρῶτον σύστημα· ὥστε τὸ δεύτερον σύστημα εἶναι ἰσοδύναμον τῶ δοθέντι· ὁμοίως ἀποδεικνύεται καὶ τὸ τρίτον ἰσοδύναμον αὐτοῦ.

Ἔστω ὡς παράδειγμα τὸ σύστημα τῶν ἐξισώσεων

$$\begin{aligned} \chi + \psi &= 18 \\ \chi - \psi &= 6, \end{aligned}$$

τὰς ὁποίας θὰ εὐρίσκομεν, ἂν προτείνεται νὰ εὐρεθῶσι δύο ἀριθμοὶ ἔχοντες ἀθροισμα 18 καὶ διαφοράν 6.

Ἐὰν προσθέσωμεν τὰς ἐξισώσεις ταύτας κατὰ μέλη καὶ ἀντικαταστήσωμεν τὴν δευτέραν διὰ τῆς προκυπτούσης ἐξισώσεως, εὐρίσκομεν τὸ ἰσοδύναμον σύστημα

$$\begin{aligned} 2\chi &= 24 \\ \chi + \psi &= 18. \end{aligned}$$

εἶναι δὲ ἡ λύσις τούτου εὐκολωτέρα· διότι ἐκ τῆς πρώτης προσδιορίζεται ὁ  $\chi$ ,

$$\chi = 12.$$

ἔὰν δὲ ἡ τιμὴ αὕτη τοῦ  $\chi$  τεθῆ εἰς τὴν δευτέραν (διότι καὶ αὕτη πρέπει νὰ ἐπαληθεύηται ὑπὸ τῆς αὐτῆς τιμῆς τοῦ  $\chi$ ), προκύπτει

$$\psi + 12 = 18. \quad \text{ὅθεν} \quad \psi = 6.$$

ὥστε ἡ λύσις τοῦ δοθέντος συστήματος εἶναι  $\chi = 12 \quad \psi = 6$ .

**Παρατήρησις.** Δυνάμεθα, πρὶν προσθέσωμεν τὰς ἐξισώσεις, νὰ πολλαπλασιάσωμεν αὐτὰς ἐπὶ οἷουςδήποτε ἀριθμοὺς διαφόρους τοῦ 0.

Παραδείγματος χάριν, τὸ σύστημα (1) εἶναι ἰσοδύναμον τῷ ἐπομένῳ

$$\mu A + \nu B + \rho \Gamma = \mu A' + \nu B' + \rho \Gamma'$$

$$B = B'$$

$$\Gamma = \Gamma',$$

ἔνθα  $\mu, \nu, \rho$  εἶναι οἰοιδήποτε ἀριθμοὶ (διάφοροι τοῦ 0).

Ἐστω ὡς παράδειγμα τὸ σύστημα

$$\chi + 3\psi = 9$$

$$2\chi - \psi = 4.$$

Ἐὰν προσθέσωμεν τὰς ἐξισώσεις ταύτας κατὰ μέλη, ἀφοῦ πολλαπλασιάσωμεν τὴν πρώτην ἐπὶ 1 καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ 3, εὐρίσκομεν τὸ ἰσοδύναμον σύστημα

$$7\chi = 21$$

$$\chi + 3\psi = 9$$

ἐξ οὗ εὐρίσκομεν εὐκόλως  $\chi = 3$ , καὶ  $\psi = 2$ .

151. ΘΕΩΡΗΜΑ Β'. Ἐὰν ἐν συστήματι μία τῶν ἐξισώσεων εἶναι τῆς μορφῆς  $\chi = A$ , ἔνθα  $\chi$  εἶναι εἷς τῶν ἀγνώστων, καὶ ἀντικαταστήσωμεν ἐν ταῖς λοιπαῖς (ἢ ἐν πάσαις ἢ καὶ ἐν τισι μόνον) τὸ  $\chi$  ὑπὸ τοῦ  $A$ , εὐρίσκομεν σύστημα ἰσοδύναμον.

Ἐστω τὸ σύστημα

$$\chi = A$$

$$B = \beta$$

$$\Gamma = \gamma.$$

Λέγω, ὅτι τοῦτο εἶναι ἰσοδύναμον τῷ ἐξῆς

$$\chi = A$$

$$B' = \beta'$$

$$\Gamma' = \gamma'$$

ἔνθα διὰ τῶν τονιζομένων γραμμάτων παρεστήσαμεν τὰς ἐκ τῶν ἀτόνων προκυπτοῦσας παραστάσεις, ὅταν ἀντικαταστήθῃ ἐν ταῖς τὸ  $\chi$  ὑπὸ τοῦ  $A$ .

Καὶ ὄντως, ὁπότερον τῶν συστημάτων τούτων καὶ ἂν ἀληθεύσῃ, τὸ  $\chi$  καὶ τὸ  $A$  γίνονται ἴσοι ἀριθμοί· ἐπομένως καὶ τὸ ἕτερον σύστημα θὰ ἀληθεύσῃ· διότι ἡ μόνη διαφορὰ μεταξὺ αὐτῶν εἶναι, ὅτι τὸν τύπον τοῦ  $\chi$  ἐν τῷ πρώτῳ κατέχει τὸ  $A$  ἐν τῷ δευτέρῳ.

Ἐστω ὡς παράδειγμα τὸ σύστημα

$$\chi = 2\psi - 1$$

$$4\chi + \psi = 41.$$

Ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν εἷς τὴν δευτέραν ἐξίσωσιν τὸ  $\chi$  ὑπὸ τοῦ ἴσου αὐτῷ  $2\psi - 1$ , εὐρίσκομεν τὸ ἰσοδύναμον σύστημα

$$\chi = 2\psi - 1$$

$$4(2\psi - 1) + \psi = 41.$$

καὶ ἐπειδὴ ἡ δευτέρα ἐξίσωσις ἔχει ἓνα μόνον ἄγνωστον, τὸν  $\psi$ , λύοντες αὐτὴν εὐρίσκομεν  $\psi = 5$ .

Ἦθεν ἐκ τῆς πρώτης (μετὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῆς τιμῆς ταύτης τοῦ  $\psi$ ) εὐρίσκεται  $\chi = 9$ .

### Παρατήρησις.

152. Ὅταν δυνάμει ἑνὸς γῶν θεωρημάτων τούτων συνδυάζωμεν πολλὰς ἐξισώσεις οὕτως, ὥστε ἡ ἐξ' αὐτῶν προκύπτουσα νὰ μὴ ἔχη ἓνα τῶν ἀγνώστων, λέγομεν, ὅτι ἀπαλείφωμεν τὸν ἄγνωστον τοῦτον· ὁ δὲ τοιοῦτος συνδυασμὸς τῶν ἐξισώσεων λέγεται ἀπαλοιφή τοῦ ἀγνώστου τούτου. Ἡ λύσις παντὸς συστήματος ἐξισώσεων γίνεται, ὡς κατόπιν θὰ μάθωμεν, διὰ τῆς ἀπαλοιφῆς.

### Λύσις δύο ἐξισώσεων τοῦ πρώτου βαθμοῦ δύο ἀγνώστους ἔχουσῶν.

153. Πᾶσα ἐξίσωσις τοῦ πρώτου βαθμοῦ δύο ἔχουσα ἀγνώστους, ὅταν ἐφαρμοσθῶσιν ἐπ' αὐτῆς αἱ πράξεις τοῦ ἐδ. 105, λαμβάνει τὴν μορφήν

$$\alpha\chi + \beta\psi = \gamma,$$

ἔνθα  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  εἶναι γνωστὰ παραστάσεις ἢ ὀρισμένοι ἀριθμοί,  $\chi$  δὲ καὶ  $\psi$  οἱ ἀγνώστοι.

Ἄλλ' ἂν ἔχωμεν μίαν μόνην τοιαύτην ἐξίσωσιν, δυνάμεθα κατ' ἀπείρους τρόπους νὰ ἐπαληθεύσωμεν αὐτήν· διότι ἀντικαθιστῶντες τὸν ἕτερον τῶν ἀγνώστων, ἔστω τὸν  $\psi$ , δι' οἰοῦν ἢ οἰοῦν θέλωμεν ἀριθμοῦ, εὐρίσκομεν ἐξίσωσιν ἓνα μόνον ἄγνωστον περιέχουσαν τὸν  $\chi$ , τοῦ ὁποίου ἡ τιμὴ προσδιορίζεται ἐκ τῆς ἐξισώσεως ταύτης.

Ἐστώ ὡς παράδειγμα ἡ ἐξίσωσις  $7\chi - 5\psi = 1$

Θεωροῦντες τὸν  $\psi$  ὡς γνωστὸν καὶ λύοντες τὴν ἐξίσωσιν πρὸς τὸν  $\chi$ ,

εὐρίσκομεν 
$$\chi = \frac{1 + 5\psi}{7}.$$

ἐν δὲ ὑποθέσωμεν  $\psi = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

εὐρίσκομεν ἐκ τῆς ἐξισώσεως  $\chi = \frac{1}{7}, \frac{6}{7}, \frac{11}{7}, \frac{16}{7}, 3, \dots$

Ἐκάστη τιμὴ τοῦ  $\psi$  μετὰ τῆς ἀντιστοιχοῦσης τιμῆς τοῦ  $\chi$  ἀποτελοῦσι μίαν λύσιν τῆς δοθείσης ἐξισώσεως· ὥστε ἡ τοιαύτη ἐξίσωσις ἔχει λύσεις ἀπείρους τὸ πλῆθος.

154. Θεωρήσωμεν νῦν σύστημα δύο πρωτοβαθμίων ἐξισώσεων δύο ἀγνώστους περιεχουσῶν· ἔστω δὲ ὡς παράδειγμα τὸ σύστημα

$$3\chi - 4\psi = 17$$

$$2\chi + 5\psi = 19.$$

Ἐκ τοῦ συστήματος τούτου δυνάμεθα πάντοτε νὰ πορισθῶμεν ἕτερον ἰσοδύναμον καὶ τοῦ ὁποίου ἡ μία τῶν ἐξισώσεων νὰ μὴ περιέχῃ ἓνα ἀγνώστον, ἢ, ὅπερ τὸ αὐτό, δυνάμεθα νὰ ἀπαλείψωμεν ἓνα ἀγνώστον.

Καὶ ὄντως ἐκ τοῦ θεωρήματος (150) ἐμάθομεν, ὅτι δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν μίαν τῶν δοθεισῶν ἐξισώσεων δι' ἐκείνης, ἣν λαμβάνομεν προσθέτοντες κατὰ μέλη τὰς δοθείσας πολλαπλασιασμένας ἐπιόλουσδήποτε ἀριθμούς· δυνάμεθα δὲ νὰ ἐκλέξωμεν τοὺς πολλαπλασιαστὰς οὕτως, ὥστε οἱ συντελεσταὶ ἐνὸς ἀγνώστου νὰ γίνωσιν ἀντίθετοι ἀριθμοὶ τότε προσθέτοντες τὰς ἐξισώσεις εὐρίσκομεν ἐξίσωσιν μὴ περιέχουσαν τὸν ἀγνώστον τοῦτον, τοῦτ' ἔστιν ἀπαλείφωμεν αὐτὸν ἐκ τῶν δοθεισῶν ἐξισώσεων. Εἰς τὸ ληθὲν παράδειγμα, ἐὰν θέλωμεν νὰ ἀπαλείψωμεν τὸν  $\psi$ , οἱ τοιοῦτοι πολλαπλασιασταὶ εἶναι, τῆς μὲν πρώτης ἐξισώσεως ὁ 5, τῆς δὲ δευτέρας ὁ 4· διότι πολλαπλασιάζοντες ἐπ' αὐτοὺς λαμβάνομεν

$$15\chi - 20\psi = 85$$

$$8\chi + 20\psi = 76$$

καὶ προσθέτοντες

$$23\chi = 161.$$

ἐπομένως τὸ δοθὲν σύστημα εἶναι ἰσοδύναμον τῷ ἐξῆς

$$3\chi - 4\psi = 17$$

$$23\chi = 161.$$

Ἄλλ' ἡ λύσις τοῦ τελευταίου τούτου συστήματος εἶναι εὐκολωτάτη· διότι ἡ δευτέρα ἐξίσωσις, ὡς ἔχουσα μόνον τὸν  $\chi$ , προσδιορίζει αὐτὸν καὶ δίδει  $\chi = 7$ . ἐὰν δὲ ἡ τιμὴ αὕτη τοῦ  $\chi$  ἀντικατασταθῇ εἰς τὴν πρώτην (διότι καὶ αὕτη ὑπὸ τῆς αὐτῆς τιμῆς τοῦ  $\chi$  πρέπει νὰ ἐπαληθεύηται), μένει εἰς αὐτὴν ἀγνώστος μόνον ὁ  $\psi$ , καὶ ἐπομένως προσδιορίζεται ἐξ αὐτῆς· οὕτως εὐρίσκομεν

$$21 - 4\psi = 17, \quad \text{ἐξ ἧς } \psi = 1.$$

ὥστε αἱ μόναι τιμαὶ τῶν ἀγνώστων, αἱ τὸ δοθὲν σύστημα ἐπαληθεύουσαι, εἶναι

$$\chi = 7, \quad \psi = 1.$$

155. Ἡ μέθοδος αὕτη, δι' ἧς ἀπαλείφεται ὁ ἕτερος τῶν ἀγνώστων ἐκ τῶν δύο ἐξισώσεων καὶ λύεται τὸ σύστημα, λέγεται μέθοδος τῆς προσθέσεως. Παρατηρητέον δὲ, ὅτι ὡς πολλαπλασιασταὶ δύνανται πάντοτε νὰ ληθῶσιν οἱ συντελεσταὶ τοῦ ἀπαλειπτέου ἀγνώστου, ἐὰν ὁ συντελεστής ἐκάστης τῶν ἐξισώσεων πολλαπλασιασθῇ τὴν ἄλλην· διότι τότε

εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἐξισώσεις προκύπτει συντελεστής τοῦ ἀπαλειπτεύου ἀγνώστου τὸ γινόμενον τῶν συντελεστῶν αὐτοῦ ἐν ταῖς δεδομέναις. Συνήθως οἱ πολλαπλασιασμοὶ λαμβάνονται θετικοί, καὶ ἂν μὲν ὁ προκύπτων κοινὸς συντελεστής τοῦ ἀπαλειπτεύου ἀγνώστου ἔχη ἐναντία σημεῖα εἰς τὰς δύο ἐξισώσεις, προσθέτομεν αὐτὰς κατὰ μέλη, ὅτε ὁ ἀγνώστος ἀπαλείφεται· ἂν δὲ ἔχη τὸ αὐτὸ σημεῖον εἰς τὰς δύο ἐξισώσεις, πρὶν προσθέσωμεν, ἀλλάσσομεν τὰ σημεῖα πάντων τῶν ὄρων τῆς ἐτέρας τῶν ἐξισώσεων.

Ἄλλ' ἀπλούστερον εἶναι νὰ λαμβάνωμεν τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλασίον τῶν δύο συντελεστῶν τοῦ ἀγνώστου καὶ τοῦτο νὰ καθιστῶμεν κοινὸν συντελεστήν αὐτοῦ εἰς τὰς δύο ἐξισώσεις (ὡς ἐν τῇ ἀναγωγῇ δύο κλασμάτων εἰς τὸν αὐτὸν παρονομαστήν)· γίνεται δὲ τοῦτο, ἐὰν ἑκάτερα τῶν ἐξισώσεων πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸ πηλίκον τοῦ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου διαιρεθέντος διὰ τοῦ συντελεστοῦ τοῦ ἀγνώστου ἐν τῇ αὐτῇ ἐξίσωσει.

### Παραδείγματα.

$$1^{\text{ον}}) \quad 7\chi - 8\psi = 19$$

$$13\chi - 6\psi = 53.$$

Τῶν συντελεστῶν τοῦ  $\psi$  ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλασίον εἶναι ὁ 24· ἐπομένως πολλαπλασιάζομεν τὴν πρώτην ἐξίσωσιν ἐπὶ  $\frac{24}{8}$ , ἦτοι 3,

καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ  $\frac{24}{6}$  ἢ 4 οὕτως εὐρίσκομεν

$$21\chi - 24\psi = 57$$

$$52\chi - 24\psi = 212,$$

ἀλλάσσοντες δὲ τὰ σημεῖα πάντων τῶν ὄρων τῆς πρώτης καὶ προσθέτοντες ἔπειτα τὰς ἐξισώσεις κατὰ μέλη, εὐρίσκομεν

$$31\chi = 155,$$

$$\text{ἐξ ἧς } \chi = 5.$$

ἀντικαθιστῶντες νῦν τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ  $\chi$  εἰς τὴν ἐτέραν τῶν δοθεισῶν (διότι ἡ εὐρεθεῖσα ἐξίσωσις μεθ' ἑκατέρας τῶν δοθεισῶν ἀποτελοῦσι σύστημα ἰσοδύναμον τῷ δοθέντι), ἔστω εἰς τὴν πρώτην, καὶ λύοντες ἔπειτα πρὸς τὸν  $\psi$  εὐρίσκομεν

$$35 - 8\psi = 19,$$

$$\text{ἐξ ἧς } \psi = 2.$$

2ον)

$$\chi - 2\psi = -9$$

$$\chi + 5\psi = 26.$$

Ἐπειδὴ ὁ  $\chi$  ἔχει τὸν αὐτὸν συντελεστὴν εἰς τὰς δύο ἐξισώσεις, ἀπαλείφωμεν αὐτὸν πρὸς τοῦτο ἀλλάσσομεν τὰ σημεῖα πάντων τῶν ὄρων τῆς πρώτης καὶ προσθέτομεν ἀμφοτέρως κατὰ μέλη· οὕτως εὐρίσκομεν

$$7\psi = 35, \quad \text{ἐξ ἧς } \psi = 5.$$

ἀντικαθιστῶντες δὲ τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ  $\psi$  εἰς τὴν πρώτην ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν

$$\chi - 2.5 = -9, \quad \text{ἐξ ἧς } \chi = 1.$$

3ον)

$$5\chi + 2\psi = 0$$

$$9\chi + 8\psi = 1.$$

Ἐπειδὴ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν συντελεστῶν τοῦ  $\psi$  εἶναι ὁ συντελεστὴς τῆς δευτέρας, πολλαπλασιάζομεν τὴν πρώτην ἐπὶ 4 (τὸ πηλίκον αὐτῶν) καὶ εὐρίσκομεν

$$20\chi + 8\psi = 0$$

$$9\chi + 8\psi = 1,$$

ἀλλάσσοντες δὲ τὰ σημεῖα τῆς δευτέρας καὶ προσθέτοντες κατὰ μέλη,

$$\text{εὐρίσκομεν } 11\chi = -1, \quad \text{ἐξ ἧς } \chi = -\frac{1}{11}.$$

καὶ ἀντικαθιστῶντες τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ  $\chi$  εἰς τὴν δευτέραν εὐρίσκομεν

$$-\frac{9}{11} + 8\psi = 1, \quad \text{ἐξ ἧς } \psi = \frac{5}{22}.$$

4ον)

$$3\chi - 16\psi = 1$$

$$4\chi + 25\psi = 12.$$

πολλαπλασιάζοντες τὴν πρώτην ἐπὶ  $-4$  καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ 3 καὶ προσθέτοντες κατὰ μέλη τὰς ἐξισώσεις ἀπαλείφωμεν τὸν  $\chi$  (προτιμῶμεν δ' αὐτὸν ὡς ἔχοντα μικροτέρους συντελεστάς) καὶ εὐρίσκομεν

$$139\psi = 32, \quad \text{ἐξ ἧς } \psi = \frac{32}{139}.$$

καὶ ἀντικαθιστῶντες τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ  $\psi$  εἰς τὴν πρώτην, εὐρίσκομεν

$$3\chi - 16 \cdot \frac{32}{139} = 1, \quad \text{ὅθεν } \chi = \frac{217}{139}.$$

5ον)

$$5\chi - 3\psi = 8$$

$$15\chi - 9\psi = 12.$$

ἀπαλείφοντες τὸν  $\psi$  εὐρίσκομεν  $0 = +12$  ὥστε τὸ σύστημα τοῦτο εἶναι ἰσοδύναμον τῷ ἐπομένῳ

$$0 = 12$$

$$5\chi - 3\psi = 8.$$

ἐπειδὴ δὲ τοῦτο εἶναι ἀδύνατον, ἔπεται, ὅτι καὶ τὸ δοθὲν εἶναι ἀδύνατον.



6ον

$$\chi - 3\psi = 8$$

$$4\chi - 12\psi = 32.$$

ἀπαλείφοντες τὸν  $\chi$  εὐρίσκομεν τὸ ἰσοδύναμον σύστημα

$$0 = 0$$

$$\chi - 3\psi = 8,$$

ὅπερ ἔχει μόνον μίαν ἐξίσωσιν καὶ ἐπιδέχεται διὰ τοῦτο λύσεις ἀπείρους τὸ πλῆθος· ἄρα καὶ τὸ δοθὲν εἶναι τοιοῦτον· καὶ ὄντως ἡ δευτέρα ἐξίσωσις εἶναι ἰσοδύναμος τῇ πρώτῃ, ὡς προκύπτουσα ἐξ αὐτῆς πολλαπλασιασθείσης ἐπὶ 4· ὥστε ἐδόθη κυρίως μία μόνον ἐξίσωσις μεταξὺ τῶν δύο ἀγνώστων.

\* 156. Ἐστω τέλος τὸ γενικὸν σύστημα

$$\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$$

$$\alpha'\chi + \beta'\psi = \gamma'. \quad (1)$$

Ἴνα ἀπαλείψωμεν μεταξὺ τῶν δύο ἐξισώσεων τὸν ἀγνώστον  $\psi$ , πολλαπλασιάζομεν τὴν μὲν πρώτην ἐπὶ  $\beta'$ , τὴν δὲ δευτέραν ἐπὶ  $-\beta$  καὶ προσθέτομεν ἔπειτα αὐτὰς κατὰ μέλη, ὅτε εὐρίσκομεν

$$(\alpha\beta' - \alpha'\beta) \cdot \chi = \gamma\beta' - \gamma'\beta,$$

ἐξ ἧς, ὑποθέτοντες τὴν παράστασιν  $\alpha\beta' - \alpha'\beta$  διάφορον τοῦ 0, λαμβάνομεν τὴν ἐπομένῃν τιμὴν τοῦ  $\chi$

$$\chi = \frac{\gamma\beta' - \gamma'\beta}{\alpha\beta' - \alpha'\beta}.$$

Ὁμοίως ἀπαλείφοντες τὸν  $\chi$ , εὐρίσκομεν

$$\psi = \frac{\gamma'\alpha - \gamma\alpha'}{\alpha\beta - \alpha'\beta'}.$$

Ὅποτε, ἂν ἡ παράστασις  $\alpha\beta' - \alpha'\beta$  διαφέρει τοῦ 0, τὸ σύστημα τῶν ἐξισώσεων (1) ἐπιδέχεται μίαν λύσιν καὶ μίαν μόνην ἢτοι ὑπάρχει μία τιμὴ τοῦ  $\chi$  καὶ μία τοῦ  $\psi$  ἐπαληθεύουσαι τὸ σύστημα.

\* 157. Μένει πρὸς ἐξέτασιν ἡ περίπτωσις, καθ' ἣν εἶναι

$$\alpha\beta' - \alpha'\beta = 0.$$

καὶ ταύτην ὑποδιαίροῦμεν εἰς τρεῖς ἄλλας.

1) Ἄν ἀμφότεραι αἱ ἐξισώσεις ἔχωσιν ἀγνώστους,

Τότε ἐκ τῶν συντελεστῶν  $\alpha, \beta$  εἷς τοῦλάχιστον διαφέρει τοῦ 0 (ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν  $\alpha', \beta'$ )· ἔστω τοιοῦτος ὁ  $\alpha$ · λέγω, ὅτι καὶ ὁ  $\alpha'$  θὰ εἶναι διάφορος τοῦ 0· διότι, ἂν ἦτο  $\alpha' = 0$ , ἡ ἰσότης  $\alpha\beta' - \alpha'\beta = 0$  (ἧτις συνδέει νῦν τοὺς συντελεστὰς) θὰ ἐγένετο  $\alpha\beta' = 0$ · ὅθεν καὶ  $\beta' = 0$ , ἢτοι ἀμφότεροι οἱ συντελεσταὶ  $\alpha'$  καὶ  $\beta'$  θὰ ἦσαν 0, καὶ ἐπομένως ἡ δευτέρα ἐξίσωσις δὲν θὰ εἶχεν ἀγνώστους· ὅπερ ἐναντίον τῇ ὑποθέσει· ὥστε ὁ  $\alpha'$  διαφέρει τοῦ 0.

Τούτου τεθέντος, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὴν δευτέραν ἐξίσωσιν ἐπὶ  $\alpha$  καὶ ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν ἰσότητα  $\alpha\beta' = \beta'\alpha$ , φέρομεν τὸ δοθὲν σύστημα (1) εἰς τὴν μορφήν

$$\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$$

ἥτοι

$$\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$$

$$\alpha'(\alpha\chi + \beta\psi) = \gamma'\alpha$$

$$\alpha\chi + \beta\psi = \frac{\gamma'\alpha}{\alpha'}$$

Ἄλλ' ἢ δευτέρα ἐξίσωσις ἢ οὐδόλως διαφέρει τῆς πρώτης (εἰάν εἶναι  $\frac{\gamma'\alpha}{\alpha'}$  ἴσον τῷ  $\gamma$ ), ἐπομένως ἐδόθη μία μόνη ἐξίσωσις· ἢ εἶναι ἀσυμβίβαστος

πρὸς αὐτὴν (εἰάν  $\frac{\gamma'\alpha}{\alpha'}$  διαφέρῃ τοῦ  $\gamma$ )· διότι ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς  $\alpha\chi + \beta\psi$

δὲν δύναται νὰ εἶναι ἴσος πρὸς δύο διαφόρους ἀριθμούς. Καὶ ἂν μὲν αἱ δύο ἐξισώσεις τοῦ συστήματος εἶναι μία καὶ ἡ αὐτή, τὸ σύστημα ἐπιδέχεται ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις (ἐδ. 152)· εἰάν δὲ εἶναι ἀσυμβίβαστοι, οὐδεμία ὑπάρχει λύσις.

2) Ἄν μία μόνη ἐξίσωσις ἔχῃ ἀγνώστους· τότε τὸ σύστημα εἶναι

$$0 = \gamma$$

$$\alpha'\chi + \beta'\psi = \gamma'$$

πληροῦται δὲ ἀληθῶς καὶ ἡ ἰσότης  $\alpha\beta' - \alpha'\beta = 0$ . ἀλλὰ τότε, ἂν μὲν ὁ  $\gamma$  διαφέρῃ τοῦ 0, εἶναι ἀδύνατον τὸ σύστημα, ἂν δὲ εἶναι  $\gamma = 0$ , περιορίζεται εἰς μίαν μόνην ἐξίσωσιν  $\alpha'\chi + \beta'\psi = \gamma'$ , ἥτις περιέχει ἢ τὸν ἓνα ἀγνώστον ἢ ἀμφοτέρους· καὶ ἂν μὲν περιέχῃ τὸν ἓνα μόνον ἀγνώστον, ὀρίζει αὐτόν· ἀλλ' ὁ ἄλλος μένει ἀόριστος· ἂν δὲ περιέχῃ καὶ τοὺς δύο, ἐπιδέχεται λύσεις ἀπείρους τὸ πλῆθος (ἐδ. 152)· ὥστε καὶ πάλιν τὸ σύστημα εἶναι ἢ ἀδύνατον ἢ ἀόριστον.

3) Ἄν μήτε ἡ μία ἐξίσωσις μήτε ἡ ἄλλη ἔχῃ ἀγνώστον, τότε τὸ σύστημα εἶναι

$$0 = \gamma$$

$$0 = \gamma'$$

ἀλλὰ τότε, ἂν μὲν ἀμφοτέρα τὰ  $\gamma, \gamma'$  εἶναι 0, ἀληθεύει τὸ σύστημα διὰ πάσας τὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων  $\chi, \psi$ · εἰ δὲ μὴ, εἶναι ἀδύνατον.

Ἐκ πάντων τῶν προειρημένων συνάγεται, ὅτι

Τὸ σύστημα τῶν ἐξισώσεων

$$\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$$

$$\alpha'\chi + \beta'\psi = \gamma'$$

ἐπιδέχεται μίαν καὶ μόνην λύσιν, εἰάν ἢ παράστασις

$$\alpha\beta' - \alpha'\beta$$

εἶναι διάφορος τοῦ 0· ἀλλ' εἰάν τοῦναντίον εἶναι  $\alpha\beta' - \alpha'\beta = 0$ , τὸ σύστημα ἢ οὐδεμίαν ἐπιδέχεται λύσιν ἢ ἔχει ἀπείρους τὸ πλῆθος· καὶ τὸ

μὲν πρῶτον συμβαίνει, ὅταν τις τῶν ἐξισώσεων καθ' ἑαυτὴν εἶναι ἀδύνατος, ἢ ὅταν αἱ δύο ἐξισώσεις εἶναι πρὸς ἀλλήλας ἀσυμβίβαστοι· τὸ δὲ δευτέρον συμβαίνει, ὅταν μία τῶν ἐξισώσεων εἶναι ταυτοῦτης ἢ ὅταν αἱ δύο ἐξισώσεις εἶναι ἰσοδύναμοι.

158. Ἡ ἀπκλοιφὴ τοῦ ἑνὸς ἀγνώστου μεταξύ τῶν δύο ἐξισώσεων καὶ ἐπομένως ἡ λύσις τοῦ συστήματος δύναται καὶ ἄλλως νὰ γίνῃ δυνάμει τοῦ Β' θεωρήματος.

Ἐστω τῶ ὄντι τὸ σύστημα

$$3\chi + 8\psi = 43$$

$$11\chi - 7\psi = -24.$$

Ἐὰν ἡ πρώτη ἐξίσωσις λυθῇ πρὸς τὸ  $\chi$ , τίθεται τὸ σύστημα ὑπὸ τὴν μορφήν

$$\chi = \frac{43 - 8\psi}{3}$$

$$11\chi - 7\psi = -24.$$

εἰ δὲ ἀντικατασταθῇ ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$  εἰς τὴν δευτέραν ἐξίσωσιν, εὐρίσκειται τὸ ἰσοδύναμον (ἐδ. 151) σύστημα

$$\chi = \frac{43 - 8\psi}{3}$$

$$11 \left( \frac{43 - 8\psi}{3} \right) - 7\psi = -24,$$

οὗτινος ἡ δευτέρα ἐξίσωσις ἔχει μόνον ἀγνώστον τὸν  $\psi$  καὶ λυομένη πρὸς αὐτὸν δίδει  $\psi = 5$ · καὶ ἂν ἡ τιμὴ αὕτη τοῦ  $\psi$  τεθῇ εἰς τὴν πρώτην, προκύπτει καὶ ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$

$$\chi = 1.$$

Ἡ μέθοδος αὕτη λέγεται μέθοδος τῆς ἀντικαταστάσεως· δύναται δὲ καὶ ἀμφότεραι αἱ ἐξισώσεις νὰ λυθῶσι πρὸς τὸν αὐτὸν ἀγνώστον καὶ μετὰ ταῦτα νὰ γίνῃ ἡ ἀντικατάστασις.

Ἄλλ' ἡ μέθοδος τῆς ἀντικαταστάσεως προτιμᾶται μόνον ὅταν ἡ ἑτέρα τῶν ἐξισώσεων δοθῇ λελυμένη πρὸς ἓνα ἀγνώστον· ἄλλως προτιμητέα ἡ μέθοδος τῆς προσθέσεως ὡς συντομωτέρα.

**Λύσις οἴουδηποτε συστήματος πρωτοβαθμίων ἐξισώσεων ἐχουσῶν ἀγνώστους ἴσους τὸ πλῆθος.**

159. Ἐστω πρότερον τὸ σύστημα τῶν τριῶν ἐξισώσεων

$$2\chi - 5\psi + 5\omega = 40$$

$$5\chi + 2\psi - \omega = 45$$

$$7\chi - \psi + 9\omega = 98.$$

Ἐάν μεταξύ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας ἀπαλείψωμεν ἓνα ἐκ τῶν ἀγνώστων τῆς πρώτης, ἔστω τὸν  $\psi$ , (δι' ὁποτέρας τῶν μεθόδων), εὐρίσκομεν ἐξίσωσιν δύο μόνον ἀγνώστους περιέχουσιν καὶ δυναμένην νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν δευτέραν· ὁμοίως, ἂν μεταξύ τῆς πρώτης καὶ τῆς τρίτης ἀπαλείψωμεν τὸν αὐτὸν ἀγνώστον, εὐρίσκομεν ἐξίσωσιν περιέχουσιν τοὺς αὐτοὺς δύο ἀγνώστους καὶ δυναμένην νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν τρίτην· οὕτω φθάνομεν εἰς τὸ ἰσοδύναμον σύστημα

$$\begin{aligned} 2\chi - 5\psi + 5\omega &= 40 \\ 29\chi + 5\omega &= 305 \\ 33\chi + 40\omega &= 450. \end{aligned}$$

Ἐπειδὴ δὲ αἱ δύο τελευταῖαι ἐξισώσεις αὐτοῦ περιέχουσι δύο μόνον ἀγνώστους, (ἦτοι ἀποτελοῦσιν ἴδιον σύστημα δύο ἐξισώσεων δύο ἀγνώστους ἔχουσῶν), δυνάμεθα νὰ λύσωμεν αὐτὰς πρὸς τοὺς δύο ἀγνώστους, (διότι ἐμάθομεν τοῦτο)· ἔάν δέ, εὐρόντες τὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων τούτων ( $\chi=10$ ,  $\omega=3$ ), ἀντικαταστήσωμεν αὐτὰς εἰς τὴν πρώτην ἐξίσωσιν, θὰ εὕρωμεν ἐξίσωσιν μόνον τὸν ἄλλον ἀγνώστον περιέχουσιν καὶ ἐπομένως προσδιορίζομεν καὶ τοῦτον ( $\psi=-1$ ).

Οὕτως ἀνάγεται ἡ λύσις τοῦ συστήματος τριῶν ἐξισώσεων τρεῖς ἀγνώστους ἔχουσῶν εἰς τὴν λύσιν συστήματος δύο ἐξισώσεων δύο ἀγνώστους ἔχουσῶν.

Ἐστῶσαν νῦν  $n$  ἐξισώσεις τοῦ πρώτου βαθμοῦ ἰσαριθμοὺς ἀγνώστους περιέχουσαι· ἔάν ἀγνώστον τινα τῆς πρώτης ἀπαλείψωμεν μεταξύ αὐτῆς καὶ ἐκάστης τῶν λοιπῶν, εὐρίσκομεν  $n-1$  ἐξισώσεις (μίαν ἐξ ἐκάστης τῶν λοιπῶν), αἵτινες μετὰ τῆς πρώτης τῶν ἐξισώσεων ἀποτελοῦσι σύστημα ἰσοδύναμον τῷ δοθέντι, (διότι ἐκάστη νέα ἐξίσωσις δύναται νὰ ἀντικαταστήσῃ ἐκείνην, ἣτις συνδυασθεῖσα μετὰ τῆς πρώτης ἔδωκεν αὐτήν, καὶ τὸ σύστημα μένει ἰσοδύναμον). Αἱ νέαι αὗται ἐξισώσεις περιέχουσι μόνον τοὺς  $n-1$  ἀγνώστους καὶ ἐπομένως ἀποτελοῦσιν ἴδιον σύστημα  $n-1$  ἐξισώσεων μετὰ  $n-1$  ἀγνώστων· ἔάν δὲ τοῦτο τὸ σύστημα λυθῇ καὶ ἀντικατασταθῶσιν αἱ τιμαὶ τῶν  $n-1$  ἀγνώστων εἰς τὴν πρώτην ἐξίσωσιν, θὰ μείνῃ ἐν αὐτῇ εἰς μόνον ἀγνώστος καὶ ἐπομένως θὰ προσδιορισθῇ καὶ οὗτος· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἀνάγεται ἡ λύσις παντὸς συστήματος πρωτοβαθμίων ἐξισώσεων εἰς τὴν λύσιν ἄλλου συστήματος μίαν ἐξίσωσιν καὶ ἓνα ἀγνώστον ἔχοντος ὀλιγώτερα.

Διὰ τοῦ τρόπου τούτου δυνάμεθα νὰ λύσωμεν οἰονδήποτε σύστημα·

διότι δι' αὐτοῦ ἀνάγεται ἡ λύσις τῶν  $n$  ἐξισώσεων εἰς τὴν λύσιν τῶν  $n-1$ , καὶ τούτων πάλιν εἰς τὴν λύσιν τῶν  $n-2$ , καὶ οὕτω καθεξῆς, καὶ τέλος εἰς τὴν λύσιν δύο ἐξισώσεων δύο ἀγνώστους ἔχουσῶν, τὴν ὁποίαν λύσιν ἐμάθομεν.

### \* Παρατηρήσεις.

Πολλάκις ἡ φύσις τῶν ἐξισώσεων παρέχει τρόπον λύσεως συντομώτερον τοῦ γενικοῦ.

Οὕτω, λόγου χάριν, δὲν εἶναι ἀδιάφορος πρὸς τὴν συντομίαν τῆς λύσεως ἡ ἐκλογή τοῦ ἀπαλειπτέου ἀγνώστου ἐν ἐκάστη μεταβάσει ἀπὸ συστήματος εἰς σύστημα, οὐδὲ ἡ ἐκλογή τῆς ἐξισώσεως, ἥτις μόνη αὕτη συνδυάζεται πρὸς πάσας τὰς ἄλλας· ἀλλ' οὐδὲ εἶναι ἀνάγκη νὰ συνδυάζηται πάντοτε μία καὶ ἡ αὐτὴ ἐξίσωσις πρὸς τὰς ἄλλας, ἀλλὰ ποικίλοι συνδυασμοὶ δύο ἢ περισσοτέρων ἐξισώσεων (ἢ καὶ πασῶν) δύνανται νὰ γίνωσι, δι' ὧν ταχύτερον νὰ εὐρίσκηται ἡ λύσις.

Καὶ ταῦτα μὲν γενικῶς, ἰδίᾳ δὲ παρατηροῦμεν τὰ ἐξῆς.

1) Ἐὰν ἐξισώσεις τις ἐνὸς συστήματος δὲν ἔχη τινὰ τῶν ἀγνῶστων, ἡ ἐξίσωσις αὕτη θὰ εἶναι ἐξίσωσις καὶ τοῦ ἐπομένου συστήματος (τοῦ μίαν ἐξίσωσιν καὶ ἓνα ἀγνώστον ἔχοντος ὀλιγώτερα), ἐὰν ὡς ἀπαλειπτέος ἀγνώστος ληθῆ ὁ ἐν τῇ ἐξίσώσει μὴ ὑπάρχων.

Ἐστω ὡς παράδειγμα τὸ σύστημα τῶν τεσσάρων ἐξισώσεων

$$3\chi - 5\psi + 4\varphi + \omega = 0$$

$$2\chi + 4\psi - \varphi - 2\omega = 1$$

$$5\chi - \psi = 2$$

$$3\chi + 8\psi + 8\omega = 10.$$

Ἐπειδὴ ὁ  $\varphi$  δὲν ὑπάρχει εἰς τὰς δύο τελευταίας ἐξισώσεις, λαμβάνοντες τοῦτον ὡς ἀπαλειπτέον ἀγνώστον, εὐρίσκομεν τὸ σύστημα

$$11\chi + 11\psi - 7\omega = 4$$

$$5\chi - \psi = 2$$

$$3\chi + 8\psi + 8\omega = 10,$$

τοῦ ὁποίου ἡ πρώτη ἐξίσωσις προέκυψεν ἐκ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας τοῦ δοθέντος συστήματος, αἱ δὲ λοιπαὶ δύο εἶναι αὐταὶ αἱ δοθεῖσαι.

Ἐπειδὴ δὲ πάλιν ἡ δευτέρα ἐξίσωσις δὲν ἔχει τὸν ἀγνώστον  $\omega$ , λαμβάνοντες τοῦτον ὡς ἀπαλειπτέον, εὐρίσκομεν τὸ σύστημα

$$109\chi + 144\psi = 102$$

$$5\chi - \psi = 2.$$

2) Ἐνίοτε προσθέτοντες κατὰ μέλη τὰς ἐξισώσεις τοῦ συστήματος (ἢ πάσας ἢ τινὰς μόνον), εὐρίσκομεν τὴν λύσιν. Οὕτως ἐν τῷ συστήματι

$$\begin{aligned} \chi + \psi - \varphi &= 3 \\ \chi - \psi + \varphi &= 5 \\ -\chi + \psi + \varphi &= 9 \end{aligned}$$

ἐὰν προσθέσωμεν τὰς ἐξισώσεις ἀνὰ δύο, εὐρίσκομεν

$$2\chi = 8, \quad 2\psi = 12, \quad 2\varphi = 14.$$

Ὅμοίως εἰς τὸ σύστημα

$$\begin{aligned} \chi + \psi + \varphi &= 5 \\ \psi + \varphi + \omega &= 4 \\ \varphi + \omega + \chi &= 8 \\ \omega + \chi + \psi &= 13 \end{aligned}$$

ἐὰν προσθέσωμεν πάσας τὰς ἐξισώσεις κατὰ μέλη καὶ διαιρέσωμεν τὴν προκύπτουσαν διὰ 3, εὐρίσκομεν

$$\chi + \psi + \varphi + \omega = 10.$$

Ἐὰν δὲ ἀπὸ ταύτης ἀφαιρεθῇ ἐκάστη τῶν δοθεισῶν, προκύπτει

$$\omega = 5, \quad \chi = 6, \quad \psi = 2, \quad \varphi = -3$$

Παρατηρητέον δὲ, ὅτι ὑπάρχουσι πάντοτε πολλαπλασιασταὶ τινες, ἐφ' οὓς πολλαπλασιαζόμεναι αἱ ἐξισώσεις τοῦ τυχόντος συστήματος καὶ προστιθέμεναι κατὰ μέλη δίδουσι ἐξίσωσιν ἓνα μόνον (ἢ οὐδένα) ἄγνωστον περιέχουσαν καὶ ἐπομένως προσδιορίζουσαν αὐτόν· ἀλλ' ἡ εὕρεσις τῶν πολλαπλασιαστῶν τούτων ὑπερβαίνει τὰ ὄρια τοῦ παρόντος ἔργου.

ΣΗΜ. Ἐὰν ἐκ τῆς προσθέσεως ἐξισώσεών τινων τοῦ συστήματος (πολλαπλασιασμένων ἐκάστης ἐπὶ ἀριθμὸν διάφορον τοῦ 0) προκύπτῃ ἐξίσωσις μηδὲνα περιέχουσα ἄγνωστον, τὸ σύστημα εἶναι ἢ ἀδύνατον, ἢ ἀόριστον.

Πρὸς ἄσκησιν προτείνομεν εἰς λύσιν καὶ τὰ ἐπόμενα συστήματα·

$$1^{\text{ον}}) \begin{cases} \chi + 2\psi - \omega = 2 \\ 3\chi - \psi + 4\omega = 27 \\ 4\chi + \psi - 5\omega = -11 \end{cases} \quad \begin{matrix} \chi = 3 \\ \psi = 2 \\ \omega = 5 \end{matrix}$$

$$2^{\text{ον}}) \begin{cases} \chi + \psi = \gamma \\ \psi + \omega = \alpha \\ \omega + \chi = \beta \end{cases} \quad \begin{matrix} \chi = \frac{1}{2} (\beta + \gamma - \alpha) \\ \psi = \frac{1}{2} (\gamma + \alpha - \beta) \\ \omega = \frac{1}{2} (\alpha + \beta - \gamma) \end{matrix}$$

$$3ον) \begin{cases} \chi - \psi = \alpha \\ \psi - \omega = \beta \\ \omega - \chi = \gamma \end{cases}$$

$$4ον) \begin{cases} \chi - 8\psi + 3\omega - \varphi = -1 & \varphi = \frac{1}{4} \\ \psi - 2\omega - \varphi = 0 & \omega = \frac{1}{10} \\ 5\omega + 2\varphi = 0 & \psi = \frac{1}{20} \\ 4\varphi = 1 & \chi = \frac{1}{20} \end{cases}$$

$$5ον) \begin{cases} 5\chi - 7\psi + 4\omega + \varphi = 31 & \omega = 1 \\ 3\chi + \psi - \omega - 2\varphi = 10 & \varphi = 2 \\ 2\omega - \varphi = 0 & \psi = 0 \\ 7\omega + 2\varphi = 11 & \chi = 5 \end{cases}$$

$$6ον) \begin{cases} 2\chi - \psi + 5\omega - \varphi = 11 & \chi = 1 \\ 2\chi + \psi - 3\omega + 4\varphi = 11 & \psi = 2 \\ \chi + 5\psi - 3\omega + \varphi = 6 & \omega = 3 \\ 6\chi - \psi + 4\omega + 2\varphi = 24 & \varphi = 4 \end{cases}$$

Τὰ ἐξῆς συστήματα ἀνάγονται εἰς πρωτοβάθμια, ἐὰν θεωρηθῶσιν ὡς ἄγνωστοι τὰ  $\frac{1}{\chi}$  καὶ  $\frac{1}{\psi}$  καὶ παρασταθῶσι διὰ  $\chi'$  καὶ  $\psi'$ · εὐρεθέντων δὲ τῶν  $\chi'$   $\psi'$  εὐρίσκονται εὐκόλως καὶ τὰ  $\chi$ ,  $\psi$ .

$$7ον) \begin{cases} \frac{2}{\chi} - \frac{1}{\psi} = 1 \\ \frac{7}{\chi} + \frac{2}{\psi} = 20 \end{cases} \quad \chi = \frac{1}{2}, \quad \psi = \frac{1}{3}.$$

$$8ον) \quad \chi\psi = \alpha(\chi + \psi), \quad \psi\omega = \beta(\psi + \omega), \quad \omega\chi = \gamma(\omega + \chi).$$

Ἡ ἐξίσωσις  $\chi + \psi = 2$  προφανῶς ἔχει ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις, καὶ ὁμῶς διὰ τῶν ἐξῆς συλλογισμῶν φθάνομεν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι δὲν ἔχει οὐδεμίαν λύσιν· διότι ἐξ αὐτῆς ἔπεται

$$(\chi + \psi)^2 = 4,$$

$$\text{ἐκ δὲ τούτων συνάγεται} \quad (\chi + \psi)^2 - 4 = \chi + \psi - 2.$$

$$\text{καὶ διαιροῦντες ἀμφότερα τὰ ἴσα διὰ} \quad \chi + \psi - 2,$$

εὐρίσκομεν τὴν ἐξίσωσιν

$$\chi + \psi + 2 = 1 \quad \text{ἢ καὶ} \quad \chi + \psi = -1.$$

αὕτη δὲ μετὰ τῆς δοθείσης ἐξισώσεως συνδυαζομένη δίδει

$$2 = -1, \quad \text{ὅπερ ἄτοπον.}$$

Νὰ εὐρεθῇ τὸ σφάλμα.

### Προβλήματα.

1<sup>ον</sup>) Εὑρεῖν κλάσμα, τὸ ὁποῖον, ἂν μὲν ἀυξηθῶσι κατὰ μονάδα οἱ ὄροι αὐτοῦ, νὰ γίνηται ἴσον τῷ  $\frac{4}{5}$ , ἂν δὲ ἐλαττωθῶσι κατὰ μονάδα, νὰ γίνηται ἴσον τῷ  $\frac{3}{4}$ .

Ἐὰν παραστήσωμεν διὰ τοῦ  $\chi$  τὸν ἀριθμητὴν καὶ διὰ τοῦ  $\psi$  τὸν παρονομαστὴν τοῦ ζητουμένου κλάσματος, θὰ ἔχωμεν

$$\frac{\chi+1}{\psi+1} = \frac{4}{5} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\chi-1}{\psi-1} = \frac{3}{4},$$

ἥτοι

$$5\chi - 4\psi = -1$$

$$4\chi - 3\psi = 1.$$

Πρέπει δὲ νὰ εἶναι οἱ  $\chi$ ,  $\psi$  ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοί.

Λύοντες τὸ σύστημα εὐρίσκομεν  $\chi=7$ ,  $\psi=9$ . ἑπομένως τὸ ζητούμενον κλάσμα εἶναι  $\frac{7}{9}$ .

2<sup>ον</sup>) Εὑρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις διαιρούμενος διὰ 7 νὰ δίδῃ ὑπόλοιπον 1 διὰ 11 ὑπόλοιπον 10 καὶ διὰ 13 ὑπόλοιπον 3· τὸ δὲ ἄθροισμα τῶν, τριῶν πηλίκων νὰ εἶναι ἴσον πρὸς τὰ τρία δέκατα τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\chi$  παραστήσωμεν τὸν ἀριθμὸν καὶ διὰ  $\omega$ ,  $\phi$ ,  $\psi$  τὰ τρία πηλικά, θὰ ἔχωμεν

$$\chi = 7\omega + 1$$

$$\chi = 11\phi + 10$$

$$\chi = 13\psi + 3$$

$$\omega + \phi + \psi = \frac{3}{10}\chi,$$

πρέπει δὲ πάντες οἱ ἀγνωστοὶ νὰ εἶναι ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοί.

Ἐὰν αἱ τιμαὶ τῶν  $\omega$ ,  $\phi$ ,  $\psi$ , ληφθεῖσαι ἐκ τῶν τριῶν πρώτων ἐξι-  
σώσεων, ἀντικατασταθῶσιν εἰς τὴν τετάρτην, προκύπτει ἡ ἐξίσωσις

$$\frac{\chi-1}{7} + \frac{\chi-10}{11} + \frac{\chi-3}{13} = \frac{3}{10}\chi,$$

ἐξ ἧς εὐρίσκομεν  $\chi=120$ . ἔθεν  $\phi=10$ ,  $\omega=17$ ,  $\psi=9$ .

3<sup>ον</sup>) Εὑρεῖν ἀριθμὸν διψήφιον ἔχοντα τὰς ἐξῆς ιδιότητας· τὸ τετρα-  
πλοῦν τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων νὰ ὑπερβαίῃ κατὰ μονάδα τὸ τριπλοῦν  
τοῦ ψηφίου τῶν δεκάδων· ἂν δὲ γραφῶσι τὰ ψηφία κατ' ἀντίστροφον  
τάξιν, νὰ προκύπτῃ ἀριθμὸς μικρότερος κατὰ 36.



Ἔστωσαν  $\chi$  αἱ δεκάδες καὶ  $\psi$  αἱ μονάδες τοῦ ἀριθμοῦ.

Κατὰ πρῶτον εἶναι  $4\psi - 3\chi = 1$ .

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀριθμὸς ἔχει τὸ ὄλον  $10\chi + \psi$  μονάδας καὶ ὁ ἐξ αὐτοῦ προκύπτων (διὰ τῆς ἀντιστροφῆς τῶν ψηφίων) ἔχει μονάδας τὸ ὄλον  $10\psi + \chi$ , ἔπεται ἡ ἐξίσωσις

$$10\chi + \psi = 10\psi + \chi + 36 \quad \text{ὅθεν } 9\chi - 9\psi = 36.$$

Ἔχομεν ἄρα τὸ σύστημα

$$4\psi - 3\chi = 1$$

$$\chi - \psi = 4.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ἀμφότεροι οἱ ἀγνωστοὶ θετικοὶ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ καὶ μικρότεροι τοῦ 10.

Ἐπειδὴ δὲ λύοντες τὰς ἐξισώσεις εὐρίσκομεν  $\chi = 17$  καὶ  $\psi = 13$ , συμπεραίνομεν, ὅτι τοιοῦτος ἀριθμὸς οὐδεὶς ὑπάρχει.

4<sup>ον</sup>) Ἰέρων ὁ τύραννος τῶν Συρακουσῶν ἔδωκεν εἰς χρυσοχόον 10 λίτρας χρυσοῦ, ἵνα κατασκευάσῃ ἐξ αὐτοῦ στέφανον τοῦ Διός. Ὑποπιεύσας δὲ μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ στεφάνου, ὅτι ὁ χρυσοχόος ἀνικαιότησε δι' ἀργύρου μέρος τοῦ χρυσοῦ, ἠρώτησε τὸν Ἀρχιμήδην, ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνακαλυφθῇ τοῦτο. Ὁ Ἀρχιμήδης γνωρίζων, ὅτι ὁ χρυσοῦς ἀποβάλλει ἐν τῷ ὕδατι τὰ 52 χιλιοστὰ τοῦ βάρους του, ὁ δὲ ἀργυρὸς τὰ 99, ἐζύγισε τὸν στέφανον ἐν τῷ ὕδατι καὶ εὔρεν αὐτὸν 9 λίτρων καὶ 6 οὔγγιων· οὗτοι δὲ ἀνεκάλυψε τὸν δόλον. Ζητεῖται, πόσος ἀργυρὸς καὶ πόσος χρυσοῦς ὑπῆρχεν ἐν τῷ στεφάνῳ.

Ἔστω  $\chi$  ὁ ἀριθμὸς τῶν οὔγγιων τοῦ ἐν τῷ στεφάνῳ χρυσοῦ καὶ  $\psi$  ὁ τοῦ ἀργύρου· κατὰ πρῶτον ἔχομεν τὴν ἐξίσωσιν (ἀνεκμνηστέον, ὅτι 1 λίτρ. = 16 οὔγγ.)

$$\chi + \psi = 160.$$

Ἐπειδὴ δὲ ὁ χρυσοῦς ἀποβάλλει ἐν τῷ ὕδατι τὰ 52 χιλιοστὰ τοῦ βάρους του, τὸ βάρος  $\chi$  τοῦ ἐν τῷ στεφάνῳ χρυσοῦ θὰ ἀποβάλλῃ ἐν

τῷ ὕδατι  $\frac{52}{1000}\chi$  οὔγγιας· ὁμοίως τὸ βάρος  $\psi$  τοῦ ἀργύρου θὰ ἀπο-

βάλλῃ οὔγγιας  $\frac{99}{1000}\psi$ . τὸ δὲ ἄθροισμα τῶν δύο τούτων ἀπωλειῶν θὰ

συναποτελέσῃ τὴν ὅλην ἀπώλειαν τοῦ βάρους τοῦ στεφάνου ἐν τῷ ὕδατι, ἥτοι 10 οὔγγιας, ἐξ ὧν ἔπεται ἡ ἐξίσωσις

$$\frac{52}{1000}\chi + \frac{99}{1000}\psi = 10$$

$$\eta \quad 52\chi + 99\psi = 10000.$$

Λύοντες δὲ τὰς ἐξισώσεις ταύτας, εὐρίσκομεν

$$\chi = 7 \text{ λίτρ. } 12 \text{ οὐγγίαι καὶ } \frac{12}{47} \text{ οὐγγίαις.}$$

$$\psi = 2 \text{ λίτρ. } 3 \text{ οὐγγίαι καὶ } \frac{35}{47} \text{ οὐγγίαις.}$$

ΣΗΜ. Τὸ πρόβλημα τοῦτο λύεται καὶ ἄνευ ἐξισώσεων ὡς ἐξῆς. Ἄν ὁ στέφανος ἦτο ὅλος ἐκ χρυσοῦ, θὰ ἔχανεν ἐν τῷ ὕδατι τὰ 0,052 τοῦ βάρους του, ἤτοι θὰ ἔχανεν οὐγγίας  $0,052 \times 160$  ἢ 8,32 οὐγγ. ἀλλὰ τώρα χάνει 10 οὐγγίαις, ἤτοι χάνει 1,68 οὐγγ. περισσότερον τοῦ πρέποντος, καὶ ἐπειδὴ δι' ἐκάστην οὐγγίαν χρυσοῦ, ἦν ἀντικαθιστῶμεν δι' ἀργύρου, χάνει ὁ στέφανος 0,047 τῆς οὐγγίαις περισσότερον (διότι τοῦ χρυσοῦ ἡ οὐγγία χάνει τὰ 0,052, ἐνῶ τοῦ ἀργύρου χάνει τὰ 0,099 αὐτῆς), συμπεραίνομεν, ὅτι τόσαι οὐγγίαι ἀργύρου θὰ εἶναι (ἂν δι' ἀργύρου ἐνοθεύθῃ ὁ στέφανος) ὅσας φορὰς χωρεῖ τὸν ἀριθμὸν 0,047 ὁ 1,68, ἤτοι  $\frac{1680}{47}$  ἢ 2 λίτρ. 3 οὐγγ. καὶ  $\frac{35}{47}$  τῆς οὐγγίαις.

5<sup>η</sup>) Νὰ εὐρεθῇ κλάσμα, τὸ ὁποῖον γίνεται ἴσον μὲ  $\frac{1}{5}$ , ἂν ἀφαιρεθῇ ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν ὄρων του ὁ 5, καὶ ἴσον μὲ  $\frac{1}{3}$ , ἂν ἀφαιρεθῇ ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν ὄρων του ὁ 3.

Ἐστω  $\chi$  ὁ ἀριθμητὴς καὶ  $\psi$  ὁ παρονομαστὴς τοῦ ζητουμένου κλάσματος· κατὰ τοὺς ὄρους τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\frac{\chi - 5}{\psi - 5} = \frac{1}{5} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\chi - 3}{\psi - 3} = \frac{1}{3}$$

αἱ ἐξισώσεις αὗται γράφονται καὶ ὡς ἐξῆς·

$$3\chi - \psi = 6.$$

$$5\chi - \psi = 20,$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι οἱ  $\chi$  καὶ  $\psi$  ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Λύοντες τὰς ἐξισώσεις ταύτας εὐρίσκομεν  $\chi = 7$ ,  $\psi = 15$ . ὥστε τὸ ζητούμενον κλάσμα εἶναι τὸ  $\frac{7}{15}$ .

6<sup>η</sup>) Νὰ εὐρεθῇ διψήφιος ἀριθμὸς, οὗ τὰ ψηφία ἔχουσιν ἄθροισμα 15 καὶ ὅστις ἀντιστροφόμενος ἐλαττοῦται κατὰ 9.

Ἐπίτωσαν  $\chi$  αἱ δεκάδες καὶ  $\psi$  αἱ μονάδες τοῦ ἀριθμοῦ.

Ἐν πρώτοις εἶναι  $\chi + \psi = 15$ .

Ὁ ἀριθμὸς ἔχει τὸ ὅλον  $10\chi + \psi$  μονάδας, ἀντιστροφόμενος δὲ θὰ ἔχη  $\chi + 10\psi$ , αὗται δὲ θὰ εἶναι ὀλιγώτεροι τῶν πρώτων κατὰ 9, ὅθεν ἔπεται ἡ ἐξίσωσις

$$10\chi + \psi = \chi + 10\psi + 9$$

ἢ

$$9\chi = 9\psi + 9, \quad \text{ἤτοι} \quad \chi = \psi + 1.$$

ἔχομεν ἄρα τὸ σύστημα  $\chi + \psi = 15$

$$\chi = \psi + 1,$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ἀμφότεροι οἱ ἀριθμοὶ  $\chi, \psi$  ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ καὶ μικρότεροι τοῦ 10.

Λύοντες τὸ σύστημα εὐρίσκομεν  $\chi = 8, \psi = 7$ . Ἔθεν ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι ὁ 87.

7ον) Ἐρωτηθεὶς τις περὶ τῆς ἡλικίας τοῦ υἱοῦ του, ἀπεκρίθη· πρὸ 8 ἐτῶν ἡ ἡλικία μου ἦτο τριπλασία τῆς τοῦ υἱοῦ μου, μετὰ 8 δὲ ἔτη θὰ εἶναι διπλασία· ζητοῦνται αἱ ἡλικίαι αὐτῶν.

Ἐὰν παρασταθῇ τοῦ πατρὸς ἡ ἡλικία διὰ τοῦ  $\chi$ , τοῦ δὲ υἱοῦ διὰ τοῦ  $\psi$ , αἱ ἡλικίαι αὐτῶν πρὸ 8 ἐτῶν ἦσαν

$$\chi - 8 \quad \text{καὶ} \quad \psi - 8,$$

μετὰ 8 δὲ ἔτη αἱ ἡλικίαι θὰ εἶναι

$$\chi + 8 \quad \text{καὶ} \quad \psi + 8.$$

ἐπομένως κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος θὰ εἶναι

$$\begin{array}{l} \chi - 8 = 3(\psi - 8) \quad \text{ἢ} \quad \chi - 3\psi = -16 \\ \chi + 8 = 2(\psi + 8) \quad \chi - 2\psi = 8, \end{array}$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ἀμφότεροι οἱ ἀριθμοὶ  $\chi, \psi$  θετικοὶ καὶ νὰ μὴ ὑπερβαίνωσι τὴν δυνατὴν ἡλικίαν τῶν ἀνθρώπων.

Λύοντες τὰς δύο ἐξισώσεις εὐρίσκομεν  $\chi = 56 \quad \psi = 24$ , ἡ δὲ λύσις αὕτη πληροῖ πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

8ον) Ἐχων τις τρία καλάθια μὲ μῆλα ἔλαβεν ἐκ τοῦ πρώτου καὶ ἔθεσεν εἰς τὰ δύο ἄλλα, εἰς ἕκαστον τόσα ὅσα αὐτὸ εἶχεν ἔπειτα ἔλαβεν ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ ἔθεσεν εἰς τὰ δύο ἄλλα, εἰς ἕκαστον τόσα ὅσα τότε εἶχεν ἔπειτα καὶ ἐκ τοῦ τρίτου ὁμοίως· τότε δὲ καὶ τὰ τρία καλάθια εἶχον ἴσον ἀριθμὸν μῆλων, ἦτοι 80· ζητεῖται, πόσα εἶχεν ἕκαστον ἐν ἀρχῇ.

Ἐστῶσαν  $\chi$  ὁ ἀριθμὸς τῶν μῆλων τοῦ πρώτου,  $\psi$  ὁ ἀριθμὸς τοῦ δευτέρου καὶ  $\omega$  τοῦ τρίτου.

Εἰς τὴν πρώτην μετάθεσιν τῶν μῆλων ἀφηρέθησαν ἀπὸ τοῦ πρώτου καλάθιου τόσα μῆλα, ὅσα εἶχον τὰ δύο ἄλλα ὁμοῦ, ἦτοι  $\psi + \omega$ , τῶν δὲ δύο ἄλλων τὰ μῆλα ἐδιπλασιάσθησαν, ὥστε τὰ μῆλα ἦσαν μετ' αὐτὴν

$$\chi - \psi - \omega, \quad 2\psi, \quad 2\omega.$$

εἰς τὴν δευτέραν μετάθεσιν ἐδιπλασιάσθησαν μὲν τὰ μῆλα τοῦ πρώτου καὶ τοῦ τρίτου καλάθιου, ἀφηρέθησαν δὲ ἀπὸ τοῦ δευτέρου τόσα, ὅσα

περιεῖχον τὰ δύο ἄλλα· ἐπομένως οἱ ἀριθμοὶ τῶν μῆλων ἔγιναν

$$2(\chi - \psi - \omega), \quad 2\psi - (\chi - \psi - \omega) - 2\omega, \quad 4\omega$$

$$\eta \quad 2\chi - 2\psi - 2\omega, \quad 3\psi - \omega - \chi \quad 4\omega.$$

εἰς δὲ τὴν τρίτην μετὰθεσιν ἔγιναν ὁμοίως

$$4\chi - 4\psi - 4\omega, \quad 6\psi - 2\omega - 2\chi, \quad 7\omega - \chi - \psi.$$

Ἐπομένως κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος εἶναι

$$4\chi - 4\psi - 4\omega = 80 \quad \chi - \psi - \omega = 20$$

$$-2\chi + 6\psi - 2\omega = 80 \quad (1) \quad \eta \quad -\chi + 3\psi - \omega = 4^{(1)} \quad (1)$$

$$-\chi - \psi + 7\omega = 80 \quad -\chi - \psi + 7\omega = 80,$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  ἀκέραιοι καὶ θετικοί.

Ἴνα λύσωμεν τὸ σύστημα (1), προσθέτομεν κατὰ μέλη τὰς ἐξισώσεις αὐτοῦ, ὅτε εὐρίσκομεν

$$\chi + \psi + \omega = 240 \quad (2)$$

(ὅπερ καὶ ἐκ τῶν προτέρων ἦτο φανερόν· διότι ὁ ὀλικὸς ἀριθμὸς τῶν μῆλων δὲν μετεβλήθη).

Ἐὰν δὲ προσθέσωμεν τὴν ἐξίσωσιν ταύτην εἰς ἐκάστην τῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος (1), εὐρίσκομεν

$$\chi = 130, \quad \psi = 70, \quad \omega = 40.$$

Τὸ πρόβλημα τοῦτο δύναται νὰ λυθῆ καὶ ἄνευ ἐξισώσεων ὡς ἐξῆς. Εἰς τὴν τελευταίαν μετὰθεσιν ἐδιπλασιάσθησαν τὰ μῆλα τῶν δύο πρώτων καλαθίων, ἐπομένως ταῦτα εἶχον πρὶν 40 καὶ 40 μῆλα· ὅθεν τὸ τρίτον εἶχεν 160· εἰς τὴν δευτέραν μετὰθεσιν ἐδιπλασιάσθησαν τὰ μῆλα τοῦ πρώτου καὶ τοῦ τρίτου· λοιπὸν εἶχε τὸ μὲν πρῶτον 20, τὸ δὲ τρίτον 80· ἄρα εἶχε τὸ δεύτερον 140 τέλος εἰς τὴν πρώτην ἐδιπλασιάσθησαν τὰ μῆλα τοῦ δευτέρου καὶ τοῦ τρίτου, ἄρα τὸ μὲν δεύτερον εἶχεν 70, τὸ δὲ τρίτον 40· ἐπομένως τὸ πρῶτον εἶχεν 130.

9<sup>ον</sup>) Δύο βυτία ἐντελῶς ἴσα καὶ ὁμοία τὴν κατασκευὴν εἶναι πλήρη, τὸ μὲν ἐν ἐλαίῳ, τὸ δὲ ἄλλο ὕδατος καὶ τὸ μὲν πρῶτον ζυγίζει α ὀκάδας, τὸ δὲ δεύτερον β. Πόσον εἶναι τὸ ἐλαιὸν καὶ πόσον τὸ ὕδωρ; καὶ πόσον ζυγίζει τὸ καθὲν βυτίον κενόν;

Ἐὰν παραστήσωμεν διὰ  $\chi$  τὸ βᾶρος τοῦ ἐτέρου ἐκ τῶν δύο βυτίων κενοῦ καὶ διὰ  $\psi$  τὸ βᾶρος τοῦ ὕδατος καὶ διὰ  $\omega$  τὸ βᾶρος τοῦ ἐλαίου, θὰ εἶναι κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος

$$\chi + \psi = \beta$$

$$\chi + \omega = \alpha.$$

Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐλαιὸν καὶ τὸ ὕδωρ τῶν δύο βυτίων ἔχουσιν ἴσους ὄγκους,

τὸ βάρος  $\omega$  τοῦ ἐλαίου θὰ εἶναι τὰ 0,912 τοῦ βάρους  $\psi$  τοῦ ὕδατος, ἴτοι  
 $\omega = 0,912 \cdot \psi$ .

Ἀπαλείφοντες νῦν τὸ  $\omega$  εὐρίσκομεν τὸ σύστημα

$$\begin{aligned} \chi + \psi &= \beta \\ 1000\chi + 912\psi &= 1000\alpha, \end{aligned}$$

ἐξ οὗ εὐρίσκομεν λύοντες

$$\chi = \frac{1000\alpha - 912\beta}{88}, \quad \psi = \frac{1000(\beta - \alpha)}{88} \quad \text{καὶ} \quad \omega = \frac{912(\beta - \alpha)}{88}.$$

Ὅτι  $\beta$  εἶναι μεγαλύτερον τοῦ  $\alpha$  εἶναι προφανές· ἀλλὰ καὶ ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$  πρέπει νὰ εἶναι θετικὴ· ἴτοι πρέπει νὰ εἶναι

$$0,912 \beta < \alpha < \beta.$$

ΣΗΜ. Ἐὰν προβλήμα τι ἔχη μὲν πολλοὺς ἀγνώστους, ἀλλὰ τοιοῦτους, ὥστε ἐκ τοῦ ἑνὸς νὰ εὐρίσκωνται εὐκόλως καὶ οἱ ἄλλοι, τὸ τοιοῦτον πρόβλημα δύναται νὰ λυθῇ καὶ διὰ μιᾶς ἐξίσωσης καὶ διὰ πολλῶν (τοιαῦτα εἶναι τὰ προβλήματα τῶν ἐδαφίων 120, 127, 129, 133, 134 καὶ τὸ 2<sup>ον</sup> καὶ 4<sup>ον</sup> ἐκ τῶν προηγουμένων)· διὰ μιᾶς μὲν, ἐὰν παρασταθῇ ὁ περι οὗ ὁ λόγος ἀγνώστου δι' ἑνὸς γράμματος καὶ ἐκφρασθῶσι δι' αὐτοῦ οἱ λοιποί, μετὰ δὲ ταῦτα εὐρεθῇ ἡ ἐξίσωσις, ἣν ὁ ἀγνώστος οὗτος ἐπαληθεύει· διὰ πολλῶν δὲ, ἐὰν ἕκαστος τῶν ἀγνώστων παρασταθῇ δι' ἰδίου γράμματος καὶ ἐπ' αὐτῶν ἐφαρμοσθῶσιν οἱ ὅροι τοῦ προβλήματος. Ὁ δεύτερος οὗτος τρόπος εἶναι γενικώτερος τοῦ πρώτου· διότι παρέχει σύστημα ἐξισώσεων, ἐκ τοῦ ὁποίου διὰ τῆς ἀπαλοιφῆς τῶν ἄλλων ἀγνώστων προκύπτει καὶ ἡ ἐξίσωσις ἢ κατὰ τὸν ἄλλον τρόπον εὐρισκομένη· δύναται δὲ πάντοτε νὰ γίνῃ ἡ τοιαύτη ἀπαλοιφή· διότι ἐξ ὑποθέσεως τοιοῦτοι εἶναι οἱ ὅροι τοῦ προβλήματος, ὥστε δι' ἑνὸς ἐκ τῶν ἀγνώστων ἐκφράζονται οἱ λοιποί· τοὺς ὅρους δὲ τούτους τοῦ προβλήματος παριστῶσι καὶ σημαίνουσιν αἱ ἐξισώσεις. Εὐνόητον δὲ εἶναι, ὅτι κατὰ τὰς περιστάσεις δύναται νὰ εἶναι εὐκολωτέρα ἢ διὰ πολλῶν ἐξισώσεων λύσις· διότι αἱ ἐξισώσεις τοῦ συστήματος δύναται κατὰ ποικίλους τρόπους νὰ συνδυασθῶσιν, ὥστε νὰ προκύψῃ ἐξ αὐτῶν μία ἐξίσωσις μὲ ἕνα ἀγνώστον καθ' ἕνα δὲ τῶν τρόπων τούτων προκύπτει ἡ μία ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος.

Πρὸς ἄσκησιν προτεινομεν εἰς λύσιν τὰ ἐπόμενα προβλήματα.

1) Εὐρεῖν τριψήφιον ἀριθμὸν ἔχοντα τὰς ἐπομένους ιδιότητες. Τὸ ἄθροισμα τῶν τριῶν ψηφίων εἶναι 11· τὸ ψηφίον τῶν μονάδων εἶναι διπλάσιον τοῦ τῶν ἐκατοντάδων· ἐὰν δὲ τὰ ψηφία αὐτοῦ γραφῶσι κατὰ τὰξιν ἀντίστροφον, προκύπτει ἀριθμὸς μεγαλύτερος κατὰ 99. (Ἀπ. 182).

2) Δύο άγγεϊα περιέχουσιν α οκάδας ύδατος· λαμβάνομεν τὸ ἥμισυ τοῦ περιεχομένου ἐν τῷ πρώτῳ καὶ χύνομεν αὐτὸ εἰς τὸ δεύτερον· ἔπειτα τὸ τρίτον τοῦ περιεχομένου τότε ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ χύνομεν αὐτὸ εἰς τὸ πρῶτον· ἔπειτα τὸ τέταρτον τοῦ περιεχομένου τότε εἰς τὸ πρῶτον καὶ χύνομεν αὐτὸ εἰς τὸ δεύτερον· τέλος δὲ λαμβάνομεν τὸ πέμπτον τοῦ περιεχομένου τότε ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ χύνομεν αὐτὸ εἰς τὸ πρῶτον. Τότε δὲ τὸ πρῶτον άγγεϊον εὐρίσκεται περιέχον β οκάδας περισσότερον τοῦ δευτέρου. Πόσας οκάδας περιείχεν ἕκαστον τῶν άγγεϊῶν κατ' ἀρχάς;

$$\left( \text{Ἀπ. } \frac{\alpha + 5\beta}{2}, \frac{\alpha - 5\beta}{2} \right).$$

3) Ἐὰν αὐξήθῃ κατὰ 2 μέτρα ἡ βάσις ὀρθογωνίου, τὸ δὲ ὕψος αὐτοῦ ἐλαττωθῇ κατὰ 3 μέτρα, ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἐλαττοῦται κατὰ 41 τετραγωνικὰ μέτρα. Ἐὰν δὲ αὐξήθῃ ἡ βάσις αὐτοῦ κατὰ 3 μέτρα καὶ ἐλαττωθῇ τὸ ὕψος κατὰ 2, ἡ ἐπιφάνεια αὐξάνει κατὰ 24 τετραγωνικὰ μέτρα. Ζητοῦνται ἡ βάσις καὶ τὸ ὕψος τοῦ ὀρθογωνίου. (Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὀρθογωνίου ἔχει τόσα τετραγωνικὰ μέτρα, ὅσας μονάδας ἔχει τὸ γινόμενον τῶν δύο ἀριθμῶν, οἵτινες ἐκφράζουσι, πόσα μέτρα ἔχει ἡ βάσις καὶ πόσα τὸ ὕψος).

(Ἀπ. βάσις 33, ὕψος 32).

4) Εὐρεῖν δύο ἀριθμούς, ὧν ἡ διαφορά, τὸ ἄθροισμα καὶ τὸ γινόμενον νὰ εἶναι ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 2, 3 καὶ 5. (Ἀπ. 10 καὶ 2).

5) Ἄνθρωπος ἀναδεχθεὶς τὴν μετακομίσειν άγγεϊῶν τριῶν μεγεθῶν, συμφωνεῖ νὰ πληρώσῃ δι' ἕκαστον συντριβέν άγγεϊον τόσα, ὅσα θὰ ἐλάμβανε μετακομίσας αὐτὸ σῶον. Ἐλαβε δὲ ἓνα μετακομίση 3 μεγάλα άγγεϊα, 5 μεσαῖα καὶ 9 μικρά.

Εὐρέθη δὲ ὅτι, ἂν μὲν ἔθραυε τὰ μεγάλα ἢ τὰ μικρά, θὰ ἐλάμβανε 25 δραχμάς, ἂν δὲ τὰ μεσαῖα, 11 δραχμάς. Ζητεῖται, πόσον συνεφώνησε διὰ τὴν μετακομίσειν τῶν άγγεϊῶν ἑκάστου εἶδους.

(Ἀπ. δι' ἕκαστον μέγχ 6, δι' ἕκαστον μεσαῖον 5 καὶ δι' ἕκαστον μικρὸν 2).

6) Εὐρεῖν τετραψήφιον ἀριθμὸν ἔχοντα τὰς ἐξῆς ιδιότητας· τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων αὐτοῦ εἶναι 14 ἐὰν γραφῶσι τὰ ψηφία αὐτοῦ κατ' ἀντίστροφον τάξιν, αὐξάνει ὁ ἀριθμὸς κατὰ 369· τὸ ἄθροισμα τῶν ἄκρων ψηφίων ἰσοῦται τῷ ἄθροίσματι τῶν μέσων· ἐὰν δὲ τὰ μεσαῖα ψηφία ἀντιμεταθεθῶσιν, ἐλαττοῦται ὁ ἀριθμὸς κατὰ 630. (Ἀπ. 3704).

7) Ὀκτῶ βόες ἔφαγον εἰς 7 ἑβδομάδας τὸ χόρτον 4 στρεμμάτων καὶ ὅσον ἐβλάστησε κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο· 9 βόες ἔφαγον εἰς 8 ἑβδομά-

δας τὸ χόρτον 5 στρεμμάτων καὶ ὅσον ἐβλάστησε κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο. Ζητεῖται, πόσοι βόες δύνανται νὰ βοσκῆσωσιν ἐπὶ 12 ἑβδομάδας εἰς 6 στρέμματα συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ χόρτου, τὸ ὅποῖον θὰ βλαστήσῃ κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο; ('Απ. 8).

8) Ἀπὸ σταθμοῦ τινος σιδηροδρόμου ἀναχωρεῖ ἀτμάμαξα μὲ ταχύτητα  $\tau$ · ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σταθμοῦ καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ ἀναχωρεῖ μετὰ τινα χρόνον ἄλλη ἀτμάμαξα μὲ ταχύτητα  $\tau'$ · ὑπελογίσθη δὲ ὁ μεταξὺ τῶν δύο ἀναχωρήσεων χρόνος, ὥστε νὰ φθάσωσιν ἀμφοτέραι συγχρόνως εἰς τινα τόπον. Ἄλλ' ἡ πρώτη ἀτμάμαξα, ἀφοῦ διέτρεξε τὰ δύο τρίτα τῆς ὁδοῦ, ἠναγκάσθη νὰ ἐλαττώσῃ τὴν ταχύτητα αὐτῆς εἰς τὸ ἕμισυ τῆς προτέρας, καὶ οὕτω συμβαίνει συνάντησις τῶν ἀτμαμαξῶν  $\alpha$  χιλιομέτρα πρὸ τοῦ τόπου, εἰς ὃν ἔπρεπε νὰ συναντηθῶσι. Ζητεῖται ἡ ἀπὸ τοῦ σταθμοῦ τῆς ἀναχωρήσεως ἀπόστασις τοῦ τόπου.

'Απ. Ἄν διὰ τοῦ  $\chi$  παραστήσωμεν τὸ μῆκος τῆς ὁδοῦ καὶ διὰ τοῦ  $\psi$  τὸν μεταξὺ τῶν δύο ἀναχωρήσεων μεσολαβήσαντα χρόνον, εὐρίσκομεν

$$\chi = 3 \left( 2 - \frac{\tau}{\tau'} \right) \alpha, \quad \psi = 3 \frac{\tau' - \tau}{\tau \tau'} \left( 2 - \frac{\tau}{\tau'} \right) \alpha.$$

9) Ἴνα ἐκτελέσωσιν ἔργον τι, χρειάζονται οἱ μὲν Α καὶ Β ὁμοῦ  $\gamma$  ὥρας, οἱ δὲ Β καὶ Γ ὁμοῦ  $\alpha$  ὥρας, οἱ δὲ Γ καὶ Α ὁμοῦ  $\beta$  ὥρας· πόσας ὥρας χρειάζεται ἕκαστος τούτων διὰ τὸ αὐτὸ ἔργον καὶ πόσας ὅλοι ὁμοῦ;

'Απ. Παριστῶντες διὰ τοῦ  $\chi$  τὰς ὥρας τοῦ πρώτου, διὰ τοῦ  $\psi$  τοῦ δευτέρου καὶ διὰ τοῦ  $\omega$  τοῦ τρίτου, διὰ δὲ τοῦ  $\phi$  τὰς ὥρας, καθ' ἕνα ὅλοι ὁμοῦ θὰ ἐκτελέσωσι τὸ ἔργον, εὐρίσκομεν

$$\frac{1}{\chi} = \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} \right) \quad \frac{1}{\psi} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} \right).$$

$$\frac{1}{\omega} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\gamma} \right) \quad \text{καὶ} \quad \frac{1}{\phi} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} \right).$$

10) Γνωστῶν ὄντων τοῦ ἀθροίσματος  $\alpha$  καὶ τοῦ πηλίκου  $\pi$  δύο ἀριθμῶν, εὑρεῖν τοὺς ἀριθμούς. ('Απ.  $\frac{\alpha\pi}{\pi+1}, \frac{\alpha}{\pi+1}$ ).

11) Τρία βυτία ἴσα καὶ τὴν κατασκευὴν ἐντελῶς ὅμοια, εἶναι πλήρη, τὸ μὲν ἐν ὕδατος, τὸ δὲ ἄλλο ἐλαίου, τὸ δὲ τρίτον ἐλαίου καὶ ὕδατος ὁμοῦ· τὸ βάρος τοῦ πρώτου εἶναι  $\alpha$  ὀκάδες, τοῦ δευτέρου  $\beta$  καὶ τοῦ τρίτου  $\gamma$ . Νὰ εὑρεθῇ 1) τὸ βάρος ἐκάστου βυτίου κενοῦ, 2) πόσον ὕδωρ καὶ πόσον ἔλαιον περιέχει τὸ τρίτον.

'Απ. Ἐὰν  $\chi$  παριστᾷ τὸ βάρος ἐκάστου βυτίου κενοῦ,  $\phi$  τὸ βάρος τοῦ

Georges D. Papacostas.

élève 1910.

υδατος καὶ  $\omega$  τὸ τοῦ ἐλαίου καὶ  $\varepsilon$  τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ ἐλαίου, θὰ εἶναι

$$\chi = \frac{\beta - \alpha\varepsilon}{1 - \varepsilon}, \quad \varphi = \frac{\gamma - \beta}{1 - \varepsilon}, \quad \omega = \frac{(\alpha - \gamma)\varepsilon}{1 - \varepsilon}.$$

12) Λέβης συγκείμενος ἐκ χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἔχει βάρος 108 χιλιογράμμων, χάνει δὲ ἐντὸς τοῦ ὕδατος ζυγίζόμενος 13 χιλιογράμματα. Γνωστὸν δὲ εἶναι, ὅτι ὁ χαλκὸς χάνει ἐν τῷ ὕδατι ζυγίζόμενος τὸ  $\frac{1}{9}$  τοῦ βάρους του, ὁ δὲ σίδηρος τὸ  $\frac{1}{8}$ . Ζητεῖται ἐκ πότου χαλκοῦ καὶ ἐκ πό-

σου σιδήρου σύγκειται ὁ λέβης οὗτος; (Ἄπ. σιδήρ. 72 χιλιογρ., χαλκοῦ 36).

13) Ὁ Α μοὶ ὀφείλει διπλάσια ἢ ὁ Β, ἀλλὰ μὲ ἐπιτόκιον κατὰ 3 μονάδας μικρότερον, λαμβάνω δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τὸ αὐτὸ ποσὸν ὡς τόκον· νὰ εὑρεθῶσι τὰ ἐπιτόκια. (Ἄπ. 3 καὶ 6).

14) Ἐὰν διπλασιασθῇ ἡ βᾶσις ὀρθογωνίου τινός, ἐλαττωθῇ δὲ τὸ ὕψος κατὰ δύο μέτρα, τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ δὲν βλάπτεται· εὑρεῖν τὸ ὕψος τοῦ ὀρθογωνίου τούτου. (Ἄπ. 4).

15) Εὑρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις εἶτε διὰ 4 εἶτε δι' 8 διαيرهθῇ νὰ ἀφίηνη ὑπόλοιπον 1, τὸ δὲ ἐν πηλίκον νὰ εἶναι διπλάσιον τοῦ ἄλλου.

16) Δύο ταχυδρόμοι ἀνεχώρησαν συγχρόνως ἐκ δύο τόπων Α καὶ Β διευθυνομένοι πρὸς ἀλλήλους καὶ συνκντῶνται μετὰ 5 ὥρας· ἂν ἑκάτερος διέτρεχε καθ' ὥραν 100 μέτρα περισσότερον, θὰ συνηντῶντο μετὰ  $4\frac{1}{2}$  ὥρας μόνον. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀρχικὴ αὐτῶν ἀπόστασις.

### \* Περὶ ἀνισότητων.

160. Ὅταν παριστῶμεν διὰ τοῦ σημείου  $<$  τὴν ἀνισότητα δύο ἀριθμῶν, λαμβάνομεν παράστασιν, ἣτις καὶ αὕτη λέγεται ἀνισότης· ὡς  $7 > 3$ ,  $\frac{3}{5} < 2$  λέγονται ἀνισότητες.

Ἡ ἀνισότης τῶν θετικῶν ἀριθμῶν (ἐδ. 44) ἔχει τὴν ἀκόλουθον ἀρχικὴν ιδιότητα (ἣτις συναγεται ἀμέσως ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ αὐτῆς).

Ἐὰν προσεθῇ εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ἀνίσους ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς, ἡ ἀνισότης μένει.

161. Ἄν θέλωμεν νὰ συμπεριλάβωμεν εἰς τὰς ἀνισότητας καὶ τοὺς ἀρνητικούς ἀριθμούς, νὰ διατηρήσωμεν δὲ τὴν ἀρχικὴν ταύτην ιδιότητα, δεόν νὰ θεωρῶμεν πάντα ἀρνητικὸν ἀριθμὸν ὡς μικρότερον τοῦ 0, καὶ ἐκ δύο ἀρνητικῶν ἀριθμῶν νὰ θεωρῶμεν μεγαλύτερον τὸν ἄνευ σημείου μικρότερον.



Καὶ ὄντως· ἂν εἰς τὴν ἀνισότητά  $5 < 8$ ,  
προσθεθῆ εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς 8 ἢ  $-8$ , προκύπτει  
 $5-8 < 8-8$ , ἥτοι  $-3 < 0$ .

Καὶ ἂν εἰς τὴν αὐτὴν ἀνισότητά προσθεθῆ ὁ ἀριθμὸς  $-10$  εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη, προκύπτει ἡ ἀνισότης  $-5 < -2$ .

Καὶ γενικῶς πρέπει νὰ ὀρίσωμεν τὴν ἀνισότητά ὡς ἐξῆς:

Ἄριθμὸς  $\alpha$  λέγεται μεγαλύτερος ἄλλου  $\beta$ , ἐὰν ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς.

Καὶ ὄντως· ἔστω ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  θετικὸς ἀριθμὸς, καὶ ἴση τῷ  $\theta$ . ἂν τότε εἰς τὴν ἀνισότητά  $\theta > 0$  προσθεθῆ εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς  $\beta$ , προκύπτει ἡ ἀνισότης  $\beta + \theta > \beta$ , ἥτοι  $\alpha > \beta$ .

Ἐὰν ὅμως ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς, ἡ ἀντίθετος  $\beta - \alpha$  εἶναι θετικὸς καὶ ἐπομένως  $\theta \alpha$  εἶναι τότε  $\beta > \alpha$ . ἐξ ὧν βλέπομεν, ὅτι  $\alpha > \beta$  σημαίνει ὅτι ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς.

162. Ἐκ τῆς ἀρχικῆς ιδιότητος ἔπονται ἀμέσως αἱ ἐξῆς:

α'.) Ἐὰν προσθεθῶσιν ἄνισοι εἰς ἀνίσους, ἀλλ' ὁ μεγαλύτερος εἰς τὸν μεγαλύτερον καὶ ὁ μικρότερος εἰς τὸν μικρότερον, ἡ ἀνισότης μένει.

Ἐστω  $\alpha > \beta$  καὶ  $\gamma > \delta$   
λέγω, ὅτι τότε  $\theta \alpha$  εἶναι καὶ  $\alpha + \gamma > \beta + \delta$ .

Διότι, ἂν εἶναι  $\alpha - \beta = \theta$  καὶ  $\gamma - \delta = \theta'$ ,  
 $\theta \alpha$  εἶναι καὶ  $\alpha + \gamma - (\beta + \delta) = \theta + \theta'$ ,  
ἐπειδὴ δὲ αἱ διαφοραὶ  $\theta$  καὶ  $\theta'$  εἶναι θετικοὶ ἀριθμοί, καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν  $\theta + \theta'$  εἶναι θετικόν· ὥστε εἶναι  $\alpha + \gamma > \beta + \delta$ .

β'.) Ἐὰν πολλαπλασιασθῶσιν ἀμφότερα τὰ μέλη ἀνισότητος ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν διάφορον τοῦ 0, μένει μὲν ἡ ἀνισότης, ἂν ὁ πολλαπλασιαστὴς εἶναι θετικὸς, ἀντιστρέφει ὅμως, ἂν εἶναι ἀρνητικὸς.

Ἐστω  $\alpha > \beta$ . ἂν εἶναι  $\alpha - \beta = \theta$ ,  $\theta \alpha$  εἶναι καὶ  $\alpha\mu - \beta\mu = \theta\mu$   
καὶ ἂν μὲν ὁ  $\mu$  εἶναι θετικὸς,  $\mu\theta$  εἶναι ὡσαύτως θετικόν· ὥστε ἔχομεν  
 $\alpha\mu > \beta\mu$ .

ἂν δὲ πάλιν εἶναι  $\mu$  ἀρνητικόν, καὶ ὁ  $\mu\theta$  εἶναι ἀρνητικὸς· ὥστε ἔχομεν  
 $\alpha\mu < \beta\mu$ .

**ΠΟΡΙΣΜΑ.** Ἐὰν ἀμφότερα τὰ μέλη ἀνισότητος τραπῶσιν εἰς τὰ ἀντίθετα (ἥτοι ἂν πολλαπλασιασθῶσιν ἀμφότερα ἐπὶ  $-1$ ), ἡ ἀνισότης ἀντιστρέφει.

Οὕτως ἐκ τῆς ἀνισότητος  $-5 > -9$ , ἔπεται  $5 < 9$ .

163. Καὶ αἱ ἀνισότητες, ὧν τὰ μέλη ἔχουσι γράμματα, δύνανται ἢ νὰ

ἀληθεύσει διὰ πάσας τὰς τιμὰς τῶν γραμμάτων, ἢ μόνον διὰ τινὰς (ἢ καὶ δι' οὐδεμίαν), τότε τὰ γράμματα ταῦτα λέγονται ἄγνωστοι τῆς ἀνισότητος.

Αἱ γενικαὶ ιδιότητες (101) καὶ (102) τῶν ἐξισώσεων ἀληθεύουσι καὶ εἰς τὰς ἀνισότητας, ὧν τὰ μέλη ἔχουσι γράμματα ἄγνωστα, καὶ ἀποδεικνύονται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον· μόνον ὁ πολλαπλασιαστὴς ἀμφοτέρων τῶν μελῶν πρέπει νὰ εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς.

$$\text{Ἔστω ἡ ἀνισότης} \quad \frac{\chi}{3} + \frac{2\chi}{5} + \frac{\chi-1}{2} > \chi + \frac{2}{3}.$$

πολλαπλασιάζοντες ἀμφοτέρω τὰ μέλη ἐπὶ 2.3.5, λαμβάνομεν

$$10\chi + 12\chi + 15\chi - 15 > 30\chi + 20$$

καὶ χωρίζοντες τοὺς γνωστοὺς ὅρους ἀπὸ τῶν ἀγνώστων,

$$10\chi + 12\chi + 15\chi - 30\chi > 20 + 15$$

$$\text{ἢ} \quad 7\chi > 35$$

καὶ διαιροῦντες ἀμφοτέρω τὰ μέλη διὰ τοῦ 7 (ἢ πολλαπλασιάζοντες ἐπὶ  $\frac{1}{7}$ ) εὐρίσκομεν  $\chi > 5$ .

ἦτοι ἡ δοθεῖσα ἀνισότης ἀληθεύει, μόνον ὅταν ὁ ἀριθμὸς  $\chi$  εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 5.

Ὅταν ἀνισότης ἀχθῇ εἰς τοιαύτην μορφήν, ὥστε τὸ ἐν μέλος αὐτῆς νὰ ἀποτελεῖται ὑπὸ μόνου τοῦ ἀγνώστου γράμματος, τὸ δὲ ἄλλο ὑπὸ τῶν γνωστῶν, τότε λέγομεν ὅτι ἐλύθη ἡ ἀνισότης.

Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι ἡ λύσις τῶν ἀνισοτήτων γίνεται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, καθ' ὃν γίνεται καὶ ἡ λύσις τῶν ἐξισώσεων.

**Πρόβλημα.** Δύο ταχυδρόμοι ἀναχωροῦσι συγχρόνως, ὁ μὲν ἐκ τῆς πόλεως Α πρὸς τὴν πόλιν Β, ὁ δὲ ἐκ τῆς Β πρὸς τὴν Α· ἡ ταχύτης τοῦ πρώτου ποικίλλει μεταξύ 5 καὶ 8 σταδίων καθ' ὥραν, ἡ δὲ ταχύτης τοῦ δευτέρου μεταξύ 6 καὶ 7· ἡ δὲ ἀπόστασις τῶν δύο πόλεων εἶναι 44 στάδια. Μεταξὺ ποίων ὥρῶν θὰ γίνῃ ἡ συνάντησις αὐτῶν; καὶ εἰς ποῖον μέρος τῆς ὁδοῦ;

(Απ. Ἡ συνάντησις θὰ συμβῇ μεταξύ τῆς 2<sup>ωρ.</sup> 56' καὶ τῆς 4<sup>ωρ.</sup> ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως· θὰ συμβῇ δὲ μεταξύ τοῦ 18σταδ.  $\frac{1}{3}$  καὶ τοῦ

25σταδ.  $\frac{1}{7}$  ἀπὸ τῆς πόλεως Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.

164. Ἐξίσωσις περιέχουσα ἀγνώστους περισσοτέρους τοῦ ἑνὸς ἐπιδέχεται λύσεις ἀπείρους τὸ πλῆθος· διότι δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν αὐτοβούλως πάντας τοὺς ἀγνώστους πλὴν ἑνός, ὅστις προσδιορίζεται καὶ οὗτος ἐκ τῆς ἐξίσωσεως.

165. Καὶ σύστημα ἐξίσωσεων περισσοτέρους ἔχον ἀγνώστους ἢ ἐξισώσεις, ἐπιδέχεται ἐν γένει ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις· διότι ὀρίζοντες τοὺς περισσεύοντας ἀγνώστους αὐτοβούλως, δυνάμεθα ἐν γένει νὰ προσδιορίσωμεν τοὺς λοιποὺς ἐκ τοῦ συστήματος.

Ἄλλ' ἂν ἐκ τῶν ἀπειροπληθῶν λύσεων τοιαύτης ἐξίσωσεως ἢ συστήματος ζητῆται νὰ εὑρεθῶσιν αἱ ἀκέραιαι (ἐν αἷς αἱ τιμαὶ πάντων τῶν ἀγνώστων εἶναι ἀκέραιοι ἀριθμοί), τὸ ζήτημα ἀποβαίνει δυσκολώτερον· διότι οἱ περισσεύοντες ἀγνώστοι πρέπει νὰ ὀρίζωνται τότε οὐχὶ αὐτοβούλως, ἀλλ' ἀρμοδίως, ἵνα αἱ τιμαὶ τῶν ἄλλων προκύπτωσιν, εἰ δυνατὸν, ἀκέραιαι.

166. Ἀπροσδιόριστος ἀνάλυσις καλεῖται τὸ μέρος τῆς ἀλγέβρας, ἐν τῷ ὁποίῳ διδάσκεται ἡ εὔρεσις τῶν ἀκεραίων λύσεων δεδομένης ἐξίσωσεως περισσοτέρους τοῦ ἑνός ἐχούσης ἀγνώστους, ἢ καὶ συστήματος ἐξίσωσεων περισσοτέρους ἔχοντος ἀγνώστους ἢ ἐξισώσεις.

Οἱ συντελεσταὶ τῶν τοιούτων ἐξίσωσεων ὑποτίθενται ἀκέραιοι ἀριθμοί· (διότι, ἂν εἶναι κλασματικοί, καθιστῶμεν αὐτοὺς ἀκεραίους ἀπκλάσσοντες τὴν ἐξίσωσιν ἀπὸ τῶν πρρονομαστῶν).

Ἐνταῦθα θὰ θεωρήσωμεν μόνον μίαν ἐξίσωσιν περιέχουσαν δύο ἀγνώστους καὶ ἡγμένην εἰς τὴν μορφήν

$$\alpha\chi + \beta\psi = \gamma,$$

ἐνθα  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  εἶναι γνωστοὶ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ (θετικοὶ ἢ ἀρνητικοί).

Οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  τῆς ἐξίσωσεως ταύτης δύνανται νὰ ὑποθεθῶσιν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· διότι, ἂν ἔχωσι κοινόν τινα διαιρέτην, ἐξαλείφομεν αὐτὸν διαιροῦντες δι' αὐτοῦ ἀμφοτέρω τὰ μέλη τῆς ἐξίσωσεως.

167. ΘΕΩΡΗΜΑ Α'. Ἐὰν οἱ συντελεσταὶ  $\alpha$ ,  $\beta$  τῶν ἀγνώστων ἔχωσι κοινόν τινα διαιρέτην, ἢ ἐξίσωσις  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$  οὐδεμίαν ἐπιδέχεται ἀκεραίαν λύσιν.

Διότι, ἂν οἱ ἀκέραιοι  $\alpha$ ,  $\beta$  εἶναι διαιρετοὶ διὰ τοῦ ἀκεραίου  $\delta$ , οἷους· δῆποτε ἀκεραίους ἀριθμοὺς καὶ ἂν θέσωμεν ἀντὶ τῶν  $\chi$  καὶ  $\psi$ , τὸ πρῶτον

μέλος τῆς ἐξίσωσως θὰ εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ δ, καὶ ἐπομένως δὲν θὰ εἶναι ἴσον τῷ γ, ὅστις ἐξ ὑποθέσεως δὲν εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ δ.

168. ΘΕΩΡΗΜΑ Β'. Ἐὰν οἱ συντελεσταὶ α καὶ β εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἡ ἐξίσωσις  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$  ἔχει ἀκεραίαν τινὰ λύσιν.

\* Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν, ὅτι εἷς τῶν συντελεστῶν, ὡς ὁ α, δύναται πάντοτε νὰ ὑποτεθῆ θετικὸς· διότι, ἂν δὲν εἶναι, γίνεται, τρεπομένων τῶν σημείων πάντων τῶν ὄρων τῆς ἐξίσωσως.

Ἐὰν νῦν λύσωμεν τὴν ἐξίσωσιν πρὸς τὸν ἄγνωστον χ, οὔτινος ὁ συντελεστὴς ὑποτίθεται θετικὸς ἀριθμὸς, εὐρίσκομεν

$$\chi = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha}.$$

λέγω δέ, ὅτι ἐκ τῶν ἐπομένων τιμῶν τοῦ ψ

$$\psi = 0, 1, 2, 3, \dots (\alpha - 1), \quad (\mu)$$

ὧν τὸ πλῆθος εἶναι α, εὐρίσκεται μία καὶ μία μόνη, πρὸς ἣν ἀντιστοιχεῖ τιμὴ τοῦ χ ἀκεραία.

Ἄς τεθῶσιν αἱ τιμαὶ τοῦ ψ κατὰ σειρὰν εἰς τὴν παράστασιν  $\gamma - \beta\psi$  καὶ ἄς διαιρεθῶσιν οἱ προκύπτοντες ἀριθμοὶ πάντες διὰ τοῦ α, ἀλλ' οὕτως, ὥστε πάντα τὰ ὑπόλοιπα νὰ εἶναι θετικὰ (γίνεται δὲ τὸ ἀρνητικὸν ὑπόλοιπον θετικόν, ἐὰν εἰς τὸ πηλίκον προστεθῆ μία ἀρνητικὴ μονάς· ἂν π. χ. ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν  $-9$  διὰ  $5$ , θὰ εἶναι πηλίκον  $-1$  καὶ ὑπόλοιπον  $-4$ · λαμβάνοντες ὅμως ὡς πηλίκον τὸ  $-2$ , θὰ ἔχωμεν ὑπόλοιπον  $1$ · διότι  $-9 = 5 \cdot (-2) + 1$ · λέγω, ὅτι τῶν διαιρέσεων τούτων τὰ ὑπόλοιπα θὰ εἶναι πάντα διάφορα ἀπ' ἀλλήλων· διότι, ἄς ὑποτεθῆ, ὅτι δύο διαιρέσεις δίδουσιν ἴσα ὑπόλοιπα, ἔστωσαν δὲ αἱ πρὸς τὰς τιμὰς  $\psi'$  καὶ  $\psi''$  τοῦ ψ ἀντιστοιχοῦσαι· τότε παριστωμένου τοῦ κοινοῦ αὐτῶν ὑπολοίπου διὰ  $\alpha$  καὶ τῶν πηλίκων διὰ  $\pi'$  καὶ  $\pi''$ . θὰ εἶναι

$$\gamma - \beta\psi' = \alpha\pi' + \alpha$$

$$\gamma - \beta\psi'' = \alpha\pi'' + \alpha,$$

ἐκ δὲ τούτων, ἀφαιρουμένων κατὰ μέλη, προκύπτει

$$\beta(\psi'' - \psi') = \alpha(\pi' - \pi'').$$

ἡ δὲ ἰσότης αὕτη δεικνύει, ὅτι ὁ ἀριθμὸς α, πρῶτος ὧν πρὸς τὸν β, διαιρεῖ τὸ γινόμενον  $\beta(\psi'' - \psi')$ · ἐπομένως ὁ α διαιρεῖ τὴν διαφορὰν  $\psi'' - \psi'$ · ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἀδύνατον· διότι ἀμφότεροι οἱ ἀριθμοὶ  $\psi'$ ,  $\psi''$  εἶναι μικρότεροι τοῦ α· ἄτοπος ἄρα ἦτο ἡ ὑπόθεσις, ὅτι δύο διαιρέσεις ἔδιδον ἴσα ὑπόλοιπα.

Ἐπειλὴ δὲ διαιρέτης εἶναι ὁ α, ἔπεται, ὅτι ὑπόλοιπα τῶν εἰρημένων

διακρίσεων δύνανται να είναι μόνον οι μικρότεροι αὐτοῦ ἀριθμοὶ

$$0, 1, 2, 3, \dots, \alpha - 1.$$

καὶ ἐπειδὴ οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι εἶναι ἀκριβῶς τόσοι, ὅσαι εἶναι καὶ αἱ διακρίσεις, καὶ ἐκάστη ἔχει ἴδιον ὑπόλοιπον, συμπεριζόμενον, ὅτι μίᾳ τῶν διακρίσεων τούτων δίδει ὑπόλοιπον 0. ἤτοι πρὸς μίαν τῶν τιμῶν ( $\mu$ ) τοῦ  $\psi$  ἀντιστοιχεῖ ἀκεραία καὶ ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$ . ὥστε ὑπάρχει τις ἀκεραία λύσις.

169. ΘΕΩΡΗΜΑ Γ'. Ὅταν ἡ ἐξίσωσις  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$  ἔχη μίαν ἀκεραίαν λύσιν, ἔχει καὶ ἄλλας ἀπείρους τὸ πλήθος.

Ἐστω  $\chi = \eta$ ,  $\psi = \theta$  μίᾳ ἀκεραίᾳ λύσει τῆς ἐξίσωσεως

$$\alpha\chi + \beta\psi = \gamma,$$

$$\alpha\eta + \beta\theta = \gamma.$$

ἤτοι ἔστω

Ἐὰν ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς ἐξίσωσεως ἀφαιρηθῶσιν ἴσοι ἀριθμοί, ὁ  $\alpha\eta + \beta\theta$  καὶ ὁ  $\gamma$ , θὰ προκύψῃ ἐξίσωσις ἰσοδύναμος,

$$\eta \quad \alpha(\chi - \eta) + \beta(\psi - \theta) = 0,$$

$$\eta \quad \alpha(\chi - \eta) = \beta(\theta - \psi). \quad (\epsilon)$$

Ἰνα εὕρωμεν πάσας τὰς ἀκεραίας λύσεις τῆς ἐξίσωσεως ταύτης, παρατηροῦμεν, ὅτι ὁ  $\alpha$  διακρίει τὸ πρῶτον μέλος τῆς ἐξίσωσεως, πρέπει ἄρα νὰ διακριθῇ καὶ τὸ δεύτερον (ἂν ἡ ἐξίσωσις ἀληθεύῃ δι' ἀκεραίας τιμὰς τῶν  $\chi$  καὶ  $\psi$ ). ἐπειδὴ δὲ εἶνε πρῶτος πρὸς τὸν  $\beta$ , ἀνάγκη νὰ διακριθῇ τὴν διαφορὰν  $\theta - \psi$ , ἥτις θὰ εἶναι διὰ τοῦτο πολλαπλάσιόν τι τοῦ  $\alpha$ . ὥστε πρέπει νὰ εἶναι

$$\theta - \psi = \alpha\omega, \quad (1)$$

τοῦ  $\omega$  ὄντος ἀκεραίου ἀριθμοῦ.

Ἐπίσης ὁ  $\beta$  ἀνάγκη νὰ διακριθῇ τὴν διαφορὰν  $\chi - \eta$ , ἤτοι ἡ διαφορὰ αὕτη πρέπει νὰ εἶναι πολλαπλάσιόν τι τοῦ  $\beta$ . ἤτοι πρέπει νὰ εἶναι

$$\chi - \eta = \beta\omega' \quad (2)$$

τοῦ  $\omega'$  ὄντος ἀκεραίου ἀριθμοῦ.

Ἐὰν δὲ αἱ τιμαὶ αὗται τῶν διαφορῶν (1) καὶ (2) τεθῶσιν εἰς τὴν ἐξίσωσιν ( $\epsilon$ ), προκύπτει  $\omega' = \omega$ , ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι, ἵνα ἡ ἐξίσωσις ( $\epsilon$ ) ἐπαληθεύσῃ, πρέπει καὶ ἀρκεῖ οἱ δύο ἀκεραῖοι  $\omega$  καὶ  $\omega'$  νὰ εἶναι ἴσοι.

ὥστε τοῦ  $\omega$  ὄντος οἰουδήποτε ἀκεραίου, αἱ ὑπὸ τῶν ἰσοτήτων (1) καὶ (2) παρεχόμεναι τιμαὶ

$$\chi = \eta + \beta\omega \quad (3)$$

$$\psi = \theta - \alpha\omega$$

ἐπαληθεύουσι τὴν ἐξίσωσιν ( $\epsilon$ ). ἐπίσης δὲ καὶ τὴν δοθεῖσιν ἐξίσωσιν  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$ , ὡς ἰσοδύναμον τῆς ( $\epsilon$ ). ὑπάρχουσιν ἄρα ἀπείροι ἀκεραῖαι λύσεις, ἅς δίδουσιν οἱ τύποι (3). ἀλλὰ πλὴν τούτων οὐδεμία ἄλλη ὑπάρχει.

ΣΗΜ. Ὅτι αἱ τιμαὶ (3) ἐπαληθεύουσι τὴν δοθεῖσαν ἐξίσωσιν, οἷοςδήποτε ἀκέραιος καὶ ἂν ὑποθεθῇ ὁ  $\omega$ , ἐπιβεβαιοῦται καὶ διὰ τῆς ἀμέσου ἀντικαταστάσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἐξίσωσιν· διότι θέτοντες τὰς τιμὰς (3) τῶν  $\chi$  καὶ  $\psi$  εἰς τὴν ἐξίσωσιν  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$ , εὐρίσκομεν  $\alpha\eta + \alpha\beta\omega + \beta\theta - \beta\alpha\omega = \gamma$  ἤτοι  $\alpha\eta + \beta\theta = \gamma$  ὅπερ εἶναι ταυτότης· διότι ἐξ ὑποθέσεως αἱ τιμαὶ  $\chi = \eta$ ,  $\psi = \theta$  λύουσι τὴν ἐξίσωσιν.

170. Ἐκ τῶν προηγουμένων βλέπομεν, ὅτι ἐκ μιᾶς λύσεως τῆς ἐξίσωσεως  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$  εὐρίσκομεν τύπον περιέχοντα πάσας τὰς λύσεις· πρὸς τοῦτο αὐξάνομεν τὴν τιμὴν τοῦ  $\chi$  κατὰ τὸν συντελεστὴν τοῦ  $\psi$  πολλαπλασιασθέντα ἐπὶ ἀόριστόν τινα ἀκέραιον  $\omega$ , τὴν δὲ τιμὴν τοῦ  $\psi$  κατὰ τὸν συντελεστὴν τοῦ  $\chi$  πολλαπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἀντίθετον τοῦ αὐτοῦ ἀκεραίου  $\omega$ .

Ἐπειδὴ δὲ ἀντὶ  $\omega$  δύναται νὰ γραφῆ καὶ  $-\omega$ , (διότι ὁ  $\omega$  εἶναι τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμός), ἔπεται, ὅτι εἶναι ἀδιάφορον, τίς ἐκ τῶν συντελεστῶν θὰ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ  $\omega$  καὶ τίς ἐπὶ τὸν ἀντίθετον τοῦ  $\omega$ .

### Μέθοδοι πρὸς εὑρεσιν τῶν ἀκεραίων λύσεων τῆς ἐξίσωσεως $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$ .

171. Ἡ ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεως ἀκεραίας λύσεως παρέχει καὶ τὸν τρόπον τῆς εὑρέσεως αὐτῆς· καὶ ὄντως εἶδομεν, ὅτι, ἐὰν ἀντὶ τοῦ  $\psi$  τεθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ 0, 1, 2, 3, ...,  $\alpha-1$ , εἰς ἓνα τούτων θὰ ἀντιστοιχῇ τιμὴ τοῦ  $\chi$  ἀκεραία· μιᾶς δὲ λύσεως ἀκεραίας εὐρεθείσης, εὐρίσκονται ἀμέσως καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαί.

Ἐστω ὡς παράδειγμα ἡ ἐξίσωσις

$$5\chi - 8\psi = 7.$$

λύοντες πρὸς τὸν  $\chi$ , εὐρίσκομεν

$$\chi = \frac{7 + 8\psi}{5}.$$

εἰξεύρομεν δὲ, ὅτι ἐκ τῶν πέντε τιμῶν τοῦ  $\psi$

$$0, 1, 2, 3, 4$$

μία καὶ μία μόνη καθιστᾷ τὴν τιμὴν τοῦ  $\chi$  ἀκεραίαν· δοκιμάζοντες λοιπὸν εὐρίσκομεν τὴν λύσιν

$$\psi = 1, \quad \chi = 3.$$

Ἰθὲν πᾶσαι αἱ ἀκεραὶαι λύσεις τῆς δοθείσης ἐξίσωσεως περιέχονται ἐν τοῖς τύποις

$$\chi = 3 + 8\omega$$

$$\psi = 1 + 5\omega.$$

Αἱ θετικαὶ τιμαὶ τοῦ  $\omega$  (καὶ ἡ τιμὴ 0) δίδουσι τιμὰς θετικὰς ἀμφοτέρων τῶν ἀγνώστων, αἱ δὲ ἀρνητικαὶ ἀρνητικὰς.

Ἐστω δεύτερον ἡ ἐξίσωσις  $91\chi - 30\psi = 19$

λύοντες πρὸς τὸν  $\psi$  (διότι οὗτος ἔχει τὸν μικρότερον συντελεστὴν καὶ διὰ τοῦτο θὰ γίνωσιν ὀλιγώτεροι δοκιμαίαι), εὐρίσκομεν

$$\psi = \frac{91\chi - 19}{30}$$

παρατηρητέον νῦν, ὅτι, ἵνα διαιρηθῆται ὁ ἀριθμητὴς διὰ τοῦ 30, ἀνάγκη νὰ λήγῃ εἰς 0· ἤτοι ἀνάγκη νὰ λήγῃ ὁ ἀριθμὸς 91χ εἰς 9· ὁ χ ἄρα πρέπει νὰ ἔχῃ μίαν τῶν ἐπομένων τιμῶν 9, 19, 29 καὶ ταύτας μόνον δοκιμάζομεν· οὕτως εὕρισκομεν τὴν λύσιν

$$\chi=19 \quad \psi=3.19=57,$$

ἐξ ἧς ἐν γένει  $\chi=19+30\omega$   
 $\psi=57+91\omega.$

$$\text{Ἐστω τέλος ἡ ἐξίσωσις} \quad 7\chi+13\psi=75.$$

λύοντες πρὸς τὸν χ εὕρισκομεν

$$\chi=\frac{75-13\psi}{7}$$

καὶ δοκιμάζοντες τὰς τιμὰς  $\psi=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ , εὕρισκομεν τὴν λύσιν  $\psi=2, \chi=7.$

ἐξ ἧς καὶ τὴν γενικὴν λύσιν

$$\chi=7-13\omega$$

$$\psi=2+7\omega.$$

πλὴν τῆς εὐρεθείσης λύσεως, (ἥτις ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν τιμὴν  $\omega=0$ ), πᾶσαι αἱ λοιπαὶ ἔχουσι ἓνα ἀρνητικὸν καὶ ἓνα θετικὸν ἀριθμὸν.

\* 172. Ὄταν οἱ συντελεσταὶ α καὶ β εἶναι μεγάλοι ἀριθμοί, ἡ μέθοδος αὕτη ἀποβαίνει ἐπίπονος· τότε μεταχειριζόμεθα τὴν ἐπομένην μέθοδον, διὰ τῆς ὁποίας καὶ ἡ ὑπαρξὶς ἀκεραίας τινὸς λύσεως γίνεται καταφανής.

$$\text{Ἐστω ἡ ἐξίσωσις} \quad \alpha\chi + \beta\psi = \gamma,$$

τῆς ὁποίας οἱ συντελεσταὶ α, β ὑποτίθενται πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

Ἐὰν ὁ β εἶναι μεγαλύτερος, ἄς διαιρηθῆ διὰ τοῦ α' ἔστω δὲ π τὸ πηλίκον καὶ β' τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως· τότε θὰ εἶναι

$$\beta = \alpha\pi + \beta'.$$

ὅθεν ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις δύναται νὰ γραφῆ καὶ ὡς ἐξῆς:

$$\alpha\chi + (\alpha\pi + \beta')\psi = \gamma$$

$$\text{ἢ} \quad \alpha(\chi + \pi\psi) + \beta'\psi = \gamma.$$

καὶ ἂν τεθῆ  $\chi + \pi\psi = \chi'$ , ἡ δευτέρα ἐξίσωσις γίνεται

$$\alpha\chi' + \beta'\psi = \gamma,$$

ἐνθα χ' εἶναι νέος τις ἄγνωστος συνδεόμενος πρὸς τοὺς χ, ψ διὰ τῆς ἰσότητος  $\chi' = \chi + \pi\psi$ , ἢ  $\chi = \chi' - \pi\psi.$

Ἐὰν τῆς ἐξισώσεως ταύτης εὐρεθῆ ἀκεραία τις λύσις, εὕρισκεται ἀμέσως ἄλλη τῆς δοθείσης· διότι εὐρεθέντων τῶν χ' καὶ ψ, εὕρισκεται καὶ ὁ χ ἐκ τῆς ἰσότητος  $\chi = \chi' - \pi\psi.$

Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι ἡ εὕρεσις τῶν ἀκεραίων λύσεων τῆς δοθείσης ἐξίσωσως ἀνάγεται εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν ἀκεραίων λύσεων ἄλλης, ἡ ὁποία ἔχει συντελεστάς, τὸν μικρότερον τῶν συντελεστῶν τῆς δοθείσης καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ μεγαλητέρου συντελεστοῦ διὰ τοῦ μικροτέρου· ἀλλ' ὁμοίως ἀνάγεται καὶ αὐτῆς ἡ λύσις εἰς ἄλλην· καὶ οὕτω καθεξῆς. Ἐπειδὴ δὲ αἱ γινόμεναι διαιρέσεις εἶναι αἱ διαιρέσεις, δι' ὧν εὐρίσκεται ὁ μέγιστος κοινὸς διαιρέτης τῶν συντελεστῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , οὗτοι δὲ ὑπετέθησαν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἔπεται, ὅτι θὰ εὐρεθῆ ἐπὶ τέλους ὑπόλοιπόν τι ἴσον τῷ μεγίστῳ κοινῷ διαιρέτῃ 1, καὶ θὰ φθάσωμεν οὕτως εἰς ἐξίσωσιν, ἐν ἣ ὁ ἕτερος τῶν ἀγνώστων θὰ ἔχῃ συντελεστὴν τὴν μονάδα 1, ἤτοι ἐξίσωσιν τῆς μορφῆς

$$\chi_1 + \rho\psi_1 = \gamma,$$

$\chi_1$  καὶ  $\psi_1$  ὄντων τῶν ἀγνώστων.

Ἀλλὰ τῆς τοιούτης ἐξίσωσως εὐρίσκεται ἀμέσως ἀκεραία τις λύσις· διότι, ἂν τεθῆ  $\psi_1 = 0$ , ἔπεται  $\chi_1 = \gamma$  (καὶ γενικῶς, ἂν τεθῆ  $\psi_1 = A$ , ἔπεται  $\chi_1 = \gamma - \rho A$ , τοῦ  $A$  ὄντος ἀκεραίου)· ἐπομένως εὐρίσκεται ἐξ αὐτῆς ἀκεραία τις λύσις καὶ ἐκάστης τῶν προηγουμένων, ἄρα καὶ τῆς δοθείσης.

Ὡς παράδειγμα ἔστω ἡ ἐξίσωσις

$$31\chi + 68\psi = 121.$$

ἐπειδὴ εἶναι  $68 = 2 \cdot 31 + 6$ , ἡ ἐξίσωσις γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς

$$31(\chi + 2\psi) + 6\psi = 121,$$

καὶ ἂν θέσωμεν

$$\chi + 2\psi = \chi',$$

ἔπεται

$$31\chi' + 6\psi = 121.$$

ἐπειδὴ δὲ πάλιν εἶναι  $31 = 5 \cdot 6 + 1$ , ἡ ἐξίσωσις αὕτη γίνεται

$$6(\psi + 5\chi') + \chi' = 121.$$

καὶ ἂν τεθῆ  $\psi + 5\chi' = \psi'$ , ἔπεται

$$6\psi' + \chi' = 121.$$

ὅθεν εὐρίσκεται ἡ λύσις

$$\psi' = 20. \quad \chi' = 1,$$

ἐξ ἧς, δυνάμει τῶν τεθεισῶν ἰσοτήτων, εὐρίσκομεν

$$\psi = 15 \text{ καὶ } \chi = -29.$$

ὅθεν ἔπεται καὶ ἡ γενικὴ λύσις

$$\chi = -29 + 68\omega$$

$$\psi = 15 - 31\omega$$



\* Ἀκέραιαι καὶ θετικαὶ λύσεις τῆς ἐξίσωσως  
 $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$ .

173. Δυνατὸν νὰ ζητηθῶσιν ἐκ τῶν ἀκεραίων λύσεων τῆς ἐξίσωσως  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$  ἐκεῖναι, ἐν αἷς αἱ τιμαὶ ἀμφοτέρων τῶν ἀγνώστων εἶναι θετικοὶ ἀριθμοὶ. Πρὸς εὗρεσιν τούτων διχρήνομεν δύο περιπτώσεις, καθ' ὅσον οἱ συντελεσταὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι ὁμοειδεῖς ἢ ἑτεροειδεῖς.

Ἐστώσαν πρότερον ὁμοειδεῖς· ἐπειδὴ ὁ  $\alpha$  ὑπετέθη θετικός, καὶ ὁ  $\beta$  εἶναι θετικός· ἐὰν νῦν ὁ  $\gamma$  εἶναι ἀρνητικός, οὐδεμία προφανῶς ὑπάρχει θετικὴ λύσις· ἀνάγκη ἄρα νὰ εἶναι καὶ ὁ  $\gamma$  θετικός.

Τούτων τεθέντων, ἔστω  $\chi = \eta$ ,  $\psi = \theta$  ἢ διὰ τοῦ πρώτου τρόπου εὐρισκομένη ἀκεραία λύσις, ἐν ἧ ἑπομένως εἶναι ὁ  $\theta$  θετικὸς ἀριθμὸς καὶ μικρότερος τοῦ  $\alpha$ · τότε πᾶσαι αἱ ἀκέραιαι λύσεις περιέχονται ἐν τοῖς τύποις

$$\begin{aligned}\chi &= \eta - \beta\omega \\ \psi &= \theta + \alpha\omega.\end{aligned}$$

Αἱ ἀρνητικαὶ τιμαὶ τοῦ  $\omega$  καθιστῶσι τὸν  $\psi$  ἀρνητικόν· διότι, ἂν τεθῆ  $\omega = -1, -2, -3, -4, \dots$ , προκύπτει

$$\psi = \theta - \alpha, \theta - 2\alpha, \theta - 3\alpha, \dots$$

ἀτινα πάντα εἶναι ἀρνητικά, διότι ὁ  $\theta$  εἶναι μικρότερος τοῦ  $\alpha$ .

Αἱ δὲ θετικαὶ πᾶσαι (καὶ ἡ 0) καθιστῶσιν αὐτὸν θετικόν· διότι αἱ τιμαὶ

$$\omega = 0, 1, 2, 3, \dots$$

δίδουσι

$$\psi = \theta, \theta + \alpha, \theta + 2\alpha, \dots$$

ἀλλ' ἵνα καὶ ὁ  $\chi$  ἀποβῆ θετικὸς διὰ τὰς τιμὰς  $\omega = 0, 1, 2, 3, \dots$ , δεόν νὰ εἶναι ὁ  $\eta$  θετικὸς καὶ μεγαλύτερος τοῦ ἀφαιρουμένου ὄρου  $\beta\omega$ · ὥστε (τοῦ  $\eta$  ὄντος θετικοῦ) πρέπει νὰ εἶναι  $\eta > \beta\omega$ , ἥτοι

$$\frac{\eta}{\beta} > \omega.$$

Ὅθεν ὁ  $\omega$  δύναται νὰ λάβῃ τὰς τιμὰς 0, 1, 2, .. μέχρι τοῦ μεγίστου θετικοῦ ἀκεραίου τοῦ ἐν τῷ κλάσματι  $\frac{\eta}{\beta}$  περιεχομένου, καὶ ἂν ὁ μέγιστος οὗτος ἀκεραῖος παρσταθῆ διὰ τοῦ  $\mu$ , αἱ τιμαὶ, ἃς δύναται νὰ λάβῃ ὁ  $\omega$ , εἶναι 0, 1, 2, 3, 4, ..  $\mu$ · καὶ ἐπομένως τὸ πλῆθος τῶν θετικῶν καὶ ἀκεραίων λύσεων τῆς ἐξίσωσως εἶναι τότε  $\mu + 1$ .

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι  $\alpha\eta + \beta\theta = \gamma$  (διότι  $\chi = \eta$ ,  $\psi = \theta$  εἶναι λύσις τῆς ἐξίσωσως  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$ ), ἔπεται, ἂν διαιρέσωμεν πάντας τοὺς ἄρους διὰ  $\alpha\beta$ ,

$$\frac{\eta}{\beta} + \frac{\theta}{\alpha} = \frac{\gamma}{\alpha\beta} \quad (i)$$

Ἐστω  $\mu$  ὁ μέγιστος θετικὸς ἀκέραιος ὁ ἐν τῷ κλάσματι  $\frac{\eta}{\beta}$  περιε-

χόμενος, τότε θὰ εἶναι  $\frac{\eta}{\beta} = \mu + \varphi$  (τοῦ  $\varphi$  ὄντος μικροτέρου τῆς μονάδος 1) καὶ ἡ ἰσότης (ι) γίνεται

$$\mu + \varphi + \frac{\theta}{\alpha} = \frac{\gamma}{\alpha\beta}$$

ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι τὸ κλάσμα  $\frac{\gamma}{\alpha\beta}$  θὰ περιέχῃ μέγιστον ἀκέραιον ἢ τὸν

$\mu$ , ἢ τὸν  $\mu + 1$  (τὸν  $\mu$ , ἂν τὸ ἄθροισμα  $\varphi + \frac{\theta}{\alpha}$  εἶναι μικρότερον τῆς μονάδος, τὸν δὲ  $\mu + 1$ , ἂν μεγαλύτερον). μεγαλύτερον ὅμως ἀκέραιον δὲν δύναται νὰ περιέχῃ· διότι οἱ δύο ἀριθμοὶ  $\varphi$  καὶ  $\frac{\theta}{\alpha}$  εἶναι ἀμφοτέρωι μικρότεροι τῆς μονάδος (διότι  $\theta < \alpha$ ) καὶ δὲν δύνανται ν' ἀποτελέσωσι τὸν 2.

Ἐκ τούτου ἔπεται, ὅτι τὸ πλῆθος τῶν θετικῶν καὶ ἀκεραίων λύσεων τῆς ἐξίσωσεως  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$ , ὅπου  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι ἀμφοτέρωι θετικοί, ἐκφράζεται ἢ ὑπὸ τοῦ μεγίστου θετικοῦ ἀκεραίου τοῦ ἐν τῷ κλάσματι  $\frac{\gamma}{\alpha\beta}$  περιεχομένου (ἂν περιέχεται ὁ  $\mu + 1$ ), ἢ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀκεραίου ἡδηξιμένου κατὰ μονάδα (ἂν περιέχεται ὁ  $\mu$ ).

Ἐστῶσαν νῦν οἱ συντελεσταὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ἕτεροειδεῖς, ἤτοι ὁ  $\alpha$  θετικὸς καὶ ὁ  $\beta$  ἀρνητικὸς· ἐὰν καὶ πάλιν λάβωμεν τὴν αὐτὴν λύσιν  $\chi = \eta$ ,  $\psi = \theta$ , ἔχομεν τοὺς αὐτοὺς τύπους τῆς γενικῆς λύσεως

$$\chi = \eta - \beta\omega$$

$$\psi = \theta + \alpha\omega$$

Αἱ ἀρνητικαὶ τιμαὶ τοῦ  $\omega$  καθιστῶσι καὶ πάλιν τὸν  $\psi$  ἀρνητικὸν (διότι δίδουσι  $\psi = \theta - \alpha$ ,  $\theta - 2\alpha$ ,  $\theta - 3\alpha$ , ...), αἱ δὲ θετικαὶ (καὶ ἢ 0) καθιστῶσιν αὐτὸν θετικὸν (διότι δίδουσι  $\psi = \theta$ ,  $\theta + \alpha$ ,  $\theta + 2\alpha$ , ...).

Ὡς πρὸς τὸν  $\chi$  παρατηροῦμεν, ὅτι, ἂν μὲν εἶναι ὁ  $\eta$  θετικὸς, αἱ τιμαὶ  $\omega = 0, 1, 2, \dots$  δίδουσι θετικὰς τιμὰς τοῦ  $\chi$ ,  $\chi = \eta$ ,  $\eta - \beta$ ,  $\eta - 2\beta$ , ... (διότι ὁ  $\beta$  εἶναι ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἀρνητικὸς· ἄρα ὁ  $-\beta$  θετικὸς). ἂν δὲ ὁ  $\eta$  εἶναι ἀρνητικὸς, αἱ θετικαὶ τιμαὶ τοῦ  $\omega$  αἱ ὑπερβαίνουσαι τὸ κλάσμα  $\frac{\eta}{\beta}$  καθιστῶσι τὸν  $\chi$  θετικόν.

Διότι  $\beta$  τιμὴ τοῦ  $\chi$  δύναται νὰ γραφῆ καὶ ὡς ἐξῆς:

$$\chi = \beta \left( \frac{\eta}{\beta} - \omega \right)$$

καὶ ἐπειδὴ ὁ παράγων  $\beta$  εἶναι ἀρνητικὸς, διὰ νὰ εἶναι θετικὸν τὸ γινόμε-

ναν, πρέπει και αρκεί να είναι και ο άλλος παράγων αρνητικός· ήτοι να είναι  $\omega > \frac{\eta}{\beta}$ .

ὥστε, διὰν οἱ συντελεσταὶ  $\alpha$  καὶ βτῆς ἐξισώσεως  $\alpha\chi + \beta\psi = \gamma$  εἶναι ἑτεροειδεῖς, ἡ ἐξίσωσις ἐπιδέχεται πλῆθος ἀπειρον θετικῶν καὶ ἀκεραίων λύσεων.

### Προβλήματα.

1) Εὐρεῖν κλάσμα τοιοῦτον, ὥστε ἂν ὁ ἀριθμητὴς αὐτοῦ ἀξηθῆ κατὰ 3 καὶ ὁ παρονομαστὴς κατὰ 4, νὰ γίνηται τὸ κλάσμα ἴσον τῷ  $\frac{2}{3}$ .

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\chi$  παρασταθῆ ὁ παρονομαστὴς καὶ διὰ τοῦ  $\psi$  ὁ ἀριθμητὴς, θὰ εἶναι

$$\frac{\psi + 3}{\chi + 4} = \frac{2}{3}.$$

Ὅθεν ἔπεται ἡ ἐξίσωσις  $3\psi - 2\chi = -1$ , ἣτις ἐπιδέχεται τὰς ἀκεραίας λύσεις

$$\chi = 2 + 3\omega,$$

$$\psi = 1 + 2\omega.$$

Εἶναι δὲ πᾶσαι αὗται θετικάι, ἐὰν  $\omega$  εἶναι ἢ 0 ἢ θετικόν, ὥστε ὑπάρχουσιν ἀπειρα τοιαῦτα κλάσματα καὶ δίδονται ὑπὸ τοῦ τύπου

$$\frac{1 + 2\omega}{2 + 3\omega} \quad \text{ἐνθ} \chi \ \omega = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

ΣΗΜ. Τὰς ἀκεραίας λύσεις τῆς ἐξισώσεως

$$\frac{\psi + 3}{\chi + 4} = \frac{2}{3}$$

εὐρίσκομεν ἀπλούστατα, ἐὰν ἐνθυμηθῶμεν ἐκ τῆς ἀριθμητικῆς, ὅτι, ὅταν δύο κλάσματα εἶναι ἴσα καὶ τὸ ἕτερον αὐτῶν εἶναι ἀνάγωγον (ὡς τὸ  $\frac{2}{3}$ ),

οἱ ὅροι τοῦ ἄλλου εἶναι γινόμενα τῶν ὄρων τοῦ ἀναγώγου ἐπὶ τινὰ ἀκέραιον ἀριθμόν· ἵνα ἀληθεύσῃ λοιπὸν ἡ ἐξίσωσις, ἀνάγκη νὰ εἶναι

$$\psi + 3 = 2\phi$$

καὶ

$$\chi + 4 = 3\phi.$$

Ὅθεν ἔπεται ἡ λύσις  $\chi = 3\phi - 4$  καὶ  $\psi = 2\phi - 3$ , ἐξ ἧς προκύπτει ἡ προηγουμένως εὑρεθεῖσα, ἂν τεθῆ  $\phi = \omega + 2$  (διότι ὁ  $\phi$  εἶναι οἷοςδῆποτε ἀκέραιος, ὡς καὶ ὁ  $\omega$ ). Ὅμοίως σκεπτόμενοι εὐρίσκομεν καὶ γενικῶς τὰς λύσεις πάσης ἐξισώσεως τῆς μορφῆς

$$\frac{\psi - \theta}{\chi - \eta} = \frac{\alpha}{\beta},$$

αίτινες είναι

$$\chi = \eta + 3\omega$$

$$\psi = \theta + \alpha\omega.$$

2) Ἐμπορος ἠγόρασεν ἵππους καὶ βόας ἀντὶ 1770 ταλλήρων ἐπλήρωσε δὲ δι' ἕκαστον μὲν ἵππον 31 τάλληρα, δι' ἕκαστον δὲ βοῦν 21. Πόσους ἵππους καὶ πόσους βόας ἠγόρασεν;

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\chi$  παραστήσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἵππων καὶ διὰ τοῦ  $\psi$  τὸν ἀριθμὸν τῶν βοῶν, ἔχομεν τὴν ἐξίσωσιν

$$31\chi + 21\psi = 1770,$$

ἥςτινος αἱ ἀκέραιαι λύσεις περιέχονται πᾶσαι εἰς τοὺς τύπους

$$\chi = 9 + 21\omega$$

$$\psi = 71 - 31\omega.$$

Ἐκ δὲ τούτων θετικαὶ εἶναι μόνον αἱ πρὸς τὰς τιμὰς  $\omega = 0, \omega = 1, \omega = 2$  ἀντιστοιχοῦσαι· ἦτοι

$$\begin{array}{l} \chi = 9 \\ \psi = 71 \end{array}$$

ἢ

$$\begin{array}{l} \chi = 30 \\ \psi = 40 \end{array}$$

ἢ

$$\begin{array}{l} \chi = 51 \\ \psi = 9. \end{array}$$

3) Πρόκειται νὰ πληρωθῶσι 43 δραχμαὶ διὰ διδράχμων καὶ πενταδράχμων, πόσα ἐξ ἑκάστου εἴδους πρέπει νὰ δοθῶσι;

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\chi$  παραστήσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν διδράχμων καὶ διὰ τοῦ  $\psi$  τὸν ἀριθμὸν τῶν πενταδράχμων, θὰ εἶναι

$$2\chi + 5\psi = 43.$$

Αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῆς ἐξίσωσεως ταύτης περιέχονται εἰς τοὺς τύπους

$$\chi = 19 - 5\omega$$

$$\psi = 1 + 2\omega.$$

Ἐκ τούτων εἶναι θετικαὶ αἱ πρὸς τὰς τιμὰς  $\omega = 0, 1, 2, 3$  ἀντιστοιχοῦσαι· ὥστε εἶναι

$$\begin{array}{l} \chi = 19 \\ \psi = 1 \end{array}$$

ἢ

$$\begin{array}{l} \chi = 14 \\ \psi = 3 \end{array}$$

ἢ

$$\begin{array}{l} \chi = 9 \\ \psi = 5 \end{array}$$

ἢ

$$\begin{array}{l} \chi = 4 \\ \psi = 7. \end{array}$$

4) Βοσκὸς τις θέλει μὲ 40 λίρας νὰ ἀγοράσῃ 40 ζῶα τριῶν εἰδῶν· ἀρνία, πρόβατα καὶ κριοὺς· πωλεῖται δὲ ἕκαστον ἀρνίον ἡμίσειαν λίραν, ἕκαστον πρόβατον δύο καὶ ἕκαστος κριὸς τέσσαρας λίρας. Πόσα θὰ ἀγοράσῃ ἐξ ἑκάστου εἴδους;

Ἐστῶσαν  $\chi$  οἱ κριοί,  $\psi$  τὰ πρόβατα καὶ  $\phi$  τὰ ἀρνία· τότε εἶναι

$$\chi + \psi + \phi = 40$$

καὶ

$$4\chi + 2\psi + \frac{\phi}{2} = 40,$$

ἐξ ὧν ἀπαλείφοντες τὸν  $\phi$  εὐρίσκομεν

$$7\chi + 3\psi = 40.$$

Ἐπιδέχεται δὲ ἡ ἐξίσωσις αὕτη τὰς ἀκεραίας λύσεις

$$\chi = 1 + 3\omega$$

$$\psi = 11 - 7\omega,$$

ἐξ ὧν θετικά ἐῖναι αἱ πρὸς τὰς τιμὰς  $\omega=0$ ,  $\omega=1$  ἀντιστοιχοῦσαι· ἦτοι

$$\begin{array}{lll} \eta & \chi=1, & \psi=11 \quad \text{καὶ ἐπομένως } \varphi=28 \\ \eta & \chi=4 & \psi=4 \quad \quad \quad \text{»} \quad \varphi=32. \end{array}$$

5) *Εὐρεῖν ἀριθμὸν διψήφιον καὶ τοιοῦτον, ὥστε τὸ διπλάσιον τῶν δεκάδων αὐτοῦ προσλαβὸν καὶ τὸν 8 νὰ γίνηται ἴσον πρὸς τὸ πέμπτον τῆς διαφορᾶς τοῦ 66 καὶ τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων.*

Ἐὰν παραστήσωμεν διὰ τοῦ  $\chi$  τὰς δεκάδας καὶ διὰ τοῦ  $\psi$  τὰς μονάδας, θὰ εῖναι

$$2\chi + 8 = \frac{66 - \psi}{5}$$

$$\eta \quad 10\chi + 40 = 66 - \psi, \quad \delta\theta\epsilon\nu \quad 10\chi + \psi = 26.$$

πρέπει δὲ νὰ εῖναι οἱ ἄγνωστοι  $\chi$ ,  $\psi$  ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοὶ καὶ μικρότεροι τοῦ 10.

Αἱ ἀκέραιαι καὶ θετικά λύσεις τῆς ἐξίσωσως ταύτης εῖναι

$$\begin{array}{ll} \chi=0 & \psi=26 \\ \chi=1 & \psi=16 \\ \chi=2 & \psi=6. \end{array}$$

Ἐκ δὲ τούτων ἡ τελευταία μόνη πληροῖ τοὺς περιορισμοὺς πάντας· ὥστε ἡ μόνη λύσις εῖναι ὁ ἀριθμὸς 26.

6) *Εὐρεῖν ἀριθμὸν τριψήφιον καὶ τοιοῦτον, ὥστε τὸ 25πλάσιον τοῦ ψηφίου τῶν ἑκατοντάδων προσλαβὸν καὶ τὸ διπλάσιον τῶν δεκάδων καὶ τὸν 156 νὰ γίνηται ἴσον πρὸς τὸ τέταρτον τοῦ 1560, ἀφοῦ ἐλατωθῆ οὔτως κατὰ τὸ διπλάσιον τῶν δεκάδων καὶ κατὰ τὰς μονάδας.*

Ἔστωσαν  $\chi$  αἱ ἑκατοντάδες,  $\psi$  αἱ δεκάδες καὶ  $\omega$  αἱ μονάδες τοῦ ζητουμένου ἀριθμοῦ.

Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος θὰ εῖναι

$$25\chi + 2\psi + 156 = \frac{1560 - 2\psi - \omega}{4}$$

$$\eta \quad 100\chi + 8\psi + 624 = 1560 - 2\psi - \omega,$$

$$\delta\theta\epsilon\nu \quad 100\chi + 10\psi + \omega = 936.$$

πρέπει δὲ νὰ εῖναι οἱ ἄγνωστοι  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  πάντες ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ καὶ μικρότεροι τοῦ 10.

Γράφοντες τὴν ἐξίσωσιν ὡς ἔπεται

$$100(\chi - 9) + 10(\psi - 3) + (\omega - 6) = 0,$$

βλέπομεν εὐκόλως, ὅτι ἡ μόνη λύσις ἢ πάντας τοὺς ὄρους τοῦ προβλήματος πληροῦσα εῖναι  $\chi=9$ ,  $\psi=3$ ,  $\omega=6$ . ὥστε ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εῖναι ὁ 936.

7) Εὑρεῖν ἀριθμὸν τριψήφιον καὶ τοιοῦτον, ὥστε τὸ εἰκοσαπλάσιον τοῦ ψηφίου τῶν ἑκατοντάδων καὶ τὸ ψηφίου τῶν δεκάδων προσλαβόντα καὶ τὴν μονάδα 1 νὰ ἰσῶνται πρὸς τὸ πέμπτον τοῦ ἀριθμοῦ.

Ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$20\chi + \psi + 1 = \frac{100\chi + 10\psi + \omega}{5}$$

διότι ὁ ἀριθμὸς ἔχει μονάδας τὸ ὅλον  $100\chi + 10\psi + \omega$ .

Ἐκ τῆς ἐξισώσεως ταύτης ἔπεται

$$\omega + 5\psi = 5.$$

αἱ δὲ λύσεις αὐτῆς, αἱ εἰς τὸ πρόβλημα ἀρμόζουσαι, εἶναι

$$\omega = 0, \quad \psi = 1$$

$$\omega = 5, \quad \psi = 0.$$

Ἐπειδὴ δὲ ὁ  $\chi$  δὲν ὠρίσθη, ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι εἰς ἕκ τῶν ἐπομένων

$$\begin{array}{cccccccccc} 110 & 210 & 310 & 410 & 510 & 610 & 710 & 810 & 910 \\ 105 & 205 & 305 & 405 & 505 & 605 & 705 & 805 & 905, \end{array}$$

διότι πάντες οὗτοι πληροῦσι τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

8) Εὑρεῖν ἀριθμὸν διψήφιον, ὅσους ἀντιστροφόμενος γίνεται ἴσος πρὸς τὰ  $\frac{4}{7}$  ἑαυτοῦ.

Ἐὰν  $\chi$  εἶναι αἱ δεκάδες τοῦ ἀριθμοῦ καὶ  $\psi$  αἱ μονάδες αὐτοῦ, θὰ ἔχη μονάδας τὸ ὅλον  $10\chi + \psi$ , ἀντιστροφόμενος δὲ θὰ ἔχη μονάδας τὸ ὅλον  $10\psi + \chi$ . ὥστε θὰ εἶναι

$$10\psi + \chi = \frac{4}{7} (10\chi + \psi).$$

Ὅθεν προκύπτει

$$66\psi = 33\chi$$

ἢ

$$2\psi = \chi.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι οἱ ἄγνωστοι  $\chi$ ,  $\psi$  ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοὶ καὶ μικρότεροι τοῦ 10.

Αἱ λύσεις τοῦ προβλήματος εὐρίσκονται εὐκόλως ἐκ τῆς ἐξισώσεως καὶ εἶναι

$$\eta \quad \psi = 1 \quad \text{καὶ} \quad \chi = 2$$

$$\eta \quad \psi = 2 \quad \chi = 4$$

$$\eta \quad \psi = 3 \quad \chi = 6$$

$$\eta \quad \psi = 4 \quad \chi = 8,$$

ὥστε οἱ λύοντες τὸ πρόβλημα ἀριθμοὶ εἶναι οἱ 21, 42, 63, 84.

Πρὸς ἄσκησιν προτείνομεν εἰς λύσιν καὶ τὰ ἐπόμενα προβλήματα.

1) Εὐρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις διαιρούμενος διὰ 5 δίδει ὑπόλοιπον 3, δι' 7 ὑπόλοιπον 2 καὶ διὰ 11 ὑπόλοιπον 1. ('Απ.  $\chi=23+385\omega$ ).

2) Νὰ διαιρεθῇ ὁ 150 εἰς δύο μέρη, ὧν τὸ μὲν νὰ εἶναι διαιρετὸν δι' 7, τὸ δὲ διὰ 23. ('Απ. 35 καὶ 115).

3) Εἰς ἑορτὴν ἐδαπάνησαν ἄνδρες καὶ γυναῖκες δραχμὰς 200· εἶναι δὲ γνωστὸν, ὅτι ἐκάστη γυνὴ ἐδαπάνησε δραχμὰς 9, ἕκαστος δὲ ἀνὴρ 11. Πόσοι ἦσαν οἱ ἄνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναῖκες;

('Απ.  $\alpha=1$  καὶ  $\gamma=21$ , ἢ  $\alpha=10$  καὶ  $\gamma=10$ ).

4) Εἰς ἑορτὴν ἐδαπάνησαν 30 ἄτομα, ἄνδρες γυναῖκες καὶ παιδιὰ 30 τάλληρα· καὶ τῶν μὲν ἀνδρῶν ἐδαπάνησεν ἕκαστος 3 τάλληρα, τῶν δὲ γυναικῶν ἐκάστη  $2\frac{1}{2}$ , τῶν δὲ παιδίων  $\frac{1}{2}$ . Ζητεῖται πόσοι ἦσαν οἱ ἄνδρες, πόσαι αἱ γυναῖκες καὶ πόσα τὰ παιδιὰ; ('Απ. 6, 0, 24, ἢ 2, 5, 23).

5) Πρόκειται ἐξ 100 νομισμάτων, πενταδράχμων, διδράχμων καὶ ἀργυρῶν κερμάτων τῶν 20 λεπτῶν, νὰ σχηματισθῇ τὸ ποσὸν 100 δραχμῶν· πόσα πρέπει νὰ λάβωμεν ἐξ ἐκάστου εἴδους;

6) Εὐρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις διαιρούμενος διὰ τοῦ 7 νὰ δίδῃ πηλίκον ὅσον καὶ ὑπόλοιπον. ('Απ. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48).

7) Εὐρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις εἴτε διὰ 7 εἴτε διὰ 11 διαιρεθῇ νὰ δίδῃ πηλίκον ἴσα μὲ τὰ ὑπόλοιπα. ('Απ. 0, 24, 48).

8) Ἄνθρωπός τις διέταξεν ἐν τῇ διαθήκῃ του νὰ μοιρασθῶσιν αἱ κάμηλοί του εἰς τοὺς τρεῖς υἱούς του ὡς ἐξῆς. Ὁ πρῶτος νὰ λάβῃ τὸ ἡμισυ αὐτῶν, ὁ δεῦτερος τὸ  $\frac{1}{3}$  καὶ ὁ τρίτος τὸ  $\frac{1}{9}$ . Ὁ ἀριθμὸς τῶν καμήλων δὲν διηρεῖτο διὰ τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 9· ὥστε ἡ διανομὴ ἦτο ἀδύνατος· ἀλλ' ὁ καθῆς, ἵνα κατορθωθῇ ἡ διανομὴ, ἐδώρησεν εἰς τὰ ὄρφανὰ ἀριθμὸν τινα καμήλων καὶ τότε ὄχι μόνον ἔγειεν ἡ διανομὴ συμφῶνως πρὸς τὴν διαθήκην, ἀλλ' ἔμειναν καὶ ὡς περίσσευμα αἱ κάμηλοι τοῦ καθῆ, ἃς οὗτος ἔλαβε πάλιν ὀπίσω Ζητεῖται πόσοι ἦσαν αἱ κάμηλοι καὶ πόσας ἐδώρησεν ὁ καθῆς;

Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς  $\chi$  σημαίνῃ τὰς καμήλους τῶν ὄρφανῶν καὶ ὁ  $\psi$  τὰς τοῦ καθῆ, εὐρίσκομεν  $\chi=17\psi$

ὥστε τὸ πρόβλημα ἐπιδέχεται λύσεις ἀπείρους τὸ πλῆθος.

9) Εὐρεῖν ἀριθμὸν τριψήφιον, ὅστις ἀντιστρεφόμενος γίνεται ἴσος πρὸς τὰ  $\frac{4}{7}$  ἑαυτοῦ. ('Απ. 231, 462, 693).

10) Εὐρεῖν ἀκέραιον ἀριθμὸν διψήφιον, ὅστις ἀντιστρεφόμενος ἐλαττοῦται κατὰ 81.

## ΒΙΒΛΙΟΝ Γ'.

### ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

##### ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

174. Τὸ σύστημα τῶν ἀκεραίων καὶ τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν (τῶν θετικῶν καὶ τῶν ἀρνητικῶν) εἶναι μὲν τέλειον κατὰ τὰς τέσσαρας στοιχειώδεις πράξεις, ὥστε λύονται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ εἰς πρωτοβάθμιον ἐξίσωσιν ἄγοντα ζητήματα· φαίνεται ὁμως ἐλλιπὲς καὶ τοῦτο, ὅταν, μένοντες ἐν αὐτῷ, ἐπιχειρήσωμεν τὴν λύσιν ἀνωτέρων ζητημάτων, οἷα εἶναι τὰ ἐπόμενα.

Ἐυρεῖν τὸν ἀριθμὸν, οὗ τὸ τετράγωνον νὰ εἶναι ἴσον τῷ 2·  
ἢ εὑρεῖν ἀριθμὸν, οὗ ὁ κύβος νὰ εἶναι ἴσος τῷ 4, καὶ τὰ λοιπά,  
ἄτινα ὑπὸ οὐδενὸς τῶν εἰρημένων ἀριθμῶν λύονται.

Ἐπιπ. χ. οὐδεὶς ἀκέραιος ἔχει τετράγωνον τὸν 2, εἶναι προφανές·  
ἀλλ' οὐδὲ κλασματικός· διότι ἂν ὑποθεθῇ τοιοῦτος ὁ  $\frac{\mu}{\nu}$ , ἔστω δὲ τὸ  
κλάσμα  $\frac{\mu}{\nu}$  ἀνάγων· τότε θὰ εἶναι

$$\left(\frac{\mu}{\nu}\right)^2 = 2, \quad \text{ἢ} \quad \frac{\mu^2}{\nu^2} = 2.$$

Ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν μεταξὺ τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν  $\mu$  καὶ  $\nu$  ἡ ἰσότης  
 $\mu^2 = 2 \cdot \nu^2$ .

Ἄλλ' ἀκέραιοι ἀριθμοὶ ἐπαληθεύοντες τὴν ἐξίσωσιν ταύτην δὲν ὑπάρχουσι· καὶ ὄντως, ὁ ἀριθμὸς  $\mu$  πρέπει νὰ εἶναι ἄρτιος (διότι τὰ τετράγωνα τῶν ἄρτιων εἶναι ἄρτια καὶ τῶν περιττῶν περιττά)· δύναται λοιπὸν νὰ τεθῇ  $\mu = 2\mu'$ , τοῦ  $\mu'$  ὄντος ἄλλου ἀκεραίου· τότε ἡ ἐξίσωσις γίνεται  $4\mu'^2 = 2\nu^2$ , ἢτοι

$$\nu^2 = 2\mu'^2.$$

ὥστε καὶ ὁ  $\nu$  εἶναι ἄρτιος· τοῦτο ὁμως εἶναι ἀδύνατον· διότι τὸ κλάσμα  $\frac{\mu}{\nu}$  ὑπετέθη ἀνάγων. Ἐκ τούτου συνάγεται, ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῶν ἀριθμῶν, οὓς ἔχομεν, ἔχει τετράγωνον τὸν 2.



Ὁμοίως ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ 10 οὐδενὸς ἀριθμοῦ (ἐξ ὧσων ἔχομεν) εἶναι τετράγωνον, οὐδὲ κύβος, οὐδὲ δύναμις οἰασθήποτε τάξεως.

Ἄλλὰ καὶ ἡ μέτρησις τῶν γραμμῶν καὶ ἐπομένως ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀριθμητικῆς εἰς τὴν γεωμετρίαν καὶ ἐν γένει ἡ καταμέτρησις τῶν συν-εχῶν λεγομένων ποσῶν εἶναι ἀδύνατος (ὡς ἐν τῇ γεωμετρίᾳ ἀποδει-κνύεται), ἐὰν μένωμεν περιωρισμένοι εἰς τοὺς ἀριθμοὺς τούτους.

175. Τὰ ζητήματα ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, ἢ πρέπει νὰ θεω-ρήσωμεν ἄλυτα καὶ νὰ περιορίσωμεν τὴν ἀριθμητικὴν εἰς τὰ ἀπλούστερα ζητήματα, τὰ διὰ τῶν τεσσάρων πράξεων λυόμενα, ἢ, ἵνα ἄρωμεν καὶ τὸ ἐμπόδιον τοῦτο τῆς προόδου τῆς ἀριθμητικῆς, πρέπει νὰ ἀυξήσωμεν τὸ ὑπάρχον σύστημα τῶν ἀριθμῶν διὰ τῆς προσαρτήσεως νέων ἀριθμῶν καὶ τοιούτων, ὥστε νὰ λύονται καὶ τὰ ρηθέντα ζητήματα, νὰ διατη-ρῶνται δέ, ὡς πάντοτε, οἱ νόμοι τῶν πράξεων ἀβλαβεῖς.

176. Εἰς τὴν εὔρεσιν τῶν νέων τούτων ἀριθμῶν ὀδηγεῖ ἡμᾶς ἡ παρατήρησις, ὅτι, ἐὰν ἐκ τῆς μονάδος 1 καὶ ἐκ τῶν δεκαδικῶν μονάδων

$\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{1000}$ , ... θέλωμεν ν' ἀποτελέσωμεν πάντας τοὺς ἀριθ-

μοὺς, τὰ πλεῖστα τῶν κλασμάτων ἀπαιτοῦσιν, ἵνα ἀποτελεσθῶσιν, ἀπει-ρον πλῆθος τοιούτων μονάδων· οὕτω π. χ. τὸ κλάσμα  $\frac{2}{5}$  γίνεται 0,4

καὶ τὸ  $\frac{8}{25}$  γίνεται 0,32· ἀλλὰ τὸ  $\frac{1}{3}$  δὲν δύναται ἄλλως νὰ ἀποτελε-σθῇ ὑπὸ δεκαδικῶν μονάδων ἢ ὑπὸ τῶν ἐπομένων ἀπειρῶν τὸ πλῆθος

0,33333... ὡσαύτως τὸ  $\frac{5}{33}$  ἀποτελεῖται μόνον ὑπὸ τῶν ἐπομένων

0,1515151515... , ἐὰν αἱ ἀπειροὶ αὗται μονάδες νοηθῶσιν ὡς ἐν ὅλῳ ἀποτελοῦσαι.

Τὰ ἀπειρα δεκαδικὰ ψηφία τὰ οὕτω προκύπτοντα ἐπαναλαμβάνονται (ἀπὸ τινος καὶ ἐφεξῆς) ἀπχύστως τὰ αὐτὰ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν Ἄλλ' ἂν ἀπειροὶ τὸ πλῆθος δεκαδικαὶ μονάδες θεωρηθῶσιν, ὅτι συν-αποτελοῦσιν ἀριθμὸν, ὅταν τὰ ψηφία, δι' ὧν γράφονται, ἔχωσι τὴν εἰ-ρημένην τάξιν, διατί νὰ μὴ συμβαίη τὸ αὐτό, καὶ ὅταν τὰ ψηφία, δι' ὧν γράφονται αἱ μονάδες, εἶναι οἰαδήποτε;

Εὐνόητον ἀποβαίνει ἐκ τούτων, ὅτι δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ὡς ἀριθμὸν τὸ πλῆθος οἰωνδήποτε δεκαδικῶν μονάδων, δι' οἰωνδήποτε ψη-φίων καὶ ἂν γράφονται αὗται.

Όλον τὰ ἐξῆς πλήθη τῶν δεκαδικῶν μονάδων

0,	10	100	1000	10000	...					
0,	2	4	8	16	32	64	128	...		
0,	51	511	5111	51111	...					
8,	52	502	5002	50002	...					
12,	389	3890	38900	389000	...					
4,	25	50	75	100	125	150	...			
0,	12	13	14	15	16	17	18	19	20	...

δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ἀριθμοὶ ὠρισμένοι, διότι τὰ ψηφία αὐτῶν εἶναι ἐντελῶς ὠρισμένα (ὁ νόμος, καθ' ὃν προχωροῦσι τὰ ψηφία ἐκάστου, εἶναι προφανής).

Ἄλλ' ἂν ἀπειρον πλήθος δεκαδικῶν μονάδων δεχόμεθα ὡς ἀριθμὸν, οὐδὲν κωλύει νὰ δεχθῶμεν ὡς ἀριθμὸν καὶ πλήθος ἀπειρον οἰωνδήποτε μονάδων ὁμοειδῶν (θετικῶν ἢ ἀρνητικῶν) τοιουτοτρόπως φθάνομεν εἰς τὸν ἐξῆς γενικὸν ὄρισμὸν τοῦ ἀριθμοῦ.

### Ὅρισμός.

177. Ἀριθμὸς λέγεται τὸ σύνολον ὁμοειδῶν μονάδων, εἴτε πεπερασμένον εἶναι τὸ πλήθος αὐτῶν εἴτε καὶ ἀπειρον, ἔὰν ὅσχιδήποτε ἐκ τῶν μονάδων τούτων καὶ ἂν προστεθῶτι, πάντοτε δίδωσιν ἄθροισμα μικρότερον ἀκεραίου τινὸς ὁμοειδοῦς.

Ὁ περιορισμὸς οὗτος εἶναι ἀναγκαῖος διὰ τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν τὸ πλήθος τῶν μονάδων εἶναι ἀπειρον· διότι παντὸς ἀριθμοῦ πρέπει νὰ ὑπάρχη ἄλλος μεγαλύτερος.

Ὁ ἀριθμὸς εἶναι ὠρισμένος, ὅταν εἶναι ὠρισμένοι αἱ συναποτελοῦσαι αὐτὸν μονάδες, π. χ. ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς

$$1 + \frac{1}{10^1} + \frac{1}{10^{10}} + \frac{1}{10^{100}} + \frac{1}{10^{1000}} + \frac{1}{10^{10000}} + \dots$$

εἶναι ἐντελῶς ὠρισμένος· διότι πάντα τὰ ψηφία αὐτοῦ εἶναι ἐντελῶς ὠρισμένα.

ΣΗΜ. Πᾶς ἀριθμὸς δύναται νὰ νοηθῆ ὡς συγκείμενος ἐκ δεκαδικῶν μονάδων· διότι ἐκάστη τῶν ἄλλων ἀποτελεῖται ὑπὸ πλήθους τινὸς δεκαδικῶν μονάδων.

### Ὅρισμὸς τῆς ἰσότητος καὶ τῆς ἀνεσότητος τῶν θετικῶν ἀριθμῶν.

178. Μεγαλύτερος λέγεται ἀριθμὸς ἄλλου ἀριθμοῦ, ἔὰν ἔχη πάσας τὰς μονάδας αὐτοῦ καὶ ἄλλας προσέτι.

179. Ἴσοι λέγονται δύο ἀριθμοί, ἔὰν πᾶς ἀριθμὸς, ἀκεραῖος ἢ κλασματικὸς, μικρότερος τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, εἶναι μικρότερος καὶ τοῦ ἄλλου.

Ἐστῶσαν ὡς παράδειγμα οἱ ἀριθμοὶ 1 καὶ 0,99999...  
 πᾶς ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ πρώτου εἶνε μικρότερος καὶ τοῦ δευτέρου·  
 διότι ἔστω ὁ μικρότερος τῆς μονάδος ἀριθμὸς  $\frac{538}{539}$ · οὗτος εἶναι μικρότε-  
 ρος τοῦ  $\frac{999}{1000}$ · (διότι ὁ  $\frac{999}{1000}$  διαφέρει ἀπὸ τῆς μονάδος κατὰ ἓν χιλιοστὸν  
 $\left(\frac{1}{1000}\right)$ , ἐνῶ ὁ  $\frac{538}{539}$  διαφέρει αὐτῆς κατὰ  $\frac{1}{539}$ , ἧτοι περισσύτερον), ἄρα ὁ  
 $\frac{538}{539}$  ὡς μικρότερος τοῦ 0,999 εἶναι μικρότερος καὶ τοῦ 0,999999...·

Ἀλλὰ καὶ πᾶς ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ 0,99999...  
 εἶναι καὶ τῆς μονάδος μικρότερος· διότι ὅσαδῆποτε ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ  
 0,99999...· καὶ ἂν λάβωμεν, πάντοτε εὐρίσκομεν ἀριθμὸν μικρότερον  
 τῆς μονάδος· ὥστε εἶναι

$$1 = 0,99999\dots$$

$$0,1 = 0,09999\dots$$

$$0,01 = 0,00999\dots \text{ κλπ.}$$

Ὅτι δὲ ὁ νέος οὗτος ὀρισμὸς τῆς ἰσότητος ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ  
 τῶν ἀκεραίων καὶ ἐπὶ τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν, εἶναι φανερόν.

### Ἰσότης καὶ ἀνισότης τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

180. Διὰ νὰ εἶναι ἴσοι δύο ἀριθμοὶ ἐξ ἀκεραίων καὶ ἐκ δεκαδικῶν μο-  
 νάδων συγχείμενοι, πρέπει ἢ α) νὰ συμφωνῶσι κατὰ πάντα τὰ ὁμοταγῆ  
 ψηφία αὐτῶν, ἢ β) τὰ πρῶτα ὁμοταγῆ ψηφία, καθ' ἃ διαφέρουσι, νὰ  
 ἔχωσι διαφορὰν 1, καὶ τοῦ μὲν ἔχοντος τὸ μικρότερον ψηφίον πάντα  
 τὰκόλουθα ψηφία νὰ εἶναι 9, τοῦ δὲ ἔχοντος τὸ μεγαλύτερον πάντα  
 τὰλλα νὰ εἶναι 0· ἄλλως οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἀνισοί.

Διότι, ὑποθέσωμεν, ὅτι δύο ἴσοι ἀριθμοὶ παρίστανται ὡς δεκαδικοὶ  
 καὶ εἶναι οἱ ἑξῆς·

$$2,125\dots \text{ καὶ } 2,124\dots$$

Ἐπειδὴ τὸ περισσεῦον ἓν χιλιοστὸν τοῦ πρώτου ἰσοῦται τῷ 0,000999...·  
 ὁ πρῶτος ἀριθμὸς ἰσοῦται τῷ 2,124999...· ἠϋξημένῳ κατὰ τὰς μονάδας  
 τῶν ἀνωτέρων τάξεων, ἐὰν ὑπάρχωσιν· ἐπειδὴ δὲ οἱ ἀριθμοὶ ὑποτίθενται  
 ἴσοι, βλέπομεν, ὅτι πάντα τὰ λοιπὰ ψηφία τοῦ δευτέρου ἀνάγκη νὰ εἶναι 9  
 καὶ ὁ πρῶτος ἀριθμὸς νὰ μὴ ἔχη ψηφία μηδεμιᾶς τῶν ἀνωτέρων τάξεων.

181. Ἐὰν τὰ πρῶτα ὁμοταγῆ ψηφία, καθ' ἃ διαφέρουσιν οἱ ἀριθ-  
 μοί, ἔχωσι διαφορὰν μεγαλύτεραν τοῦ 1, οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἀνισοί.

Ἐστῶσαν ὡς παράδειγμα οἱ ἀριθμοὶ 2,126... καὶ 2,124...·

Οἱαδῆποτε καὶ ἂν εἶναι τὰ ἐπόμενα ψηφία τοῦ δευτέρου, δὲν δύναται  
 οὗτος νὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 2,1249999...· ἧτοι τοῦ 2,125· εἶναι  
 ἄρα μικρότερος τοῦ πρώτου.

## Διάκρισις τῶν ἀριθμῶν εἰς συμμετρους καὶ εἰς ἀσυμμέτρους.

182. Ὁ νέος ὀρισμὸς τῶν ἀριθμῶν περιλαμβάνει μὲν πάντας τοὺς ἀκεραίους καὶ τοὺς κλασματικούς ἀριθμούς, εἰσάγει δὲ καὶ ἄλλους ἀριθμούς διαφόρους τούτων· τῷ ὄντι οἱ ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία μὴ περιοδικὰ ἔχοντες ἀριθμοί, οἱ διὰ τοῦ νέου ὀρισμοῦ προσαρτηθέντες, δὲν δύνανται πρὸς οὐδένα τῶν ἀκεραίων οὐδὲ τῶν κλασματικῶν νὰ εἶναι ἴσοι· διότι οὗτοι τρεπόμενοι εἰς δεκαδικούς, ἢ ἔχουσιν ὀρισμένον ἀριθμὸν ψηφίων ἢ ἔχουσιν ἄπειρα ἀλλὰ περιοδικὰ.

Πρὸς διάκρισιν καλοῦνται οἱ μὲν ἀκέραιοι καὶ οἱ κλασματικοὶ ἀριθμοί, ἧτοι οἱ ἀριθμοὶ τοῦ προηγουμένου συστήματος οἱ ἐκ πεπερασμένου πλήθους μονάδων συγκείμενοι, *σύμμετροι*, οἱ δὲ εἰσαχθέντες διάφοροι τούτων, οἱ μὴ δυνάμενοι ἄλλως νὰ ἀποτελεσθῶσιν ἢ ὑπὸ ἀπείρου πλήθους μονάδων, λέγονται *ἀσύμμετροι*· οὗτοι τρεπόμενοι εἰς δεκαδικούς ἔχουσιν ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία μὴ περιοδικὰ.

### Παρατήρησις.

Καὶ μετὰ τὴν προσάρτησιν τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν οἱ ὀρισμοὶ τῶν τεσσάρων πράξεων μένουσιν οἱ αὐτοί. Ἀποδεικνύεται δέ, ὅτι ὑπάρχει πάντοτε ἄθροισμα καὶ διαφορὰ καὶ γινόμενον καὶ πηλίκον δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν· καὶ ὅτι αἱ ἀρχικαὶ ιδιότητες τῶν πράξεων δικτηροῦνται. Ὡσαύτως ἀποδεικνύεται, ὅτι πᾶς θετικὸς ἀριθμὸς εἶναι καὶ τετράγωνον ἄλλου τινὸς καὶ κύβος ἄλλου· καὶ γενικῶς μυστὴ δύναμις ἄλλου τινὸς θετικοῦ ἀριθμοῦ (συμμέτρου ἢ ἀσυμμέτρου)· ἧτοι ὑπάρχει πάντοτε θετικὸς τις ἀριθμὸς ἔχων μυστὴν δύναμιν τὸν δοθέντα θετικὸν ἀριθμὸν. Πρὸς τούτοις ἀποδεικνύεται, ὅτι πᾶσα εὐθεῖα γραμμὴ μετρεῖται καὶ παρίσταται ὑπὸ ἀριθμοῦ (συμμέτρου ἢ ἀσυμμέτρου)· ὥστε διὰ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν λύνονται πάντα τὰ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ παρόντος κεφαλαίου μνημονευθέντα ἄλυτα ζητήματα. Ἀλλὰ τὰς ἀποδείξεις αὐτῶν παραλείπομεν ἐνταῦθα χάριν συντομίας (ιδεὲ Εἰσαγωγὴν ἀνωτέρας ἀλγέβρας).

ΣΗΜ. Οἱ ἀσύμμετροι ἀριθμοὶ συνδέονται συνήθως πρὸς τοὺς συμμετρους διὰ τινων σχέσεων, ἐξ ὧν προκύπτουσιν, ὡς ἐν τοῖς ἐπομένοις θὰ ἴδωμεν, ἰδιαιτεრაί, συντομώτεροι μέθοδοι, καθ' ἃς ἐκτελοῦνται αἱ ἐπὶ τῶν ἀσυμμέτρων πράξεις. Δυνάμεθα ὅμως (ὑπερ καὶ γίνεται ἐν τῇ πράξει) νὰ παραλείψωμεν τὰ ἄπειρα ψηφία τῶν ἀσυμμέτρων ἀπὸ τινος καὶ ἐφεξῆς (π. χ. ἀπὸ τῶν ἑκατομμυριοστῶν καὶ ἐφεξῆς), ὅτε εὐρίσκομεν ἀριθμούς συμμετρους· τὰ ἐξαγόμενα δέ, ἅτινα τότε λαμβάνομεν, προσεγγίζουσι πρὸς ἀληθῆ τὸσῶν περισσότερο, ὅσῳ περισσότερα ψηφία διατηροῦμεν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

Ὅρισμοί.

183. Ἐάν τις ἀριθμὸς εἶναι μυστὴ δύναμις ἄλλου, οὗτος λέγεται μυστὴ ρίζα τοῦ πρώτου.

Ἐάν δηλ. εἶναι  $\alpha = \beta^\mu$ , ὁ  $\beta$  λέγεται μυστὴ ρίζα τοῦ  $\alpha$ .

Ἡ μυστὴ ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ  $\alpha$  παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου  $\sqrt[\mu]{\alpha}$ . ὥστε, ἐάν εἶναι  $\alpha = \beta^\mu$ , θὰ εἶναι καὶ  $\beta = \sqrt[\mu]{\alpha}$ , τούτέστιν ἀμφότεραι αἱ ἰσότητες αὗται μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐκφράζουσι σχέσιν τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ .

184. Ἀξιοπαρατήρητοι εἶναι αἱ τυχυτότητες

$$\left(\sqrt[\mu]{\alpha}\right)^\mu = \alpha, \quad \text{καὶ} \quad \sqrt[\mu]{\alpha^\mu} = \alpha.$$

αἵτινες ἐπονται ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς μυστῆς ρίζης.

185. Ἡ ρίζα τῆς δευτέρας τάξεως λέγεται καὶ τετραγωνικὴ ρίζα· ἡ δὲ ρίζα τῆς τρίτης τάξεως λέγεται καὶ κυβικὴ ρίζα. Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα παρίσταται συνήθως ἄνευ τοῦ δείκτου 2, ὡς ἐξῆς  $\sqrt{\alpha}$ ,  $\sqrt{\alpha + \beta}$ , κ.λ.

Τὸ σημεῖον  $\sqrt{\quad}$  κκληῖται ριζικόν· ἡ δὲ ὑπ' αὐτὸ ὑπάρχουσα παράστασις λέγεται ὑπόρριζον.

Παράστασις ἔχουσα ριζικόν λέγεται ἄλογος·

$$\text{ὡς} \quad \frac{\alpha + \sqrt{\beta}}{\gamma}, \quad \alpha\sqrt{\beta}, \quad \text{κ.τ.λ.}$$

Αἱ δὲ μὴ περιέχουσαι ριζικόν λέγονται ρηταί.

186. Πᾶς θετικὸς ἀριθμὸς ἔχει δύο ρίζας ἐκάστης ἀρτίας τάξεως καὶ μίαν ἐκάστης περιπτήης.

Παραδείγματος χάριν, ὁ 16 ἔχει δύο τετραγωνικάς ρίζας, τὸν 4 καὶ τὸν  $-4$ · διότι εἶναι  $4 \cdot 4 = 16$ , ἀλλὰ καὶ  $(-4)(-4) = 16$ .

Ὅμοίως ἔχει δύο τετάρτας ρίζας, τὸν 2 καὶ τὸν  $-2$ · διότι εἶναι  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ , ἀλλὰ καὶ  $(-2)(-2)(-2)(-2) = 16$ .

Αἰτίαι τούτου εἶναι, ὅτι οἱ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ εἰς ἀρτίας δυνάμεις ὑφόμενοι δίδουσι θετικοὺς ἀριθμούς.

Ὁ δὲ ἀριθμὸς 8 ἔχει μίαν μόνην κυβικὴν ρίζαν τὸν 2· διότι εἶναι  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$  ἀλλὰ  $(-2)(-2)(-2) = -8$ .

ὥστε τὸ  $-2$  δὲν εἶναι κυβικὴ ρίζα τοῦ 8, ἀλλὰ τοῦ  $-8$ .

Αίτια τούτου εἶναι, ὅτι οἱ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ εἰς περιττὰς δυνάμεις ὑψούμενοι δίδουσιν ἀρνητικούς ἀριθμούς.

Πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς ἔχει μίαν ῥίζαν ἐκάστης περιττῆς τάξεως, ἀλλ' οὐδεμίαν ἀρτίας τάξεως.

Παραδείγματος χάριν, ὁ  $-8$  ἔχει μίαν κυβικὴν ῥίζαν τὸν  $-2$ · διότι εἶναι  $(-2)(-2)(-2) = -8$ , ἀλλὰ  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ .

Τετραγωνικὴ ῥίζα τοῦ  $-16$  δὲν ὑπάρχει· δηλαδή ὁ  $-16$  δὲν εἶναι τετραγώνον οὐδενὸς ἀριθμοῦ, διότι πᾶν τετράγωνον εἶνε θετικόν· ὁμοίως καὶ πᾶσα δύνχμις ἀρτίας τάξεως εἶναι θετικὴ.

Ὅταν ἀριθμὸς ἔχη δύο ῥίζας μιᾶς τάξεως, αἱ ῥίζαι αὗται εἶναι ἀντίθετοι ἀριθμοί, ὅταν δὲ ἔχη μίαν μόνην, ἡ ῥίζα αὕτη εἶναι ὁμοειδῆς τῷ ἀριθμῷ.

### Ῥίζαι τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν.

187. Αἱ ῥίζαι τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν εἶναι ἢ ἀκέραιοι πάλιν ἀριθμοὶ ἢ ἀσύμμετροι, οὐδέποτε δὲ κλάσματα.

Καὶ ὄντως, ἔστω τοῦ ἀκεραίου  $A$  μυστὴ ῥίζα τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$ ,

ὅπερ ὑποθεθείσθω ἀνάγωγον· τότε εἶναι  $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\mu = \frac{\alpha^\mu}{\beta^\mu} = A$ .

Ἄλλ' οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι ἐξ ὑποθέσεως πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. Ἄρα καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν  $\alpha^\mu$  καὶ  $\beta^\mu$  εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐπομένως ἀδύνατον νὰ διαιρῆ ὁ  $\beta^\mu$  τὸν  $\alpha^\mu$  καὶ νὰ δίδῃ πηλίκον ἀκεραίων  $A$ · ὥστε αἱ ῥίζαι τῶν ἀκεραίων οὐδέποτε εἶναι κλάσματα.

188. Ἡ μυστὴ ῥίζα ἀκεραίου εἶναι ἀκέραιος, ἂν πάντες οἱ ἐκθέται τῶν πρώτων ἀριθμῶν, ἐξ ὧν γίνεται, εἶναι πολλαπλάσια τοῦ  $\mu$ , καὶ τότε μόνον.

Διότι ἂν εἶναι  $\beta^\mu = x$ , ἦτοι  $\beta = \sqrt[\mu]{x}$ , οἱ δὲ ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι ἀκέραιοι, ἄς ἀναλυθῆ ὁ  $\beta$  εἰς τοὺς πρώτους αὐτοῦ παράγοντας καὶ ἔστω  $\beta = \theta^x \cdot \theta'^x \dots$

τότε θὰ εἶναι  $\beta^\mu = (\theta^x \cdot \theta'^x \dots)^\mu = \theta^{x\mu} \cdot \theta'^{x\mu} \dots$  (κατὰ τὸ ἐδ. 71)· ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ  $\beta^\mu = x$ , ἔπεται  $x = \theta^{x\mu} \cdot \theta'^{x\mu} \dots$

ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι πάντες οἱ ἐκθέται τῶν πρώτων ἀριθμῶν  $\theta, \theta' \dots$ , ἐξ ὧν γίνεται ὁ  $x$ , διαιροῦνται ὑπὸ τοῦ  $\mu$ .

Καὶ ἀντιστρόφως, ἂν εἶναι  $x = \theta^{x\mu} \cdot \theta'^{x\mu} \dots$

ἡ  $\mu$  ῥίζα τοῦ  $x$  θὰ εἶναι ὁ ἀκέραιος ἀριθμὸς  $\theta^x \cdot \theta'^x \dots$ · διότι οὗτος ὑψούμενος εἰς τὴν  $\mu$  δύνχμιν παράγει τὸν  $x$ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

189. Ἐν τῇ διαπλάσει τοῦ συστήματος τῶν ἀριθμῶν ὁδηγὸν εἶχομεν τὴν ἀρχὴν ὅτι, *ὅταν πρόκειται νὰ καταστήσωμέν τι γενικώτερον, πρέπει νὰ διατηρῶμεν τὰς ἀρχικὰς αὐτοῦ ιδιότητας.* Καὶ νῦν θέλοντες νὰ εὐρύνωμεν τὸν ὅρισμόν τῶν δυνάμεων ἐπὶ οἰωνδήποτε ἐκθετῶν, θέτομεν ὡς ὅρον τὴν διατήρησιν τῶν ἀρχικῶν αὐτῶν ιδιοτήτων, τὰς ὁποίας ἀποκαθιστῶμεν νόμους τῶν δυνάμεων.

$$\text{Ἐὰν ἡ ὑπὸ τῆς ἰσότητος} \quad \alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu+\nu} \quad (1)$$

ἐκφραζομένη ἀρχικῇ ιδιότητι τῶν δυνάμεων θέλωμεν νὰ ἰσχύη καὶ ὅταν οἱ ἐκθέται  $\mu$  καὶ  $\nu$  εἶναι οἰοιδήποτε σύμμετροι ἀριθμοί, ἀνάγκη νὰ ὀρίσωμεν καταλλήλως τὴν σημασίαν τῶν δυνάμεων, αἵτινες ἔχουσι ἐκθέτην κλασματικὸν ἢ ἀρνητικὸν ἀριθμόν.

**Δυνάμεις κλασματικὸν ἔχουσαι ἐκθέτην.**

190. Ἄν εἰς τὴν ἰσότητα (1), τὴν ὁποίαν θέλομεν νὰ διατηρήσωμεν ἀληθῆ ἐπὶ πασῶν τῶν δυνάμεων, ὑποτεθῆ  $\mu = \nu = \frac{1}{2}$ , προκύπτει

$$\frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\alpha^2} = \alpha,$$

ἐξ οὗ βλέπομεν ὅτι τὸ  $\alpha^{\frac{1}{2}}$  δέον νὰ ὀρισθῆ ὡς *τετραγωνικὴ ῥίζα τοῦ α*, διότι ἐφ' ἑαυτὸ πολλαπλασιασθὲν δίδει τὸν  $\alpha$ .

Ἰνα εὐρῶμεν τὴν σημασίαν τοῦ  $\alpha^{\circ}$  (τοῦ  $\rho$  ὄντος οἰοιδήποτε θετικοῦ ἀκεραίου), σχηματίζομεν τὸ γινόμενον τῶν  $\rho$  παραγόντων

$$\frac{1}{\alpha^{\circ}} \cdot \frac{1}{\alpha^{\circ}} \cdot \frac{1}{\alpha^{\circ}} \dots \frac{1}{\alpha^{\circ}}$$

ὅτε κατὰ τὴν αὐτὴν ἀρχικὴν ιδιότητα, ἣν διατηροῦμεν, εὐρίσκομεν αὐτὸ ἴσον τῷ  $\frac{1}{\alpha^{\rho}}$ , ἥτοι ἴσον τῷ  $\alpha^{-\rho}$ . ὥστε τὸ  $\alpha^{\rho}$  δέον νὰ ὀρισθῆ ὡς ἡ  $\rho$  ῥίζα τοῦ  $\alpha$ .

Κατὰ ταῦτα αἱ δύο παραστάσεις

$$\frac{1}{\alpha^{\rho}} \quad \text{καὶ} \quad \sqrt[\rho]{\alpha} \quad \text{σημαίνουσι τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.}$$

Παραδείγματα  $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}, \quad 8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2.$

Και γενικῶς  $\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}$  ( $\pi$  και  $\rho$  ὄντων οἰωνδήποτε θετικῶν ἀκεραίων) δεόν να ὀρισθῆ ὡς ἡ  $\rho$  ρίζα τοῦ  $\alpha^\pi$ · διότι πολλαπλασιαζόμενον  $\rho$  φορές ἐφ' ἑαυτὸ δίδει  $\alpha^\pi$ , ὡς ἐξῆς φαίνεται

$$\alpha^{\frac{\pi}{\rho}} \cdot \alpha^{\frac{\pi}{\rho}} \cdot \alpha^{\frac{\pi}{\rho}} \dots \alpha^{\frac{\pi}{\rho}} = \alpha^{\rho \cdot \frac{\pi}{\rho}} = \alpha^\pi.$$

Ἄλλὰ τὸ αὐτὸ  $\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}$  σημαίνει και τὴν  $\pi$  δύναμιν τῆς  $\rho$  ρίζης τοῦ  $\alpha$ · διότι προκύπτει, ἂν ἡ δύναμις  $\alpha^\rho$  πολλαπλασιασθῆ  $\pi$  φορές ἐφ' ἑαυτὴν, ὡς ἐξῆς φαίνεται

$$\frac{1}{\alpha^\rho} \cdot \frac{1}{\alpha^\rho} \dots \frac{1}{\alpha^\rho} = \frac{1}{\alpha^{\rho \cdot \pi}} = \frac{1}{\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}}$$

Ἐντεῦθεν συναγεται, ὅτι ἡ  $\pi$  δύναμις τῆς  $\rho$  ρίζης τοῦ  $\alpha$  πρέπει να εἶναι ἴση τῇ  $\rho$  ρίζῃ τῆς  $\pi$  δυνάμεως τοῦ  $\alpha$ · ἤτοι πρέπει να εἶναι

$$\left(\sqrt[\rho]{\alpha}\right)^\pi = \sqrt[\rho]{\alpha^\pi} = \alpha^{\frac{\pi}{\rho}} \quad (1)$$

$$\text{ἢ} \quad \left(\frac{1}{\alpha^\rho}\right)^\pi = \left(\frac{1}{\alpha^\pi}\right)^\rho = \frac{1}{\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}}$$

Ὅτι δὲ ἀληθῶς ἡ παράστασις  $\left(\sqrt[\rho]{\alpha}\right)^\pi$  ἰσοῦται τῇ  $\rho$  ρίζῃ τοῦ  $\alpha^\pi$ , ἤτοι τῇ  $\sqrt[\rho]{\alpha^\pi}$ , δεικνύεται ἀμέσως ἐκ τούτου, ὅτι ἡ  $\rho$  δύναμις αὐτῆς εἶναι εἶναι ἴση τῷ  $\alpha^\pi$ .

Και ὄντως ἡ παράστασις  $\left(\sqrt[\rho]{\alpha}\right)^\pi$  εἶναι γινόμενον  $\pi$  παραγόντων, ὧν ἕκαστος εἶναι ἴσος τῇ  $\sqrt[\rho]{\alpha}$ , ἐπομένως κατὰ τὴν τρίτην ιδιότητα τῶν δυνάμεων (71) ἡ  $\rho$  δύναμις αὐτῆς εὐρίσκεται, ἂν ὑψωθῆ ἕκαστος παράγων αὐτῆς εἰς τὴν  $\rho$  δύναμιν· ὅτε γίνεται  $\alpha$ · ὅθεν ἡ  $\rho$  δύναμις τοῦ γινομένου εἶναι ἐπίσης  $\alpha^\pi$ .

Παρατηρητέον ὅμως, ὅτι, ὅταν ὁ  $\rho$  εἶναι ἄρτιος (ὅτε ἐξ ἀνάγκης θὰ εἶναι ὁ  $\alpha$  θετικὸς ἀριθμὸς), τὸ μὲν δεύτερον μέλος τῆς ἰσότητος (1) ἔχει πάντοτε δύο τιμὰς ἀντιθέτους, τὸ δὲ πρῶτον ἔχει ἀμφοτέρως μὲν τὰς τιμὰς ταύτας, ἂν ὁ  $\pi$  εἶναι περιττός (διότι τὸ γινόμενον  $\left(\sqrt[\rho]{\alpha}\right)^\pi$  εἶναι τότε ὁμοειδὲς τῇ  $\sqrt[\rho]{\alpha}$ ), τὴν θετικὴν ὅμως μόνην, ἂν ὁ  $\pi$  εἶναι ἄρτιος·



ὥστε κατὰ τοῦτο ἡ ἰσότης (1) δὲν εἶναι τελεία· π.χ. ἡ  $\sqrt[4]{\alpha^2}$  ἔχει δύο ἀντιθέτους τιμὰς, ἐν ᾧ ἡ  $(\sqrt[4]{\alpha})^2$  ἔχει μόνον τὴν θετικὴν ἐξ αὐτῶν.

191. Ὁ κλασματικὸς ἐκθέτης δύναται πάντοτε νὰ ὑποθεθῆ ἀνάγωγος· καὶ ὄντως εἶναι ἡ δύναμις

$$\alpha^{\frac{\pi\nu}{\rho\nu}} \quad \text{ἴση τῇ} \quad \alpha^{\frac{\pi}{\rho}} \quad (2)$$

διότι ἀμφότεραι ὑψούμεναι εἰς τὴν  $\rho$  ν δύναμιν, γίνονται ἴσαι τῷ  $\alpha^{\pi}$ . ὑψοῦται δὲ ἡ δευτέρα εἰς τὴν  $\rho$  ν δύναμιν, ἂν ὑψωθῆ πρῶτον εἰς τὴν  $\rho$  καὶ ἔπειτα ὁ προκύπτων ἀριθμὸς ὑψωθῆ εἰς τὴν  $\nu$  δύναμιν (71).

Παρατηρητέον ὅμως, ὅτι, ἐὰν ὁ κοινὸς παράγων εἶναι ἄρτιος καὶ ὁ  $\rho$  περιττός, ἡ μὲν πρώτη δύναμις ἔχει δύο τιμὰς ἀντιθέτους, ἡ δὲ δευτέρα μίαν μόνον· ὥστε ἡ ἰσότης αὐτῶν δὲν εἶναι τελεία.

Διὰ νὰ εἶναι αἱ δύο ἰσότητες (1) καὶ (2) ἀληθεῖς ἄνευ ἐξαιρέσεως, θὰ ὑποθέσωμεν ἐν τοῖς ἐξῆς τὸν ἀριθμὸν  $\alpha$  πάντοτε θετικὸν καὶ ἐκ τῶν δύο ἀντιθέτων τιμῶν πάσης ρίζης ἀρτιοταγοῦς θὰ λαμβάνωμεν ὑπ' ὄψιν μόνον τὴν θετικὴν· τότε αἱ παραστάσεις

$$\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}, \quad \sqrt[\rho]{\alpha^{\pi}}, \quad \left(\sqrt[\rho]{\alpha}\right)^{\pi}$$

οἰωνδῆποτε ὄντων τῶν ἀκεραίων  $\pi$  καὶ  $\rho$  παριστῶσιν ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν πᾶσαι θετικὸν ἀριθμὸν.

Τὰς δὲ ρίζας τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν, ὅταν ὑπάρχωσιν, ἀνάγωμεν εἰς τὰς ὁμοταγεῖς ρίζας τῶν θετικῶν· διότι π.χ. εἶναι

$$\sqrt[3]{-8} = -\sqrt[3]{8} = -2, \quad \sqrt[5]{-16} = -\sqrt[5]{16},$$

$$(-4)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{(-4)^2} = 4^{\frac{2}{3}}$$

$$\alpha^{\frac{\pi\nu}{\rho\nu}} = \alpha^{\frac{\pi}{\rho}}$$

Ἐὰν τὴν ἰσότητα  $\alpha = \alpha$  γράψωμεν διὰ τῶν ριζῶν, βλέπομεν, ὅτι εἶναι

$$\sqrt[\rho]{\alpha^{\pi}} = \sqrt[\rho\nu]{\alpha^{\pi\nu}}$$

τουτέστι δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν δείκτην  $\rho$  τῆς ρίζης καὶ τὸν ἐκθέτην  $\pi$  τοῦ ὑπορρίζου ἐπὶ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν· τοῦτο δὲ οὐδὲως βλάπτει τὴν ρίζαν.

Παραδείγματα  $2^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$ ,  $25^{\frac{2}{4}} = 25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$   
 $8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4.$

**Δυνάμεις ἀρνητικῶν ἔχουσαι ἐκθέτην.**

192. Ἐὰν εἰς τὴν ἰσότητα  $a^{\mu} \cdot a^{\nu} = a^{\mu+\nu}$   
 ὑποθέσωμεν  $\nu = -\mu$ , εὐρίσκομεν

$$a^{\mu} \cdot a^{-\mu} = a^0 = 1.$$

Ἐντεῦθεν ἔπεται, ἂν ὁ  $a$  διαφέρῃ τοῦ 0,

$$a^{-\mu} = \frac{1}{a^{\mu}},$$

ἀνάγκη ἄρα νὰ δοθῇ διὰ τὰς δυνάμεις ταύτας ὁ ἐπόμενος ὀρισμός.

Πᾶσα ἀρνητικὴν ἐκθέτην ἔχουσα δύναμις παντὸς ἀριθμοῦ (πλὴν τοῦ 0) ἰσοῦται κλάσματι ἔχοντι ἀριθμητὴν μὲν τὴν μονάδα 1, παρονομαστὴν δὲ τὴν ἀντίθετον ἐκθέτην ἔχουσαν δύναμιν τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Κατὰ ταῦτα εἶναι

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8},$$

$$5^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{5^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$8^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{8^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\left(\sqrt[3]{8}\right)^2} = \frac{1}{4}.$$

Γενικῶς εἶναι (π καὶ ρ ὄντων θετικῶν ἀκεραίων)

$$a^{\frac{\pi}{\rho}} \left( \text{ἤτοι } \frac{1}{\frac{\pi}{\rho}} \right) = \sqrt[\rho]{a^{-\pi}}.$$

διότι ἀμφότερα ὑψούμενα εἰς τὴν ρ δύναμιν γίνονται  $a^{-\pi}$ .

ΣΗΜ. Τῆς μονάδος 1 πᾶσα δύναμις εἶναι πάλιν 1.

Διότι π. χ.  $1^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{1^2} = \sqrt[3]{1} = 1.$

\* Διατήρησις τῶν ἀρχικῶν ἰδιοτήτων τῶν δυνάμεων.

193. Ὑπολείπεται ἔτι νὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι οἱ εὐρεθέντες ὀρισμοὶ τῶν συμμέτρους ἐκθέτας ἐχουσῶν δυνάμεων εἶναι τοιοῦτοι, ὥστε διατηροῦνται καὶ ἐπ' αὐτῶν πᾶσαι αἱ ἀρχικαὶ ἰδιότητες τῶν δυνάμεων· τουτέστιν, ὅτι ἀληθεύουσιν αἱ τὰς ἰδιότητας ταύτας ἐκφράζουσιν ἰσότητες:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (1)$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n} \quad (2)$$

$$(a\beta)^m = a^m \cdot \beta^m \quad (3)$$

$$\left(\frac{a}{\beta}\right)^m = \frac{a^m}{\beta^m}, \quad (4)$$

καὶ ὅταν οἱ ἐκθέται  $\mu$  καὶ  $\nu$  εἶναι κλασματικοὶ ἀριθμοὶ (θετικοὶ ἢ ἀρνητικοί), ἦτοι τῆς μορφῆς  $\frac{\pi}{\rho}$  ( $=\mu$ ) καὶ  $\frac{\chi}{\tau}$  ( $=\nu$ ).

1) Τὴν ἰσότητα τῶν δύο παραστάσεων

$$\frac{\pi}{a^\rho} \cdot \frac{\chi}{a^\tau} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\pi}{a^\rho} + \frac{\chi}{a^\tau}$$

ἀποδεικνύομεν ὑποῦντες ἑκάτεραν εἰς τὴν δύναμιν  $\rho \cdot \tau$ .

Ἴνα τῶ ὄντι ὑψωθῇ ἡ πρώτη παράστασις εἰς τὴν δύναμιν  $\rho \cdot \tau$ , ἀρκεῖ (71) νὰ ὑψωθῇ ἑκάτερος τῶν παραγόντων αὐτῆς εἰς τὴν δύναμιν ταύτην  $\rho \cdot \tau$ .

Ἴνα δὲ ὑψωθῇ ὁ πρῶτος παράγων  $a^\rho$  εἰς τὴν δύναμιν  $\rho\tau$ , ἀρκεῖ νὰ ὑψωθῇ πρῶτον εἰς τὴν  $\rho$  (ὅτε γίνεται  $a^{\pi\rho}$ ) καὶ ἔπειτα εἰς τὴν  $\tau$ , ὅτε γίνε-

ται  $a^{\pi\rho\tau}$ . Ἴνα δὲ ὁ δεύτερος παράγων  $a^\tau$  ὑψωθῇ εἰς τὴν δύναμιν  $\rho\tau$ , ἀρκεῖ νὰ ὑψωθῇ πρῶτον εἰς τὴν  $\tau$  (ὅτε γίνεται  $a^{\chi\tau}$ ) καὶ ἔπειτα εἰς τὴν  $\rho$ , ὅτε γίνεται  $a^{\rho\chi\tau}$ . Ἐπομένως ἡ πρώτη παράστασις, ὑψωθείσα εἰς τὴν δύναμιν  $\rho\tau$ , γίνεται  $a^{\pi\rho\tau}$ .  $a^{\rho\chi\tau}$  ἢ  $a^{\pi\tau+\rho\tau}$ .

Ἄλλὰ καὶ ἡ δευτέρα παράστασις  $a^\rho + \frac{\chi}{a^\tau}$  ἢ  $\frac{\pi\tau+\rho\tau}{a^{\rho\tau}}$  ὑψωθείσα εἰς τὴν  $\rho\tau$  δύναμιν γίνεται  $a^{\pi\tau+\rho\tau}$ .

Ἐκ τούτων συνάγεται, ὅτι ἀμφότεραὶ αἱ συγκρινόμεναι παραστάσεις εἶναι ἴσαι μὲ τὴν  $\rho\tau$  ρίζαν τοῦ  $a^{\pi\tau+\rho\tau}$ . Ἄρα εἶναι καὶ πρὸς ἀλλήλας ἴσαι.

2) Ἴνα δείξωμεν, ὅτι αἱ δύο παραστάσεις

$$\left(\frac{\pi}{a^\rho}\right)^{\chi} \quad \text{καὶ} \quad a^{\frac{\pi \cdot \chi}{\tau}}$$

ὑποῦμεν πάλιν ἀμφοτέρως εἰς τὴν δύναμιν  $\rho\tau$ .

Καὶ ἡ μὲν δευτέρα ὑψουμένη ἀμέσως εἰς τὴν  $\rho\tau$  δύναμιν γίνεται  $\alpha^{\pi\kappa}$ , ἡ δὲ πρώτη, ἴνα ὑψωθῆ εἰς τὴν  $\rho\tau$  δύναμιν, ἀρκεῖ νὰ ὑψωθῆ πρῶτον εἰς τὴν δύναμιν  $\tau$ , ὅτε γίνεται  $\left(\frac{\pi}{\alpha^{\rho}}\right)^{\kappa}$  ἢ  $\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}$ .  $\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}$ . . .  $\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}$ , ἦτοι  $\alpha^{\frac{\pi\kappa}{\rho}}$ , ἔπειτα δὲ εἰς τὴν δύναμιν  $\rho$ , ὅτε γίνεται  $\alpha^{\pi\kappa}$ .

Ὡστε ἀμφότεραι αἱ παραβαλλόμεναι παραστάσεις εἶναι ἴσαι μὲ τὴν  $\rho\tau$  ῥίζαν τοῦ  $\alpha^{\pi\kappa}$ , ἀρα εἶναι καὶ πρὸς ἀλλήλας ἴσαι.

Ἐν τῇ ἀποδείξει ταύτῃ ὑπετέθη ὁ  $\kappa$  θετικὸς ἀριθμὸς· ἂν εἶναι ἀρνητικὸς, ἡ ἰσότης τῶν δύο παραστάσεων ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς ἰσότητος τῶν ἀντιστρόφων αὐτῶν.

3) Ἴνα δείξωμεν, ὅτι αἱ δύο παραστάσεις  $(\alpha\beta)^{\frac{\pi}{\rho}}$  καὶ  $\alpha^{\frac{\pi}{\rho}} \beta^{\frac{\pi}{\rho}}$  εἶναι ἴσαι, ὑψοῦμεν ἀμφοτέρους εἰς τὴν δύναμιν  $\rho$ , καὶ ἡ μὲν πρώτη γίνεται  $(\alpha\beta)^{\pi}$ , ἡ δὲ δευτέρα, ἐπειδὴ εἶναι γινόμενον, γίνεται  $\alpha^{\pi} \cdot \beta^{\pi}$ , ἦτοι  $(\alpha\beta)^{\pi}$ . Ὡστε ἀμφότεραι αἱ παραστάσεις αὗται εἶναι ἴσαι τῇ  $\rho$  ῥίζῃ τοῦ  $(\alpha\beta)^{\pi}$ .

4) Πρὸς ἀπόδειξιν τῆς ἰσότητος τῶν δύο παραστάσεων  $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\frac{\pi}{\rho}}$

καὶ  $\frac{\alpha^{\frac{\pi}{\rho}}}{\beta^{\frac{\pi}{\rho}}}$  ὑψοῦμεν ἀμφοτέρους εἰς τὴν  $\rho$  δύναμιν· τότε ἡ μὲν πρώτη γί-

νεται  $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\pi}$  ἢ  $\frac{\alpha^{\pi}}{\beta^{\pi}}$ , ἡ δὲ δευτέρα (κατὰ τὸ ἐδ. 71) γίνεται  $\frac{\alpha^{\pi}}{\beta^{\pi}}$ , ἐξ οὗ συνάγεται, ὅτι αἱ συγκρινόμεναι παραστάσεις εἶναι ἴσαι.

ΣΗΜ. Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς  $\rho\tau$  εἶναι ἄρτιος, ἐκάτερον τῶν μελῶν τῶν ἰσοτήτων (1) καὶ (2) ἔχει ἀνὰ δύο ἀντιθέτους τιμὰς, ἂν δὲ ὁ  $\rho\tau$  εἶναι περιττός, ἐκάτερον τῶν μελῶν ἔχει μίαν μόνην τιμὴν. Ὡσαύτως τῶν ἰσοτήτων (3) καὶ (4) ἔχει ἐκάτερον τῶν μελῶν δύο τιμὰς ἀντιθέτους, ἂν ὁ  $\rho$  εἶναι ἄρτιος, μίαν δὲ μόνην, ἂν περιττός.

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ.

**Πολλαπλασιασμός καὶ διαίρεσις τῶν ριζῶν.**

194. Ἐπειδὴ γινόμενον ὑφούται εἰς δύναμιν, ἂν ὑψωθῆ ἕκαστος τῶν παραγόντων αὐτοῦ εἰς τὴν αὐτὴν δύναμιν, ὑφούντες τὸ γινόμενον α.β.γ.

εἰς τὴν δύναμιν  $\frac{1}{v}$  εὐρίσκομεν  $(\alpha\beta\gamma)^{\frac{1}{v}} = \alpha^{\frac{1}{v}} \cdot \beta^{\frac{1}{v}} \cdot \gamma^{\frac{1}{v}}$

$$\eta \quad \sqrt[v]{\alpha\beta\gamma} = \sqrt[v]{\alpha} \cdot \sqrt[v]{\beta} \cdot \sqrt[v]{\gamma}$$

ἢ δὲ ἰσότης αὕτη ἐκφράζει τὸ θεώρημα:

Ἵνα πολλαπλασιάσωμεν ἰσοβαθμίους ρίζας, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰ ὑπόρριζα, καὶ τοῦ γινομένου νὰ ἐξαγάγωμεν τὴν ἰσοβάθμιον ρίζαν.

Παραδείγματος χάριν εἶναι  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$ .

Ἐὰν δὲ ὑψώσωμεν τὸ γινόμενον αβ εἰς τὴν δύναμιν  $\frac{1}{v}$ , εὐρίσκομεν

$$\left(\alpha^v \cdot \beta\right)^{\frac{1}{v}} = \alpha \beta^{\frac{1}{v}} \quad \eta \quad \sqrt[v]{\alpha^v \beta} = \alpha \sqrt[v]{\beta}$$

τουτέστιν, ἵνα πολλαπλασιάσωμεν ρίζαν ἐπὶ ἀριθμὸν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ ὑπόρριζον ἐπὶ τὴν ἰσοβάθμιον δύναμιν τοῦ ἀριθμοῦ τούτου.

Παραδείγματος χάριν εἶναι  $2 \sqrt{3} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{12}$ .

Ἡ αὕτη ἰσότης δύναται νὰ ἐκφρασθῆ καὶ ὡς ἑξῆς.

Δυνάμεθα νὰ ἐξαγάγωμεν παράγοντά τινα τοῦ ὑπορριζου ἐκτὸς τοῦ ριζικοῦ, ἐὰν προηγουμένως ἐξαγάγωμεν τὴν ρίζαν αὐτοῦ.

195. Ἐπειδὴ δὲ κλάσμα ὑφούται εἰς δύναμιν, ἂν ὑψωθῶσιν εἰς τὴν αὐτὴν δύναμιν ἀμφότεροι οἱ ὅροι αὐτοῦ, ἔπεται

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\frac{1}{v}} = \frac{\alpha^{\frac{1}{v}}}{\beta^{\frac{1}{v}}} \quad \eta \quad \sqrt[v]{\frac{\alpha}{\beta}} = \frac{\sqrt[v]{\alpha}}{\sqrt[v]{\beta}}$$

Τουτέστιν, ἵνα διαιρέσωμεν ρίζαν δι' ἄλλης ἰσοβαθμίου, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὰ ὑπόρριζα καὶ τοῦ πηλίκου νὰ ἐξαγάγωμεν τὴν ἰσοβάθμιον ρίζαν.

Παραδείγματος χάριν εἶναι  $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{4} = 2, \quad \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = 2$ .

Ἐξάγοντες τὴν νήν ρίζαν τοῦ πηλίκου  $\frac{\alpha}{\beta^v}$ , (ἤτοι ὑφούντες αὐτὸ εἰς

τὴν δύναμιν  $\frac{1}{\nu}$ ), εὐρίσκομεν

$$\sqrt[\nu]{\frac{\alpha}{\beta^\nu}} = \frac{\sqrt[\nu]{\alpha}}{\beta}$$

Τουτέστιν, ἵνα διαιρέσωμεν ῥίζαν δι' ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὸ ὑπόρριζον διὰ τῆς ἰσοβαθμίου δυνάμεως τοῦ ἀριθμοῦ τούτου.

Ἡ αὐτὴ δὲ ἰσότης δύναται καὶ ὡς ἐξῆς νὰ ἐκφρασθῇ.

Δυνάμεθα νὰ ἐξαγάγωμεν διαιρέτην τοῦ ὑπορριζίου ἐκτὸς τοῦ ριζικοῦ, ἐὰν προηγουμένως ἐξαγάγωμεν τὴν ῥίζαν αὐτοῦ.

Παραδείγματος χάριν εἶναι  $\frac{\sqrt{8}}{2} = \sqrt{\frac{8}{4}} = \sqrt{2}$

$$\frac{\sqrt{200}}{5} = \sqrt{\frac{200}{25}} = \sqrt{8}$$

196. Ῥίζαι διαφόρων βαθμῶν τρέπονται εἰς ἰσοβαθμίους, ὅπως καὶ κλάσματα μὴ ὁμώνυμα εἰς ὁμώνυμα· διότι ἐπιτρέπεται νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν δείκτην ἐκάστης ἐπὶ οἰονδήποτε ἀριθμὸν θέλωμεν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν καὶ τὸν ἐκθέτην τοῦ ὑπορριζίου ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Κατὰ ταῦτα αἱ ῥίζαι  $\sqrt[6]{\alpha}$ ,  $\sqrt[5]{\beta}$ ,  $\sqrt[4]{\gamma}$   
 $\sqrt[60]{\alpha^{10}}$ ,  $\sqrt[60]{\beta^{12}}$ ,  $\sqrt[60]{\gamma^{15}}$

γίνονται ἰσοβάθμιοι :

Ἐκ τούτων ἔπεται, ὅτι τὸ γινόμενον καὶ τὸ πηλίκον δύο οἰωνδήποτε ριζῶν ἀνάγεται πάντοτε εἰς μίαν ῥίζαν.

### Παρατηρήσεις

1) Πᾶν γινόμενον ὁσαδήποτε καὶ οἰαδήποτε ριζικὰ καὶ ἂν ἔχη, ἀνάγεται κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα εἰς μίαν ῥίζαν. Ἡ τοιαύτη ἀναγωγή εἶναι ὠφέλιμος, ὅταν πρόκειται νὰ ὑπολογισθῇ τὸ γινόμενον κατὰ τινὰ προσέγγισιν. Οὕτως ἀντὶ  $10\sqrt{5}$  καλὸν εἶναι νὰ γράφωμεν τότε  $\sqrt{500}$ · διότι ἐξάγοντες τὴν ῥίζαν τοῦ 500 κατὰ προσέγγισιν μονάδος, εὐρίσκομεν 22, ἐν ᾧ ἐκ τοῦ γινομένου  $10\sqrt{5}$ , ἂν ἐξαχθῇ ἡ ῥίζα τοῦ 5 ὁμοίως, προκύπτει μόνον 20· συμβαίνει δὲ τοῦτο, διότι τὸ λάθος, τὸ ἐπὶ τῆς ῥιζικῆς  $\sqrt{5}$  συμβαῖνον, εἶναι μὲν μικρότερον τῆς μονάδος, ἀλλὰ δεκαπλασιαζόμενον ὑπερβαίνει αὐτήν. Ὁμοίως ἀντὶ  $\sqrt{8} \cdot \sqrt{3}$  γραπτέον  $\sqrt{24}$ , κτλ. Δυνατὸν δὲ καὶ νὰ συμβῇ, ὥστε τὸ γινόμενον τῶν ριζῶν νὰ εὐρίσκηται ἀκριβῶς, ἀφοῦ τραπῇ εἰς μίαν ῥίζαν· οὕτω π. χ. εἶναι

$\sqrt{3} \cdot \sqrt{27} = \sqrt{81} = 9$ . ὁμοίως  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{32} = \sqrt{64} = 8$ .  
 τοῦτο δὲ δὲν θὰ ἐφαινέτο, ἂν ἐκάστη τῶν ριζῶν εὕρισκετο κατὰ προσέγγι-  
 σιν καὶ ἔπειτα ἐπολλαπλασιάζοντο.

2) Τὴν ἐξαγωγήν τῆς  $n$  ρίζης κλάσματος ἀνάγομεν εἰς τὴν ἐξαγωγήν  
 τῆς ρίζης ἀκεραίου, (ὅπερ ἀπλούστερον). εἰς πολλοὺς ἀπλοῦς ἀμφοτέρους  
 τοὺς ὄρους αὐτοῦ ἐπὶ ἀριθμὸν τοιοῦτον, ὥστε νὰ γίνῃ ὁ πα-  
 ρονομαστὴς τελεία  $n$  δύναμις. Οὕτω π. χ. εἶναι

$$\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sqrt[3]{\frac{2}{5}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 5 \cdot 5}{5^3}} = \frac{\sqrt[3]{50}}{5}$$

3) Ἐὰν ὁ παρονομαστὴς κλασματικῆς παραστάσεως ἔχη ριζικόν, δυ-  
 νάμεθα νὰ μεταβιβάσωμεν αὐτὸ εἰς τὸν ἀριθμητὴν, πολλαπλασιάζοντες  
 ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος ἐπὶ ἀρμοδίαν τινὰ παράστασιν.

Ἐστω ἡ παράστασις  $\frac{2\alpha\beta^2\gamma}{\sqrt{\delta}}$ .

εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους αὐτῆς πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ  $\sqrt{\delta}$ , γίνεται αὕτη

$$\frac{2\alpha\beta^2\gamma\sqrt{\delta}}{\sqrt{\delta} \cdot \sqrt{\delta}}, \quad \text{ἤτοι} \quad \frac{2\alpha\beta^2\gamma\sqrt{\delta}}{\delta}$$

Καὶ ὅταν ἡ παράστασις ἔχη παρονομαστὴν τῆς μορφῆς  $\alpha + \sqrt{\beta}$ ,  
 (ἐνθα  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι ρηταὶ παραστάσεις), ἀπαλλάσσεται ὁ παρονομαστὴς  
 ἀπὸ τοῦ ριζικοῦ, εἰς πολλοὺς ἀπλοῦς ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τῆς κλα-  
 σματικῆς παραστάσεως ἐπὶ  $\alpha - \sqrt{\beta}$ , διότι τότε γίνεται ὁ παρονομαστὴς  
 $(\alpha + \sqrt{\beta})(\alpha - \sqrt{\beta}) = \alpha^2 - (\sqrt{\beta})^2 = \alpha^2 - \beta$ . ἤτοι ρητός.

Ἡ μεταβίβασις αὕτη τῶν ριζῶν ἐκ τοῦ παρονομαστοῦ εἰς τὸν ἀριθ-  
 μητὴν πρέπει νὰ γίνηται πάντοτε, ὅταν ἔχωμεν νὰ ὑπολογίσωμεν κλά-  
 σμα τι κατὰ προσέγγισιν· διότι συμφέρει πολὺ περισσότερον νὰ ἔχωμεν  
 τὸν παρονομαστὴν ἀκριβῶς, τὸν δὲ ἀριθμητὴν μὲ προσέγγισιν ἢ νὰ ἔχω-  
 μεν τὸ ἐναντίον. Παραδείγματός χάριν, εἰς ἔχωμεν τὸ κλάσμα  $\frac{5}{\sqrt{12}}$

καὶ ἐξαγάγωμεν τὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν μονάδος, εὕρισκομεν  $\frac{5}{3}$ .

ἄλλ' ἂν γράψωμεν αὐτὸ ὡς ἐξῆς  $\frac{5\sqrt{12}}{12}$  ἢ  $\frac{\sqrt{300}}{12}$  καὶ ἐξαγάγωμεν τὴν ρί-  
 ζαν κατὰ προσέγγισιν μονάδος, εὕρισκομεν  $\frac{17}{12}$ , ὅπερ εἶναι πολὺ

πλησιέστερον εἰς τὸ ἀληθές.

**Ζητήματα πρὸς ἄσκησιν.**

1) Ἀποδείξει, ὅτι εἶναι

$$\sqrt{2} \sqrt{8} = 4, \quad \sqrt[3]{2} \sqrt[3]{4} = 2, \quad \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = 5,$$

$$\sqrt[3]{25} \sqrt[6]{25} = 5 \quad \sqrt{12} \sqrt{27} = 18,$$

$$2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{40}, \quad 5\sqrt{8} = \sqrt{200}, \quad 3\sqrt{2} = \sqrt{18}.$$

2) Εὐρεῖν τὸ γινόμενον τῶν δυνάμεων

$$\frac{1}{a^2}, \quad a^{\frac{2}{3}}, \quad \sqrt[6]{a^5} \quad (\text{Ἀπ. } a^2.)$$

3) Εὐρεῖν τὸ πηλίκον τῶν παραστάσεων

$$\sqrt{a} : \sqrt[5]{a^2} \quad (\text{Ἀπ. } \sqrt[10]{a}).$$

4) Εὐρεῖν τὸν κύβον τῆς παραστάσεως

$$\sqrt[5]{a^7} \quad (\text{Ἀπ. } a^{\frac{21}{5}} \text{ ἢ } a^4 \cdot \sqrt[5]{a}).$$

5) Τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγωνικῶν ριζῶν  $\sqrt{a} + \sqrt{b}$  τίθεται καὶ ὑπὸ τὴν ἐπομένην μορφήν  $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a+b+2\sqrt{ab}}$ .

διότι τὸ τετράγωνον τοῦ ἄθροισματος τῶν ριζῶν εἶναι  $(a+b) + 2\sqrt{ab}$ .

Ἐκ τούτου ἔπεται, ὅτι τὸ ἄθροισμα δύο τετραγωνικῶν ριζῶν τρέπεται εἰς μίαν μόνην ρίζαν, ἐν τῷ γινόμενον  $a \cdot b$  τῶν ὑπορριζῶν εἶναι τέλειον τετράγωνον. Οὕτως εὐρίσκεται

$$\begin{aligned} \sqrt{3} + \sqrt{27} &= \sqrt{48}, & \sqrt{5} + \sqrt{45} &= \sqrt{80}. \\ \sqrt{2} + \sqrt{8} &= \sqrt{18}, \end{aligned}$$

Ἐκ τῆς αὐτῆς ἰσότητος βλέπομεν, ὅτι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα παραστάσεως τῆς μορφῆς  $\gamma + \sqrt{\delta}$  δύναται ἐνίοτε νὰ τραπῆ εἰς ἄθροισμα δύο ριζῶν τετραγωνικῶν ἢ καὶ εἰς ὁμοίαν πρᾶξασιν. Οὕτως εἶναι

$$\begin{aligned} \sqrt{3+\sqrt{8}} &= 1 + \sqrt{2}, & \sqrt{\sqrt{5} + \sqrt{24}} &= \sqrt{2} + \sqrt{3}. \\ \sqrt{29+\sqrt{720}} &= 3 + 2\sqrt{5}, \end{aligned}$$

6) Ἀποδείξει, ὅτι εἶναι

$$\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b},$$

ὅταν  $a$  καὶ  $b$  εἶναι θετικοὶ ἀριθμοί· ὥστε ἡ τετραγ. ρίζα ἀθροίσματος δὲν εἶναι ἰση μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγωνικῶν ριζῶν τῶν μερῶν του.

7) Νὰ δειχθῆ ὅτι εἶναι

$$\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}} = 2-\sqrt{3}$$



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΡΙΖΗΣ  
ΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.

**Τετραγωνική ρίζα τῶν μονωνύμων.**

197. Ἡ τετραγωνική ρίζα παντὸς ἀκεραίου μονωνύμου, τουτέστιν ἡ δύνχμις  $\frac{1}{2}$  αὐτοῦ, ἐξάγεται κατὰ τοὺς νόμους τῶν δυνάμεων (193), ἐὰν ἐξαχθῇ ἡ ρίζα ἐκάστου παράγοντος.

Ἐπειδὴ δὲ ἕκαστος παράγων εἶναι δύναμις ἀριθμοῦ τινος, ἡ τετραγωνική ρίζα αὐτοῦ ἐξάγεται (193) διαιρουμένου τοῦ ἐκθέτου αὐτῆς διὰ τοῦ 2.

Κατὰ ταῦτα εἶναι

$$\sqrt{49\alpha^2\beta^2\gamma^8} = (49)^{\frac{1}{2}} \cdot (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (\beta^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (\gamma^8)^{\frac{1}{2}} = \pm 7\alpha\beta\gamma^4.$$

Κλασματικοῦ μονωνύμου ἡ ρίζα ἐξάγεται κατὰ τοὺς αὐτοὺς νόμους (193), ἐὰν ἐξαχθῇ ἡ ρίζα ἀμφοτέρων τῶν ὄρων αὐτοῦ.

Κατὰ ταῦτα εἶναι

$$\sqrt{\frac{25\alpha^2\beta^6\gamma^4}{36\delta^4}} = \left(\frac{25\alpha^2\beta^6\gamma^4}{36\delta^4}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{(25)^{\frac{1}{2}} (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} (\beta^6)^{\frac{1}{2}} (\gamma^4)^{\frac{1}{2}}}{(36)^{\frac{1}{2}} (\delta^4)^{\frac{1}{2}}} = \pm \frac{5\alpha\beta^3\gamma^2}{6\delta^2}.$$

Τὸ διπλοῦν σημεῖον  $\pm$  ἐγράφη πρὸ τῶν ἐξαγομένων, διότι ἡ τετραγωνική ρίζα, ὡς καὶ πᾶσιν ἀρτίου βαθμοῦ ρίζα, ἔχει δύο ἀντιθέτους τιμὰς καὶ δύναται ἐπομένως τὸ ἐξαγόμενον νὰ ληφθῇ καὶ θετικῶς καὶ ἀρνητικῶς.

Ἐὰν τινος τῶν παραγόντων δὲν ἐξάγηται ἡ ρίζα, ἀφίνομεν ἐπ' αὐτοῦ σσημειωμένην τὴν πρᾶξιν· ἢ, ἂν εἶναι δυνατόν, ἀναλύομεν αὐτὸν εἰς δύο οὕτως, ὥστε νὰ ἐξάγηται ἡ ρίζα τοῦ ἑτέρου τῶν παραγόντων.

Κατὰ ταῦτα εἶναι

$$\begin{aligned} \sqrt{5\alpha^2\beta^6\gamma^8} &= \sqrt{5 \cdot \alpha\beta^3 \cdot \gamma^4} \\ \sqrt{8\alpha^3\beta^4\gamma^6} &= \sqrt{8 \cdot \alpha^3 \cdot \beta^2\gamma^3} = \sqrt{2 \cdot 4 \cdot \alpha^2 \cdot \alpha \cdot \beta^2\gamma^3} = \\ &= 2\sqrt{2 \cdot \alpha \cdot \beta^2\gamma^3} = 2\alpha\beta^2\gamma^3\sqrt{2\alpha}. \end{aligned}$$

Ὅμοίως

$$\sqrt{\frac{4\alpha^2\beta^4\gamma^2}{\delta}} = \frac{2\alpha\beta^2\gamma}{\sqrt{\delta}}.$$

\* Τετραγωνική ρίζα τῶν πολυωνύμων.

198. Ἐξαγαγεῖν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν πολυωνύμου σημαίνει εὐρεῖν πολυώνυμον, οὗ τὸ τετράγωνον ἰσοῦται τῷ δοθέντι πολυωνύμῳ.

Ἡ μέθοδος, δι' ἧς εὐρίσκεται ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν πολυωνύμων (ὅταν ὑπάρχη), συνάγεται ἐκ τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ τετραγώνου αὐτῶν.

Τὸ τετράγωνον παντὸς πολυωνύμου ἀποτελεῖται ἐκ τῶν τετραγώνων τῶν ὄρων καὶ ἐκ τῶν διπλασίων τῶν γινομένων τῶν ὄρων ἀνὰ δύο λαμβανομένων.

Ἐστω τυχὸν πολυώνυμον, οὗ τοὺς ὄρους παριστῶμεν πρὸς συντομίαν ἕκαστον δι' ἐνὸς γράμματος

$$\alpha + \beta + \gamma + \dots + \kappa.$$

τὸ τετράγωνον αὐτοῦ  $(\alpha + \beta + \gamma + \dots + \kappa)(\alpha + \beta + \gamma + \dots + \kappa)$  εὐρίσκεται, ἐὰν ἕκαστος τῶν ὄρων αὐτοῦ πολλαπλασιασθῇ καὶ ἐφ' ἑαυτὸν καὶ ἐπὶ τοὺς ἄλλους πάντας καὶ προσθεῶσι τὰ γινόμενα.

Ἐκ τούτου γίνεται φανερόν, ὅτι ἐν τῷ γενομένῳ θὰ εὐρίσκωνται τὰ τετράγωνα τῶν ὄρων πάντων· ἀλλὰ καὶ τὸ γινόμενον δύο οἰωνδήποτε ὄρων θὰ εὐρίσκηται διπλοῦν· διότι τὸ γινόμενον  $\beta\alpha$ , ἵνα τοῦτο θεωρήσωμεν, θὰ προκύψῃ πρῶτον ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ ὄρου  $\beta$  ἐπὶ τὸ πολυώνυμον, καὶ δεύτερον ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ ὄρου  $\alpha$  ἐπὶ τὸ πολυώνυμον· ὥστε ἐν τῇ προσθέσει τῶν ὁμοίων ὄρων θὰ προκύψῃ  $2\alpha\beta$ · ἐπειδὴ δὲ ἄλλο εἶδος ὄρων δὲν ὑπάρχει ἐν τῷ γινομένῳ, συνάγεται ἡ πρότασις.

Κατὰ ταῦτα τὸ τετράγωνον τοῦ πολυωνύμου

$$\begin{aligned} & 4\chi^3 - 2\alpha\chi^2 + 5\alpha^2\chi - 2\alpha^3 \\ \text{εἶναι } & 16\chi^6 + 4\alpha^2\chi^4 + 25\alpha^4\chi^2 + 4\alpha^6 \\ & - 16\alpha\chi^5 + 40\alpha^2\chi^4 - 16\alpha^3\chi^3 \\ & - 20\alpha^3\chi^3 + 8\alpha^4\chi^2 \\ & - 20\alpha^5\chi \end{aligned}$$

ἢ μετὰ τὴν πρόσθεσιν τῶν ὁμοίων ὄρων

$$16\chi^6 - 16\alpha\chi^5 + 44\alpha^2\chi^4 - 36\alpha^3\chi^3 + 33\alpha^4\chi^2 - 20\alpha^5\chi + 4\alpha^6.$$

Ὅταν πολυώνυμον εἶναι διατεταγμένον κατὰ τὰς δυνάμεις ἐνὸς γράμματος, ὑπάρχουσι ἐν τῷ τετραγώνῳ αὐτοῦ τέσσαρες ὄροι μὴ δυνάμενοι νὰ ἀναχθῶσι μετ' οὐδενὸς ἄλλου· εἶναι δὲ οὗτοι οἱ δύο πρῶτοι καὶ οἱ δύο τελευταῖοι, ἐὰν τὸ τετράγωνον εἶναι καὶ αὐτὸ διατεταγμένον. Καὶ

όντως, ἂν πολυώνυμόν τι διαταχθῆ κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματος, ἔστω τοῦ  $\chi$ , καὶ παρασταθῶσι πρὸς συντομίαν οἱ ὄροι αὐτοῦ κατὰ σειρὰν διὰ τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \kappa, \lambda$ , τὸ τετράγωνον εἶναι

$$(\alpha + \beta + \gamma + \dots + \lambda). (\alpha + \beta + \gamma + \dots + \lambda).$$

ἐμάθομεν δὲ ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πολυωνύμων, ὅτι οἱ ὄροι  $\alpha^2$  καὶ  $\lambda^2$  (ὁ πρῶτος καὶ ὁ τελευταῖος) μετ' οὐδενὸς ἄλλου δύναται νὰ ἀνχθῶσιν· ἀλλὰ καὶ οἱ δύο ὄροι  $2\alpha\beta$  καὶ  $2\kappa\lambda$  (τὸ διπλοῦν γινόμενον τῶν δύο πρώτων καὶ τὸ διπλοῦν γινόμενον τῶν δύο τελευταίων) μένουσιν ἀνάγωγοι· διότι τὸ μὲν  $2\alpha\beta$  εἶναι γινόμενον δύο ὄρων τοῦ πολυωνύμου τὰς μεγίστας δυνάμεις τοῦ  $\chi$  ἐχόντων, καὶ θὰ περιέχη διὰ τοῦτο τὸ γράμμα  $\chi$  εἰς δύναμιν μεγαλύτεραν ἢ τὰ λοιπὰ γινόμενα  $\beta^2, 2\beta\gamma, 2\alpha\gamma$ , κτλ., ὁ δὲ  $2\kappa\lambda$  εἶναι γινόμενον δύο ὄρων τὰς ἐλαχίστας δυνάμεις τοῦ  $\chi$  ἐχόντων· καὶ ἐπομένως θὰ περιέχη τὸ  $\chi$  εἰς δύναμιν μικροτέραν ἢ πάντα τὰ λοιπὰ γινόμενα τῶν ὄρων ἀνὰ δύο λαμβανομένων.

199. Τούτων οὕτως ἐχόντων, εὐρίσκομεν τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν δοθέντος πολυωνύμου (ἐὰν ὑπάρχη) κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον

Ἐπιθέσωμεν τὸ δοθὲν πολυώνυμον τετράγωνον ἄλλου πολυωνύμου καὶ διατεταγμένον κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματος. ἔστω τοῦ  $\chi$ · παραστήσωμεν δὲ τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν ὁμοίως διατεταγμένην διὰ τοῦ πολυωνύμου

$$\alpha + \beta + \gamma + \dots + \kappa,$$

αὐτὸ δὲ τὸ δοθὲν διὰ τοῦ  $A + B + \Gamma + \dots + M$ .

Κατὰ τὰ προειρημένα ὁ πρῶτος ὄρος  $A$  τοῦ δοθέντος πολυωνύμου (ἐὰν εἶναι τετράγωνον τοῦ  $\alpha + \beta + \dots + \kappa$ ), θὰ εἶναι τὸ τετράγωνον τοῦ πρώτου ὄρου τῆς ῥίζης· ἐξάγοντες ἄρα τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν τοῦ πρώτου ὄρου τοῦ δοθέντος πολυωνύμου, θὰ εὕρωμεν τὸν πρῶτον ὄρον  $\alpha$  τῆς ῥίζης·

ἦτοι

$$\alpha = \sqrt{A}.$$

Καὶ ὁ δεύτερος ὄρος  $B$  τοῦ δοθέντος πολυωνύμου εἶναι, ὡς ἐμάθομεν, ἴσος τῷ διπλασίῳ γινόμενῳ τῶν δύο πρώτων ὄρων τῆς ῥίζης· ἦτοι τῷ  $2\alpha\beta$ · ἐὰν ἄρα διαιρέσωμεν τὸν  $B$  διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ εὐρεθέντος πρώτου ὄρου τῆς ῥίζης, ἦτοι διὰ τοῦ  $2\alpha$ , θὰ εὕρωμεν πηλίκον τὸν δεύτερον ὄρον τῆς ῥίζης· ἦτοι

$$\beta = \frac{B}{2\sqrt{A}}.$$

Μετὰ τὴν εὐρεσιν τῶν δύο πρώτων ὄρων,  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , τῆς ῥίζης,

ἐπειδὴ εἰξεύρομεν, ὅτι τὸ δοθὲν πολυώνυμον πρέπει νὰ περιέχη τὸ τετράγωνον τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν  $\alpha + \beta$ , ἤτοι τοὺς τρεῖς ὅρους  $\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$ , ἀφαιροῦμεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ πολυωνύμου· τοῦτο δὲ γίνεται ὡς ἐξῆς· ἐπειδὴ ὁ  $\alpha^2$  εἶναι αὐτὸς ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ πολυωνύμου, διαγράφομεν αὐτὸν καὶ ἐκ τοῦ ὑπολειπομένου πολυωνύμου ἀφαιροῦμεν τοὺς δύο ὅρους  $2\alpha\beta + \beta^2$ , ἤτοι τὸ γινόμενον  $\beta(2\alpha + \beta)$ , ὅπερ εὐρίσκομεν προσθέτοντες τὸν δεύτερον ὅρον εἰς τὸ διπλάσιον τοῦ πρώτου καὶ πολλαπλασιάζοντες τὸ προκύπτον ἀθροισμα  $2\alpha + \beta$  ἐπὶ τὸν δεύτερον ὅρον  $\beta$ .

Τὸ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ τετραγώνου  $(\alpha + \beta)^2$  ἀπὸ τοῦ δοθέντος πολυωνύμου προκύπτον ὑπόλοιπον  $\Pi'$  πρέπει νὰ περιέχη, καθ' ἃ ἐμάθομεν, τὰ διπλάσια γινόμενα τῶν εὑρεθέντων ὄρων  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ἐπὶ τὸν τρίτον καὶ τὸ τετράγωνον τοῦ τρίτου κτλ., ἤτοι τοὺς ὅρους

$$2\alpha\gamma + 2\beta\gamma + \gamma^2 + \dots$$

ἀλλὰ μεταξὺ τῶν ὄρων τούτων ὁ πρῶτος  $2\alpha\gamma$  περιέχει τὸ γράμμα τῆς διατάξεως μετὰ τοῦ μεγίστου ἐκθέτου, ἐπομένως ὁ ὅρος οὗτος τοῦ ὑπολοίπου δὲν ἠδυνήθη νὰ ἀναχθῆ μετ' οὐδενὸς τῶν ἐπομένων καὶ εἶναι διὰ τοῦτο ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ ὑπολοίπου· ἐὰν ἄρα διαιρέσωμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ ὑπολοίπου  $\Pi'$  διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ πρώτου ὄρου τῆς ρίζης, θὰ εὐρωμεν πηλίκον τὸν τρίτον ὅρον τῆς ρίζης.

Μετὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ τρίτου ὄρου  $\gamma$ , ἐπειδὴ εἰξεύρομεν, ὅτι τὸ δοθὲν πολυώνυμον  $\Pi$  πρέπει νὰ περιέχη τὸ τετράγωνον τοῦ ἀθροίσματος  $(\alpha + \beta + \gamma)$ , ἤτοι τὸ  $(\alpha + \beta)^2 + 2\gamma(\alpha + \beta) + \gamma^2$ , ἀφαιροῦμεν τοὺς ὅρους τούτους ἀπὸ τοῦ δοθέντος πολυωνύμου· τοῦτο δὲ γίνεται ὡς ἐξῆς· τὸ μὲν τετράγωνον  $(\alpha + \beta)^2$  ἀφηρέσαμεν ἤδη (καὶ εὐρωμεν ὑπόλοιπον τὸ  $\Pi'$ )· ὥστε μένει ἐκ τοῦ ὑπολοίπου  $\Pi'$  νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ  $2(\alpha + \beta)\gamma + \gamma^2$ · τοῦτο δὲ εὐρίσκομεν προσθέτοντες τὸν εὐρισκόμενον τρίτον ὅρον  $\gamma$  εἰς τὸ διπλάσιον τῶν ἤδη εὑρεθέντων καὶ πολλαπλασιάζοντες τὸ ἀθροισμα  $2\alpha + 2\beta + \gamma$  ἐπὶ τὸν τρίτον ὅρον  $\gamma$ .

Μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ τετραγώνου  $(\alpha + \beta + \gamma)^2$  τῶν τριῶν πρώτων ὄρων τῆς ρίζης ἀπὸ τοῦ δοθέντος πολυωνύμου, ὑπολείπεται ὑπόλοιπόν τι  $\Pi''$ , ἐκ τοῦ ὁποίου εὐρίσκομεν τὸν τέταρτον ὅρον τῆς ρίζης διαιροῦντες τὸν πρῶτον ὅρον αὐτοῦ διὰ τοῦ  $2\alpha$ .

Ἐξακολουθοῦντες οὕτως, εὐρίσκομεν πάντας τοὺς ὅρους τῆς ρίζης· ἢ δὲ πράξις περατοῦται, ὅταν φθάσωμεν εἰς ὑπόλοιπον  $O$ .

Ἡ διάταξις τῆς πράξεως φαίνεται ἐκ τοῦ ἐπομένου παραδείγματος.

$25x^4 - 10\alpha^3\beta + 21\alpha^2\beta^2 - 4\alpha\beta^3 + 4\beta^4$	$5\alpha^2 - \alpha\beta + 2\beta^2$
$-25x^4$	$10x^2$
$-10\alpha^3\beta + 21\alpha^2\beta^2 - 4\alpha\beta^3 + 4\beta^4$	$10x^2 - \alpha\beta$
$10\alpha^3\beta - \alpha^2\beta^2$	$-\alpha\beta$
$20\alpha^2\beta^2 - 4\alpha\beta^3 + 4\beta^4$	$-10\alpha^3\beta + \alpha^2\beta^2$
$-20\alpha^2\beta^2 + 4\alpha\beta^3 - 4\beta^4$	$10x^2 - 2x\beta + 2\beta^2$
0	$+2\beta^2$
	$20\alpha^2\beta^2 - 4\alpha\beta^3 + 4\beta^4$

Ἐξάγοντες τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ πρώτου ὅρου ἐλάβομεν αὐτὴν μετὰ τοῦ σημείου +· ἀλλ' ἠδυνάμεθα νὰ λάβωμεν αὐτὴν καὶ μετὰ τοῦ σημείου —· τότε θὰ εὐρίσκομεν τοὺς αὐτοὺς ὅρους ἐν τῇ ρίζῃ, ἀλλὰ πάντας μετὰ σημείου ἀντιθέτου· ὑπάρχουσιν ἐπομένως δύο πολυώνυμα ἀντίθετα, ὧν τετραγώνον εἶναι τὸ δοθέν. Γνωστὸν δὲ καὶ ἐκ τῶν προηγουμένων, ὅτι πᾶσα τετραγωνικὴ ρίζα ἔχει δύο ἀντιθέτους τιμὰς.

200. Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγεται ὁ ἐξῆς κανὼν.

Ἵνα ἐξαγάγωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν πολυωνύμου, διατάσσομεν αὐτὸ κατὰ τὰς δυνάμεις ἐνὸς γράμματος.

Ἐξάγομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ πολυωνύμου, καὶ τὴν ρίζαν ταύτην γράφομεν πρῶτον ὅρου τῆς ῥίζης τοῦ πολυωνύμου.

Διαγράφομεν τὸν πρῶτον ὅρον ἐκ τοῦ πολυωνύμου καὶ διαιροῦμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ ὑπολοίπου διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ πρώτου ὅρου τῆς ῥίζης· τὸ πηλίκον εἶναι ὁ δεῦτερος ὅρος τῆς ῥίζης.

Γράφομεν τὸ διπλάσιον τοῦ πρώτου ὅρου τῆς ῥίζης καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ τὸν δεῦτερον καὶ πολλαπλασιάζομεν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν ἐπὶ τὸν δεῦτερον ὅρον· τὸ δὲ προκύπτον γινόμενον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ πρώτου υπολοίπου· ὅτε εὐρίσκομεν δευτέρον τι ὑπόλοιπον.

Διαιροῦμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ ὑπολοίπου τούτου διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ πρώτου ὅρου τῆς ῥίζης· καὶ τὸ πηλίκον εἶναι ὁ τρίτος ὅρος τῆς ῥίζης τοῦ πολυωνύμου.

Γράφομεν τὸ διπλάσιον τῶν δύο πρώτων ὅρων τῆς ῥίζης καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτῶν τὸν εὐρεθέντα τρίτον ὅρον καὶ πολλαπλασιάζομεν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν ἐπ' αὐτὸν τὸν τρίτον ὅρον, τὸ δὲ γινόμενον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ δευτέρου υπολοίπου, ὅτε προκύπτει τρίτον τι ὑπόλοιπον, καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς· λαμβάνει δὲ ἡ προᾶξις πέρας, ὅταν φθάσωμεν εἰς ὑπόλοιπον 0.

ΣΗΜ. Α'. Ἐκ τῶν προηγουμένων συμπεραίνεται, ὅτι δοθέν πολυώ-  
 νυμον δὲν εἶναι τετράγωνον ἄλλου κατὰ τὰς ἐπομένους περιπτώσεις·

α') Ἐὰν εἶναι διώνυμον· διότι παντός μὲν μονωνύμου τὸ τετράγω-  
 νον εἶναι πάλιν μονώνυμον, παντός δὲ διωνύμου εἶναι τριώνυμον.

β') Ὅταν μετὰ τὴν διάταξιν πρὸς οἰονδήποτε γράμμα ὁ πρῶτος καὶ  
 ὁ τελευταῖος ὅρος δὲν εἶναι τέλεια τετράγωνα· τοῦτο συμβαίνει πάν-  
 τως, ὅταν οἱ ἐκθέται τῶν ὄρων τούτων (οἷτινες εἶναι ὁ μέγιστος καὶ ὁ  
 ἐλάχιστος ἐκθέτης τοῦ πολυωνύμου) δὲν εἶναι ἀμφοτέροι ἄρτιοι.

γ') Ὅταν τινὸς τῶν ὑπολοίπων ὁ πρῶτος ὅρος δὲν εἶναι διαιρετὸς  
 διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ πρώτου ὄρου τῆς ρίζης.

ΣΗΜ. Β'. Ἐὰν εἰξεύρωμεν, ὅτι ἡ ρίζα δοθέντος πολυωνύμου δὲν ἔχει  
 περισσοτέρους τῶν τεσσάρων ὄρων, εὐρίσκομεν αὐτοὺς ἀμέσως· διότι τὸν  
 μὲν πρῶτον καὶ τὸν τελευταῖον εὐρίσκομεν ἐξάγοντες τὰς τετραγωνικὰς  
 ρίζας τῶν ἄκρων ὄρων τοῦ πολυωνύμου (διατεταγμένου)· τὸν δὲ δεύτε-  
 ρον (ἐὰν ὑπάρχη) εὐρίσκομεν διαιροῦντες τὸν δεύτερον ὄρον τοῦ πολυωνύ-  
 μου διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ πρώτου ὄρου τῆς ρίζης· τὸν δὲ τρίτον (ἐὰν  
 ὑπάρχη) διαιροῦντες τὸν προτελευταῖον ὄρον τοῦ πολυωνύμου διὰ τοῦ  
 διπλασίου τοῦ τελευταίου ὄρου τῆς ρίζης. Συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅταν ὁ  
 βῆμας τοῦ δοθέντος πολυωνύμου πρὸς τὸ γράμμα τῆς διατάξεως δὲν  
 ὑπερβαίνει τὸν 6ον, διότι τότε ἡ ρίζα αὐτοῦ δὲν δύναται νὰ ἔχη ὄρους  
 περισσοτέρους τῶν τεσσάρων, ἤτοι τοὺς ἔχοντας τὰς δυνάμεις  $\chi^3, \chi^2\chi,$   
 καὶ ὄρον μὴ ἔχοντα τὸν  $\chi$ .

Ἐστω ὡς παράδειγμα τὸ πολυώνυμον

$$\chi^6 - 4\chi^4 + 10\chi^3 + 4\chi^2 - 20\chi + 25$$

αἱ ρίζαι τῶν ἄκρων ὄρων εἶναι  $\chi^3$  καὶ  $\pm 5$ · (διότι δυνάμεθα νὰ λαμβάνωμεν  
 τὸν πρῶτον ὄρον τῆς ρίζης πάντοτε θετικόν)· ἐὰν δὲ διαιρέσωμεν τὸν δεύ-  
 τερον ὄρον τοῦ πολυωνύμου διὰ τοῦ  $2\chi^3$ , βλέπομεν, ὅτι ἡ ρίζα θὰ ἔχη  
 τὸν ὄρον  $-2\chi$ · τὸν αὐτὸν δὲ ὄρον εὐρίσκομεν καὶ διαιροῦντες τὸν προ-  
 τελευταῖον ὄρον τοῦ πολυωνύμου διὰ τοῦ 10· ὅθεν ἡ τετραγωνικὴ ρίζα  
 τοῦ δοθέντος πολυωνύμου (ἐὰν τοῦτο εἶναι τέλειον τετράγωνον) δὲν  
 δύναται νὰ ἔχη ἄλλους ὄρους ἢ τοὺς ἐξῆς

$$\chi^3 - 2\chi + 5\epsilon, \quad \epsilon \text{ εἶναι ἢ } 1, \text{ ἢ } -1.$$

Ἰψοῦντες τὸ τριώνυμον τοῦτο εἰς τὸ τετράγωνον, βλέπομεν, ὅτι  
 (ἂν ὑποτεθῇ  $\epsilon = +1$ ) ὄντως εἶναι ρίζα τοῦ δοθέντος πολυωνύμου.

Ἐστω δεύτερον τὸ πολυώνυμον

$$\chi^6 - 8\chi^5 + 4\chi^4 - 10\chi^3 + 15\chi^2 - 8\chi + 1$$

κατὰ τὰ εἰρημένα ἢ ρίζα, ἂν ὑπάρχη, ἀποτελεῖται ὑπὸ τῶν ὄρων  
 $\chi^3 - 4\chi^2 - 4\chi\epsilon + \epsilon$ , ἔνθα  $\epsilon$  εἶναι ἢ 1, ἢ -1.

Ἐπειδὴ ὁμοίως τὸ τετράγωνον τοῦ πολυωνύμου τούτου εἶναι διάφορον τοῦ δοθέντος πολυωνύμου, (εἴτε  $\epsilon = +1$ , εἴτε  $\epsilon = -1$  ὑποθέσωμεν), ἔπεται, ὅτι τὸ δοθὲν πολυώνυμον οὐδενὸς πολυωνύμου εἶναι τετράγωνον.

ΣΗΜ. Γ'. Ἐνίοτε ἀναλύεται τὸ δοθὲν πολυώνυμον εἰς δύο παράγοντας, ἐξ ὧν ὁ εἰς εἶναι τετράγωνον ἄλλου πολυωνύμου.

Τοιοῦτον εἶναι τὸ πολυώνυμον

$$2\chi^5 - 12\chi^4 + 22\chi^3 - 12\chi^2 + 2\chi,$$

ὅπερ γράφεται ὡς ἐξῆς

$$2\chi(\chi^4 - 6\chi^3 + 11\chi^2 - 6\chi + 1)$$

ἢ

$$2\chi(\chi^2 - 3\chi + 1)^2.$$

καὶ ἐπομένως ἡ ρίζα αὐτοῦ δύναται νὰ γραφῆ ὡς ἔπεται

$$(\chi^2 - 3\chi + 1)\sqrt{2\chi}.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Ἰδιότητες τῶν ἐξισώσεων.

201. ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐὰν ἀμφότερα τὰ μέλη ἐξισώσεως ὑψωθῶσιν εἰς τὸ τετράγωνον, ἢ προκύπτουσα ἐξίσωσις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς δύο ἐξισώσεις· εἶναι δὲ αὗται ἡ ἀρχικὴ ἐξίσωσις καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς προερχομένη, ὅταν τὸ σημεῖον τοῦ ἑνὸς μέλους αὐτῆς ἀλλαχθῇ.

Λέγω δὲ μίαν ἐξίσωσιν ἰσοδύναμον πρὸς δύο ἄλλας, ὅταν πᾶσα λύσις αὐτῆς εἶναι λύσις καὶ τῆς ἐτέρας τῶν δύο ἄλλων· καὶ ἀνάπαλιν, πᾶσα λύσις τῆς ἐτέρας τῶν δύο τούτων εἶναι λύσις καὶ τῆς πρώτης.

Ἐστω τυχοῦσα ἐξίσωσις  $\alpha = \beta$ , τῆς ὁποίας τὰ μέλη παριστῶμεν πρὸς συντομίαν ἕκαστον δι' ἑνὸς γράμματος· λέγω, ὅτι ἡ ἐξίσωσις  $\alpha^2 = \beta^2$  εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὰς  $\alpha = \beta$  καὶ  $\alpha = -\beta$ .

Τουτέστι πᾶσα λύσις τῆς πρώτης θὰ εἶναι λύσις τῆς μιᾶς ἐκ τῶν δύο δευτέρων καὶ πᾶσα λύσις τῆς μιᾶς ἐκ τῶν δύο δευτέρων θὰ εἶναι λύσις καὶ τῆς πρώτης.

Διότι, ἂν ἀληθεύσῃ ποτὲ ἡ ἐξίσωσις  $\alpha^2 = \beta^2$ , ἤτοι ἂν τὰ μέλη αὐτῆς  $\alpha^2$  καὶ  $\beta^2$  γίνωσιν ἴσοι ἀριθμοί, ἐπειδὴ τῶν ἴσων ἀριθμῶν αἱ τετραγωνικαὶ ρίζαι εἶναι ἢ ἴσαι ἢ ἀντίθετοι, θὰ εἶναι ἢ  $\alpha = \beta$ , ἢ  $\alpha = -\beta$ . ἤτοι θὰ ἀληθεύῃ καὶ μία ἐκ τῶν εἰρημένων δύο ἐξισώσεων· ἐὰν δὲ πάλιν ἀληθεύσῃ ἡ μία ἐκ τῶν ἐξισώσεων  $\alpha = \beta$ , ἢ  $\alpha = -\beta$ , ἤτοι ἂν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  γίνωσιν ἴσοι ἢ ἀντίθετοι ἀριθμοί, τὰ τετράγωνα αὐτῶν  $\alpha^2$  καὶ  $\beta^2$  θὰ γίνωσιν ἴσα· καὶ ἐπομένως θὰ ἀληθεύσῃ καὶ ἡ ἐξίσωσις  $\alpha^2 = \beta^2$ .

Τὸ αὐτὸ θεώρημα δύναται καὶ ὡς ἐξῆς νὰ ἐκφρασθῇ.

Ἐὰν ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν μελῶν ἐξισώσεως ἐξαχθῇ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα, ληφθῇ δὲ ἡ ρίζα τοῦ ἑτέρου τῶν μελῶν καὶ μετὰ τοῦ + καὶ μετὰ τοῦ -, αἱ οὕτω προκύπτουσαι δύο ἐξισώσεις εἶναι ἰσοδύναμοι πρὸς τὴν δεδομένην.

Ἦτοι ἡ ἐξίσωσις  $\alpha = \beta$  εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὰς δύο

$$\sqrt{\alpha} = \sqrt{\beta} \quad \text{καὶ} \quad \sqrt{\alpha} = -\sqrt{\beta},$$

διότι προκύπτει ἐξ ἑκατέρας αὐτῶν, ἐὰν ἀμφότερα τὰ μέλη αὐτῆς τετραγωνισθῶσιν.



**Γενική μορφή πάσης εξίσωσεως τοῦ δευτέρου βαθμοῦ, ἣτις ἔχει ἓνα ἄγνωστον.**

202. Πᾶσα εξίσωσις τοῦ δευτέρου βαθμοῦ, ἓνα ἔχουσα ἄγνωστον, δύναται νὰ ἀχθῆ εἰς τὴν μορφήν

$$αχ^2 + βχ = γ. \quad (1)$$

γίνεται δὲ τοῦτο, ἀφοῦ ἐξαλειφθῶσιν οἱ παρονομασταί, ἐκτελεσθῶσιν αἱ σσημειωμέναι πράξεις, χωρισθῶσιν οἱ γνωστοὶ ὅροι ἀπὸ τῶν λοιπῶν καὶ ἀναχθῶσιν εἰς ἓνα ὅρον πάντες οἱ περιέχοντες τὸ  $χ^2$ , ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ περιέχοντες τὸ  $χ$ . τοῦτ' ἔστιν, ἀφοῦ ἐφχρυσθῶσιν ἐπὶ τῆς εξίσωσεως αἱ πράξεις τοῦ ἔδαφ. 105.

Ὁ συντελεστής  $α$  δὲν δύναται νὰ εἶναι 0· διότι τότε ἡ εξίσωσις καταντᾶ πρώτου βαθμοῦ· ἐπομένως ἡ εξίσωσις ἀνάγεται καὶ εἰς τὴν μορφήν

$$χ^2 + \frac{β}{α} χ = \frac{γ}{α}. \quad (2)$$

Ἐπειδὴ δὲ τὰ πηλίκα  $\frac{β}{α}$  καὶ  $\frac{γ}{α}$  εἶναι γνωστοὶ ἀριθμοὶ ἢ γνωσταὶ παραστάσεις, ἐὰν παραστήσωμεν τὸ μὲν πρῶτον διὰ τοῦ  $π$ , τὸ δὲ δεύτερον διὰ τοῦ  $κ$ , δυνάμεθα νὰ γράψωμεν τὴν εξίσωσιν (2) ὡς ἔπεται

$$χ^2 + πχ = κ. \quad (3)$$

Ἐὰν ὁ συντελεστής  $π$  εἶναι 0, ἡ εξίσωσις καταντᾶ

$$χ^2 = κ.$$

Ἐὰν δὲ ὁ γνωστός ὅρος  $κ$  εἶναι 0, ἡ εξίσωσις γίνεται

$$χ^2 + πχ = 0.$$

Τὰς δύο ταύτας μερικὰς εξισώσεις θὰ θεωρήσωμεν πρὸ τῆς γενικῆς.

**Λύσεις τῆς εξίσωσεως  $χ^2 = κ$ .**

203. Διὰ τῆς εξίσωσεως ταύτης ζητεῖται ἀριθμὸς, οὗ τὸ τετράγωνον νὰ εἶναι ἴσον τῷ δοθέντι ἀριθμῷ  $κ$ · καὶ ἂν μὲν ὁ  $κ$  εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς, οὐδενὸς ἀριθμοῦ, ἐξ ὧτων ἔχομεν, εἶναι τετράγωνον (σελ. 126), καὶ ἐπομένως ἡ εξίσωσις οὐδεμίαν ἔχει λύσιν ἐν τῷ παρόντι τῶν ἀριθμῶν συστήματι· ἂν δὲ ὁ  $κ$  εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς, ἐμάθομεν, ὅτι εἶναι τετράγωνον δύο ἀντιθέτων ἀριθμῶν, οὔτινες παρίστανται γενικῶς διὰ τῶν συμβόλων  $\sqrt{κ}$  καὶ  $-\sqrt{κ}$ . ὥστε, ἵνα λυθῆ ἡ εξίσωσις, πρέπει νὰ ληθῆ ὁ  $χ$  ἴσος τῷ ἑτέρῳ τῶν ἀριθμῶν τούτων· ἦτοι

$$\eta \quad χ = +\sqrt{κ}, \quad \eta \quad χ = -\sqrt{κ}.$$

Εὐρίσκομεν δὲ τὰς δύο ταύτας εξισώσεις καὶ ἀμέσως ἐκ τῆς δοθεί-

σης, ἐὰν ἐξαγάγωμεν τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν ἀμφοτέρων τῶν μελῶν αὐτῆς.

204. Ἴνα ἡ λύσις τῆς δευτεροβαθμίου ἐξίσωσης

$$x^2 = x$$

καταστῆ πάντοτε δυνατὴ, εἶναι ἀνάγκη νὰ πλάσωμεν καὶ παραδεχθῶμεν νέον τινὰ ἀριθμὸν καὶ τοιοῦτον, ὥστε τὸ τετράγωνον αὐτοῦ νὰ εἶναι —1. Τὸν ἀριθμὸν τοῦτον, ὄντινα παριστῶμεν διὰ τοῦ  $i$ , θεωροῦμεν ὡς νέαν μονάδα καὶ εἰσάγομεν αὐτὴν εἰς τὸ σύστημα τῶν ἀριθμῶν, μετ' αὐτῆς δὲ καὶ τὴν ἀντίθετον αὐτῆς —  $i$  καὶ πάντα τὰ πολλαπλάσια καὶ τὰ πολλοστὰ ἀμφοτέρων. Οὕτω προκύπτει σύστημα εὐρύτερον, τοῦ ὁποίου οἱ ἀριθμοὶ γίνονται πάντες ἐκ τῶν τεσσάρων μονάδων 1, —1,  $i$  καὶ —  $i$  καὶ ἐκ τῶν μερῶν αὐτῶν. Λέγονται δὲ αἱ μὲν νέαι μονάδες  $i$  καὶ —  $i$  φαντασικαί, καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν ἀποτελούμενοι ἀριθμοί, φαντασικοί· αἱ δὲ παλαιαὶ 1 καὶ —1 πρὸς διάκρισιν λέγονται πραγματικαί· καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν ἀριθμοί, πραγματικοί. Οἱ δὲ ἐκ φαντασικῶν καὶ ἐκ πραγματικῶν συγκροτούμενοι λέγονται μιγάδες· ὡς  $4 + 2i$ , —  $3 + 4i$  κτλ. Ἀποδεικνύεται δὲ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ μαθηματικῇ, ὅτι καὶ ἐν τῷ γενικωτέρῳ τούτῳ συστήματι διατηροῦνται ἀμετάβλητοι αἱ ἀρχικαὶ ιδιότητες τῶν πράξεων (ἐπομένως καὶ σύμπας ὁ ἀλγεβρικός λογισμὸς) καὶ ὅτι πᾶσα ἐξίσωσις  $\mu$  βαθμοῦ ἔχει  $\mu$  ῥίζας ἐν αὐτῷ· ἀλλ' ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ εὐρυνθῇ περισσότερο χωρὶς νὰ παύσωσιν ὑπάρχουσαι αἱ ῥηθεῖσαι ιδιότητες.

205. Μετὰ τὴν παραδοχὴν τῶν φανταστικῶν ἀριθμῶν πᾶσα ἐξίσωσις τῆς μορφῆς  $x^2 = x$  λύεται, καὶ ὅταν εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς ὁ  $x$  ἦτοι ὑπάρχουσι καὶ τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν αἱ τετραγωνικαὶ ῥίζαι· διότι αἱ φανταστικαὶ μονάδες  $i$  καὶ —  $i$  εἶναι αἱ τετραγωνικαὶ ῥίζαι τοῦ —1.

Ἐστω παραδείγματος χάριν ἡ ἐξίσωσις

$$x^2 = -5,$$

δι' ἧς ζητεῖται ἡ τετραγωνικὴ ῥίζα τοῦ —5· ἐξάγοντες ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν εὐρίσκομεν

$$x = \pm \sqrt{-5} = \pm \sqrt{(-1)(5)} = \pm \sqrt{-1} \cdot \sqrt{5} = \pm i\sqrt{5}.$$

ὥστε οἱ δύο ἀριθμοὶ  $i\sqrt{5}$  καὶ —  $i\sqrt{5}$  λύουσι τὴν ἐξίσωσιν.

### Παραδείγματα.

1<sup>ον</sup>) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις  $3x^2 + 18 = 8x^2 - 62$ .

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν  $5\chi^2=80$ , ὅθεν  $\chi^2=16$ , καὶ ἐπομένως ἔχομεν τὰς δύο λύσεις

$$\eta \quad \chi = +\sqrt{16} = 4, \quad \eta \quad \chi = -\sqrt{16} = -4.$$

2ον) 
$$\frac{\chi^2}{5} + \frac{2}{3} = \frac{\chi^2}{6} + \frac{3}{8} + \chi^2.$$

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν  $116\chi^2=35$ , ὅθεν  $\chi^2=\frac{35}{116}$   
καὶ ἐπομένως ἔχομεν τὰς λύσεις

$$\eta \quad \chi = +\sqrt{\frac{35}{116}}, \quad \eta \quad \chi = -\sqrt{\frac{35}{116}}.$$

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι

$$\sqrt{\frac{35}{116}} = \sqrt{\frac{35}{4 \cdot 29}} = \sqrt{\frac{35 \cdot 29}{4 \cdot 29^2}} = \frac{1}{58} \sqrt{1015},$$

$$\text{ἔπεται, ὅτι } \eta \quad \chi = +\frac{1}{58} \sqrt{1015}, \quad \eta \quad \chi = -\frac{1}{58} \sqrt{1015}.$$

3ον)  $(\chi + \alpha)(\chi - \alpha) = 2\alpha + 1.$

Ἐκ τῆς ἐξίσωσως ταύτης ἔπεται  $\chi^2 = x^2 + 2x + 1$ , ἥτοι  
$$\chi^2 = (\alpha + 1)^2.$$

ὅθεν ἔπονται αἱ λύσεις

$$\chi = \alpha + 1, \quad \eta \quad \chi = -\alpha - 1.$$

4ον)  $4\chi^2 - 8 = 12\chi^2 + 24.$

Ἐκ ταύτης ἔπεται  $8\chi^2 = -32$ ,  $\eta \quad \chi^2 = -4.$

ὅθεν ἔπονται αἱ φανταστικαὶ λύσεις

$$\eta \quad \chi = +\sqrt{-4} = 2i, \quad \eta \quad \chi = -\sqrt{-4} = -2i.$$

**Λύσεις τῆς ἐξίσωσως  $\chi^2 + \pi\chi = 0.$**

206 Ἴνα λύσωμεν τὴν ἐξίσωσιν ταύτην, γράφομεν αὐτὴν ὡς ἔπεται

$$\chi(\chi + \pi) = 0.$$

Ἐπειδὴ δὲ γινόμενον δύο παραγόντων τότε μόνον εἶναι 0, ὅταν ὁ ἕτερος τῶν παραγόντων εἶναι 0, ἔπεται, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι

$$\eta \quad \chi = 0, \quad \eta \quad \chi + \pi = 0.$$

ἔχομεν ἄρα δύο λύσεις  $\eta \quad \chi = 0, \quad \eta \quad \chi = -\pi.$

Ἐστω ὡς παράδειγμα ἡ ἐξίσωσις

$$\chi^2 - 8\chi = 0.$$

γράφοντες αὐτὴν ὑπὸ τὴν μορφήν  $\chi(\chi - 8) = 0$

βλέπομεν, ὅτι ἔχει τὰς λύσεις

$$\eta \quad \chi = 0, \quad \eta \quad \chi = 8.$$

**Λύσεις τῆς γενικῆς ἐξισώσεως  $\chi^2 + \pi\chi = \kappa$ .**

207. Τὸ πρῶτον μέλος τῆς ἐξισώσεως ταύτης σύγκειται ἐκ τοῦ τετραγώνου τοῦ  $\chi$  καὶ ἐκ τοῦ διπλασίου γινομένου τοῦ  $\chi$  ἐπὶ τὸν γνωστὸν ἀριθμὸν  $\frac{\pi}{2}$  (διότι τὸ  $\pi\chi$  εἶναι ἴσον πρὸς τὸ  $\frac{\pi}{2} \cdot 2\chi$ ). ἀποτελεῖ ἄρα τοὺς δύο πρώτους ὅρους τοῦ τετραγώνου  $\left(\chi + \frac{\pi}{2}\right)^2$ . ἵνα δὲ ἀποτελέσῃ τὸ ὅλον τετράγωνον, ἀρκεῖ νὰ προστεθῇ εἰς αὐτὸ ὁ τρίτος ὅρος τοῦ τετραγώνου, ὅστις εἶναι ὁ  $\frac{\pi^2}{4}$ . Διὰ τῆς προσθέσεως τούτου εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ἐξισώσεως λαμβάνομεν τὴν ἐξίσωσιν

$$\chi^2 + \pi\chi + \frac{\pi^2}{4} = \kappa + \frac{\pi^2}{4}$$

ἢ 
$$\left(\chi + \frac{\pi}{2}\right)^2 = \kappa + \frac{\pi^2}{4}$$

ἐξάγοντες δὲ τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἀμφοτέρων τῶν μελῶν, λαμβάνομεν τὰς δύο ἰσοδυνάμους πρὸς αὐτὴν ἐξισώσεις

$$\chi + \frac{\pi}{2} = \sqrt{\kappa + \frac{\pi^2}{4}}, \quad \chi + \frac{\pi}{2} = -\sqrt{\kappa + \frac{\pi^2}{4}}$$

ἐξ ὧν εὐρίσκομεν τὰς δύο λύσεις

ἢ 
$$\chi = -\frac{\pi}{2} + \sqrt{\kappa + \frac{\pi^2}{4}}$$

ἢ 
$$\chi = -\frac{\pi}{2} - \sqrt{\kappa + \frac{\pi^2}{4}}$$

Τὰς δύο ταύτας λύσεις περιλαμβάνομεν εἰς ἓνα μόνον τύπον, γράφοντες αὐτὰς ὡς ἔπεται

$$\chi = -\frac{\pi}{2} \pm \sqrt{\kappa + \frac{\pi^2}{4}} \quad (1)$$

208. Ἡ ἔκφρασις αὕτη τοῦ  $\chi$  εἶναι γενικὸς τύπος, δι' οὗ δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τοὺς λύοντας τὴν ἐξίσωσιν ἀριθμοὺς χωρὶς νὰ ἐπαναλάβωμεν τοὺς προηγηθέντας συλλογισμοὺς, οἰοιδήποτε ἀριθμοὶ καὶ ἂν εἶναι οἱ συντελεσταὶ  $\pi$  καὶ  $\kappa$ .

Δύναται δὲ νὰ ἐρμηνευθῇ ὁ τύπος ὡς ἔπεται.

Ἐκ πάσης ἐξισώσεως τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ἀνηγμένης εἰς τὴν μορφήν

$$\chi^2 + \pi\chi = \kappa$$

ὁ ἄγνωστος εὐρίσκεται, ἐὰν ληφθῇ τὸ ἥμισυ τοῦ συντελεστοῦ τῆς πρώτης δυνάμεως αὐτοῦ μετὰ τοῦ ἐναντίου σημείου, προστεθῇ δὲ εἰς

αὐτὸ ἢ ἀφαιρεθῆ ἢ τετραγωνικὴ ῥίζα τοῦ γνωστοῦ ὄρου ηὔξημένου κατὰ τὸ τετράγωνον τοῦ ληφθέντος ἡμίσεος τοῦ συντελεστοῦ.

Αἱ λύσεις τῆς δευτεροβαθμίου ἐξίσωσως λέγονται καὶ ρίζαι αὐτῆς.

Ἐκ τοῦ εὐρεθέντος τύπου (1) βλέπομεν, ὅτι ἡ ἐξίσωσις τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ἔχει δύο μὲν πραγματικὰς λύσεις ἢ ρίζας, ἐὰν ὁ ἀριθμὸς  $x + \frac{\pi^2}{4}$  εἶναι θετικὸς, μίαν δὲ μόνον (πραγματικὴν), ἐὰν ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς εἶναι 0, καὶ δύο μιγάδας, ἐὰν ἀρνητικὸς.

209. Ἐκ τοῦ γενικοῦ τύπου (1) εὐρίσκονται καὶ αἱ λύσεις τῶν ἀπλουστέρων ἐξίσωσεων  $x^2 = x$  καὶ  $x^2 + \pi x = 0$ . (διότι καὶ αἱ ἐξίσωσεις αὗται ὑπάγονται εἰς τὴν γενικὴν, ἥς τινος εἶναι μερικαὶ μόνον περιπτώσεις).

Ἐὰν τῷ ὄντι ὑποθέσωμεν  $x=0$ , ἡ μὲν γενικὴ ἐξίσωσις κατανατᾷ  $x^2 + \pi x = 0$ , ὁ δὲ γενικὸς τύπος δίδει

$$x = -\frac{\pi}{2} \pm \sqrt{\frac{\pi^2}{4}}, \quad \text{ἢ} \quad x = -\frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{2}.$$

ὅθεν αἱ λύσεις  $x=0$  καὶ  $x=-\pi$ .

Ἐὰν δὲ ὑποθέσωμεν  $\pi=0$ , ἡ μὲν γενικὴ ἐξίσωσις κατανατᾷ  $x^2 = x$ , ὁ δὲ γενικὸς τύπος δίδει

$$x = \pm \sqrt{x}.$$

ΣΗΜ. Ἐὰν ἡ δευτεροβάθμιος ἐξίσωσις δυθῆ ὑπὸ τὴν μορφήν

$$(x - \alpha)^2 = \beta,$$

αἱ ρίζαι αὐτῆς εὐρίσκονται ἀμέσως διὰ τῆς ἐξαγωγῆς τῆς τετρ. ρίζης ἀμφοτέρων τῶν μελῶν καὶ εἶναι

$$x = \alpha \pm \sqrt{\beta}.$$

### Παραδείγματα.

1<sup>ον</sup>) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις  $x^2 - 5x = -6$ .

ἐφαρμόζοντες εἰς αὐτὴν τὸν εὐρεθέντα τύπον, εὐρίσκομεν

$$x = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 6}$$

ἦτοι

$$x = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2},$$

ἐπομένως αἱ δύο ρίζαι τῆς ἐξίσωσως εἶναι

$$x = \frac{5}{4} + \frac{1}{2} = 3$$

καὶ

$$x = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$$

2ον) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις  $\chi^2 + 6\chi = 8$ .

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν κατὰ τὸν τύπον

$$\chi = -3 \pm \sqrt{9 + 8} = -3 \pm \sqrt{17}.$$

Ἐπομένως αἱ δύο ρίζαι τῆς ἐξισώσεως εἶναι

$$\chi = -3 + \sqrt{17}$$

καὶ

$$\chi = -3 - \sqrt{17}$$

3ον) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις  $\chi^2 + 7\chi = 1$ .

Ἐκ ταύτης ἔπεται κατὰ τὸν τύπον

$$\chi = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} + 1} = -\frac{7}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{53}.$$

Ἐπομένως αἱ ρίζαι τῆς ἐξισώσεως εἶναι

$$\chi = \frac{-7 + \sqrt{53}}{2} \quad \text{καὶ} \quad \chi = \frac{-7 - \sqrt{53}}{2}$$

4ον)

$$\chi^2 - 7\alpha\chi = -12\alpha^2.$$

Ἐκ τῆς ἐξισώσεως ταύτης ἐφαρμόζοντες τὸν τύπον εὐρίσκομεν

$$\chi = \frac{7\alpha}{2} \pm \sqrt{\frac{49\alpha^2}{4} - 12\alpha^2} = \frac{7\alpha}{2} \pm \sqrt{\frac{\alpha^2}{4}}$$

ἦτοι

$$\chi = \frac{7\alpha}{2} \pm \frac{\alpha}{2},$$

ἐπομένως αἱ ρίζαι τῆς ἐξισώσεως εἶναι

$$\chi = 4\alpha \quad \text{καὶ} \quad \chi = 3\alpha.$$

5ον)

$$\chi^2 - (2\alpha + 5\beta)\chi + 10\alpha\beta = 0.$$

Ἐφαρμόζοντες τὸν γενικὸν τύπον εὐρίσκομεν

$$\chi = \frac{2\alpha + 5\beta}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2\alpha + 5\beta}{2}\right)^2 - 10\alpha\beta}.$$

Ἡ ὑπόριζος παράστασις εἶναι

$$\frac{4\alpha^2 - 20\alpha\beta + 25\beta^2}{4}, \quad \text{ἦτοι} \quad \left(\frac{2\alpha - 5\beta}{2}\right)^2.$$

ὅθεν ἔπεται

$$\chi = \frac{2\alpha + 5\beta}{2} \pm \frac{2\alpha - 5\beta}{2}.$$

καὶ αἱ ρίζαι ἐπομένως εἶναι

$$\chi = \frac{2\alpha + 5\beta}{2} + \frac{2\alpha - 5\beta}{2} = 2\alpha$$

καὶ

$$\chi = \frac{2\alpha + 5\beta}{2} - \frac{2\alpha - 5\beta}{2} = 5\beta.$$

+ 6ον)

$$\chi^2 - 8\chi + 25 = 0.$$

Ἐφαρμόζοντες τὸν γενικὸν τύπον εἰς τὴν ἐξίσωσιν ταύτην, εὐρίσκομεν

$$\chi = 4 \pm \sqrt{16 - 25} = 4 + \sqrt{-9} = 4 \pm \sqrt{9(-1)},$$

ἐξ οὗ ἐπονται αἱ μιγάδες ρίζαι

$$\chi = 4 + 3i \text{ καὶ } \chi = 4 - 3i.$$

Εὐκόλον δὲ εἶναι νὰ βεβαιωθῶμεν, ὅτι ἀμφότεροι οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι ἐπαληθεύουσι τὴν δοθεῖσαν ἐξίσωσιν.

\* 210. Ἴνα εὕρωμεν τύπον παρέχοντα ἀμέσως τὰς ρίζας τῆς δευτεροβαθμίου ἐξισώσεως ἀνηγμένης εἰς τὴν μορφήν

$$\alpha\chi^2 + \beta\chi + \gamma = 0,$$

διαιροῦμεν ἀμφότερα τὰ μέλη διὰ τοῦ  $\alpha$ , ὅτε προκύπτει ἡ ἐξίσωσις

$$\chi^2 + \frac{\beta}{\alpha}\chi + \frac{\gamma}{\alpha} = 0, \text{ ἢ } \chi^2 + \frac{\beta}{\alpha}\chi = -\frac{\gamma}{\alpha}.$$

ταύτης δὲ αἱ ρίζαι εὐρίσκονται ἐκ τοῦ τύπου (1), ἐὰν τεθῇ ἐν αὐτῷ ἀντὶ τοῦ  $\pi$  τὸ  $\frac{\beta}{\alpha}$  καὶ ἀντὶ τοῦ  $\kappa$  τὸ  $-\frac{\gamma}{\alpha}$ . οὕτω προκύπτει

$$\chi = -\frac{\beta}{2\alpha} \pm \sqrt{\frac{\beta^2}{4\alpha^2} - \frac{\gamma}{\alpha}}$$

ἢ

$$\chi = -\frac{\beta}{2\alpha} \pm \sqrt{\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}}.$$

Ἐπειδὴ δὲ ἔχομεν νὰ ἐξαγάγωμεν τὴν ρίζαν κλάσματος, ἐξάγομεν τὴν ρίζαν τῶν ὄρων καὶ γράφομεν κοινὸν παρονομαστὴν τὸν  $2\alpha$ : οὕτως εὐρίσκομεν

$$\chi = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \quad (2)$$

Ὁ τύπος οὗτος παρέχει ἀμέσως τὰς ρίζας τῆς ἐξισώσεως

$$\alpha\chi^2 + \beta\chi + \gamma = 0,$$

χωρὶς νὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀγῆται εἰς τὴν μορφήν  $\chi^2 + \pi\chi = \kappa$ .

### Παραδείγματα.

+ 1ον) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις  $10\chi^2 + \chi - 3 = 0$ .

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν κατὰ τὸν τύπον (2)

$$\chi = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-3)}}{20} = \frac{-1 \pm \sqrt{121}}{20} = \frac{-1 \pm 11}{20}.$$

ἐπομένως αἱ ρίζαι εἶναι

$$\chi = \frac{-1 + 11}{20} = \frac{1}{2} \text{ καὶ } \chi = \frac{-1 - 11}{20} = -\frac{3}{5}$$

2ον)

$$8\chi^2 + 13\chi + 12 = 0.$$

Ἐνταῦθα ἔχομεν

$$\chi = \frac{-13 \pm \sqrt{169 - 4 \cdot 8 \cdot 12}}{16} = \frac{-13 \pm \sqrt{-215}}{16}$$

καὶ αἱ ρίζαι εἶναι

$$\chi = \frac{-13 + i\sqrt{215}}{16} \quad \text{καὶ} \quad \chi = \frac{-13 - i\sqrt{215}}{16}.$$

Πρὸς ἄσκησιν προτείνομεν εἰς λύσιν καὶ τὰς ἐπομένους ἐξισώσεις·

- 1)  $\frac{\alpha}{\chi - \beta} + \frac{\beta}{\chi - \alpha} = 2.$
- 2)  $24\chi^2 + 29\chi + 7 = 0.$
- 3)  $\chi^2 - 2\alpha\chi = \beta^2 - \alpha^2.$
- 4)  $(\alpha + \beta)^2(\chi^2 - \chi) + \alpha\beta = 0.$
- 5)  $(\alpha^2 - \beta^2)\chi^2 - 2\chi(\alpha^2 + \beta^2) + \alpha^2 - \beta^2 = 0.$

**Σχέσεις μεταξὺ τῶν συντελεστῶν καὶ τῶν ριζῶν**  
τῆς ἐξισώσεως τοῦ δευτέρου βυθμοῦ  $\chi^2 + \pi\chi = \kappa.$

† 211. Τῶν δύο ριζῶν τῆς ἐξισώσεως  $\chi^2 + \pi\chi = \kappa$ , τὸ μὲν ἄθροισμα ἰσοῦται τῷ συντελεστῇ τῆς πρώτης δυνάμεως τοῦ ἀγνώστου μετ' ἐναντίου σημείου, τὸ δὲ γινόμενον ἰσοῦται τῷ γνωστῷ ὄρω ὡσαύτως μετ' ἐναντίου σημείου εἰλημμένῳ.

Διότι, ἂν παραστήσωμεν τὰς ρίζας διὰ  $\rho'$  καὶ  $\rho''$ , ἔχομεν

$$\rho' = -\frac{\pi}{2} + \sqrt{\frac{\pi^2}{4} + \kappa}$$

$$\rho'' = -\frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{\pi^2}{4} + \kappa}.$$

καὶ προσθέτοντες τὰς ἰσότητας ταύτας κατὰ μέλη, εὐρίσκομεν

$$\rho' + \rho'' = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 2 \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi,$$

πολλαπλασιάζοντες δ' αὐτὰς εὐρίσκομεν

$$\begin{aligned} \rho' \cdot \rho'' &= \left\{ \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \sqrt{\kappa + \frac{\pi^2}{4}} \right\} \cdot \left\{ \left(-\frac{\pi}{2}\right) - \sqrt{\kappa + \frac{\pi^2}{4}} \right\} = \\ &= \left(-\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\kappa + \frac{\pi^2}{4}\right) = \frac{\pi^2}{4} - \kappa - \frac{\pi^2}{4} = -\kappa. \end{aligned}$$

Παρατηρητέον δέ, ὅτι αἱ ιδιότητες αὗται μένουσι, καὶ ὅταν μία



μόνη ρίζα ὑπάρχει, ἐὰν θεωρηθῇ αὕτη ὡς διπλῆ· διότι τότε τὰ  $\rho'$  καὶ  $\rho''$  γίνονται ἴσα.

212. Διὰ τῶν ἰδιοτήτων τούτων τῶν ριζῶν δυνάμεθα νὰ λύσωμεν τὰ ἐπόμενα ζητήματα·

1) Ἐδρεῖν τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῆς δευτεροβαθμίου ἐξισώσεως  $\chi^2 + \pi\chi = \kappa$ , πρὶν ἢ λυθῇ αὕτη.

Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν, ὅτι, ἂν ὁ ἀριθμὸς

$$\kappa + \frac{\pi^2}{4}$$

εἶναι ἀρνητικός, αἱ ρίζαι εἶναι μιγάδες ἀριθμοί· θεωρήσωμεν λοιπὸν τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι θετικός, ὅτε αἱ ρίζαι εἶναι πραγματικάι. Τότε δυνατόν νὰ εἶναι

α')  $\pi$  θετικὸν καὶ  $\kappa$  θετικόν.

Ἐπειδὴ τῶν ριζῶν τὸ γινόμενον εἶναι ἀρνητικόν ( $-\kappa$ ), ἔπεται, ὅτι εἶναι ἑτεροειδεῖς, ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι ὡσαύτως ἀρνητικόν ( $-\pi$ ), ἔπεται, ὅτι μεγαλητέρα εἶναι ἡ ἀρνητικὴ.

β')  $\pi$  θετικόν, ἀλλὰ  $\kappa$  ἀρνητικόν.

Ἐπειδὴ τῶν ριζῶν τὸ γινόμενον εἶναι θετικόν, αἱ ρίζαι εἶναι ὁμοειδεῖς, ἐπειδὴ δὲ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι ἀρνητικόν, ἔπεται, ὅτι ἀμφότεραι εἶναι ἀρνητικάι.

γ')  $\pi$  ἀρνητικόν, ἀλλὰ  $\kappa$  θετικόν.

Ἐπειδὴ τὸ γινόμενον τῶν ριζῶν εἶναι ἀρνητικόν, αἱ ρίζαι εἶναι ἑτεροειδεῖς· ἐπειδὴ δὲ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι θετικόν, μεγαλητέρα εἶναι ἡ θετικὴ.

δ')  $\pi$  ἀρνητικὸν καὶ  $\kappa$  ἀρνητικόν.

Ἐπειδὴ τὸ γινόμενον τῶν ριζῶν εἶναι θετικόν, αἱ ρίζαι εἶναι ὁμοειδεῖς, καὶ ἐπειδὴ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι θετικόν, ἔπεται, ὅτι ἀμφότεραι εἶναι θετικάι.

Ἐὰν εἶναι  $\kappa=0$ . μία τῶν ριζῶν εἶναι 0, ἡ δὲ ἄλλη εἶναι ὁ ἀντίθετος τοῦ  $\pi$  ἀριθμὸς (ἐδ. 206). Ἐὰν δὲ εἶναι  $\pi=0$ , αἱ δύο ρίζαι εἶναι ἀντίθετοι (ἐδ. 203). Ἐὰν δὲ τέλος εἶναι  $\pi=0$  καὶ  $\kappa=0$ , ἀμφότεραι αἱ ρίζαι εἶναι 0.

Ὅτι δὲ τὰ ἐξαγόμενα ταῦτα δύνανται νὰ εὐρεθῶσι καὶ ἐκ τοῦ γενικοῦ τύπου (1), εἶναι φανερόν.

Κατὰ ταῦτα ἡ ἐξίσωσις  $\chi^2 - 5\chi = 3$  ἔχει μίαν θετικὴν καὶ μίαν ἀρνητικὴν ρίζαν, μεγαλητέραν δὲ τὴν θετικὴν.

Ἡ δὲ ἐξίσωσις  $\chi^2 + 8\chi = -7$  ἔχει δύο ἀρνητικὰς.

2) Πῶς μεταβάλλονται αἱ ῥίζαι τῆς ἐξισώσεως  $\alpha\chi^2 + \beta\chi + \gamma = 0$ , ὅταν οἱ μὲν ἀριθμοὶ  $\beta$  καὶ  $\gamma$  μένωσιν ἀμετάβλητοι, ὁ δὲ  $\alpha$  ἐλαττωθῆται ἀπαύστως καὶ πλησιάζῃ πρὸς τὸ 0;

Ἐπειδὴ ἡ ἐξίσωσις  $\alpha\chi^2 + \beta\chi + \gamma = 0$  πλησιάζει ἀπαύστως πρὸς τὴν  $\beta\chi + \gamma = 0$ , ἔπεται, ὅτι μία ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς πλησιάζει πρὸς τὸν ἀριθμὸν  $-\frac{\gamma}{\beta}$ , ὅστις πληροῖ τὴν  $\beta\chi + \gamma = 0$ . Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἄθροισμα

τῶν ῥιζῶν εἶναι  $-\frac{\beta}{\alpha}$ , ἔπεται, ὅτι ἡ ἄλλη ῥίζα διαφέρει ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ  $-\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\gamma}{\beta}$  τόσῳ ὀλιγώτερον, ὅσῳ μικρότερον εἶναι τὸ  $\alpha$ .

Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι ἡ δευτέρα αὕτη ῥίζα καταστᾶ μεγαλύτερα παντὸς ἀριθμοῦ (τοῦ σημείου αὐτῆς λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν), ὅταν τὸ  $\alpha$  γίνῃ ἱκανῶς μικρόν.

### Ἀνάλυσις παντὸς τριωνύμου τοῦ δευτέρου βαθμοῦ εἰς παράγοντας τοῦ πρώτου βαθμοῦ.

213. Ἐστω τὸ τριώνυμον τοῦ δευτέρου βαθμοῦ  $\chi^2 + \beta\chi + \gamma$  καὶ ἄς παρασταθῶσι διὰ  $\rho'$  καὶ  $\rho''$  αἱ ῥίζαι τῆς ἐξισώσεως, ἧτις προκύπτει, ὅταν τὸ τριώνυμον τοῦτο τεθῆ ἴσον τῷ 0. ἦτοι τῆς

$\chi^2 + \beta\chi + \gamma = 0$ , ἢ τῆς  $\chi^2 + \beta\chi = -\gamma$ . τότε, ὡς ἐμάθομεν, εἶναι

$$\rho' + \rho'' = -\beta \text{ καὶ } \rho' \cdot \rho'' = \gamma.$$

ἐπομένως τὸ τριώνυμον  $\chi^2 + \beta\chi + \gamma$  γράφεται καὶ ὡς ἑξῆς:

$$\chi^2 - (\rho' + \rho'')\chi + \rho'\rho'',$$

τοῦτο δὲ εἶναι γινόμενον τῶν παρχόντων  $(\chi - \rho')(\chi - \rho'')$ . ὅθεν ἔπεται

$$\chi^2 + \beta\chi + \gamma = (\chi - \rho')(\chi - \rho''). \quad (1)$$

τοῦτ' ἔστι, πᾶν τριώνυμον τοῦ δευτέρου βαθμοῦ  $\chi^2 + \beta\chi + \gamma$  ἀναλύεται εἰς γινόμενον δύο πρωτοβαθμίων παραγόντων· εὐρίσκονται δὲ οἱ παράγοντες οὗτοι, ἂν ἀπὸ τοῦ γράμματος  $\chi$  ἀφαιρεθῶσιν αἱ τιμαὶ τοῦ  $\chi$ , δι' ἃς τὸ τριώνυμον μηδενίζεται.

Ἐὰν αἱ δύο ῥίζαι  $\rho'$  καὶ  $\rho''$  εἶναι ἴσαι (ἦτοι ἂν εἷς καὶ μόνος ἀριθμὸς μηδενίζῃ τὸ τριώνυμον), βλέπομεν ἐκ τῆς ἰσότητος (1), ὅτι τὸ τριώνυμον εἶναι τότε τέλειον τετράγωνον.

Ἐὰν τὸ τριώνυμον εἶναι τῆς μορφῆς  $\alpha\chi^2 + \beta\chi + \gamma$ , διαιροῦμεν αὐτὸ διὰ τοῦ  $\alpha$  καὶ ἐφαρμύζομεν τὰ προηγουμένα εἰς τὸ πληκτικόν· ὅτε τοῦτο ἀνα-

λύεται εἰς τὸ γινόμενον  $(x-p)(x-p')$ . ἐπομένως πρὸ τῆς διαιρέσεως τὸ τριώνυμον  $ax^2+bx+c$  εἶναι ἴσον τῷ  $a(x-p)(x-p')$ .

Κατὰ ταῦτα τὸ τριώνυμον  $x^2-5x+6$  ἀναλύεται εἰς τὸ γινόμενον  $(x-2)(x-3)$ . διότι αἱ ρίζαι τῆς ἐξίσωσως

$$x^2-5x+6=0 \quad \text{εἶναι } 2 \text{ καὶ } 3.$$

Καὶ τὸ τριώνυμον  $x^2+7x-8$  ἀναλύεται εἰς τὸ γινόμενον  $(x-1)(x+8)$ . διότι οἱ μηδενίζοντες αὐτὸ ἀριθμοὶ εἶναι οἱ  $-8$  καὶ  $+1$ .

Καὶ τὸ τριώνυμον  $5x^2+9x-2$  ἰσοῦται τῷ γινομένῳ

$$5(x+2) \cdot \left(x - \frac{1}{5}\right), \quad \eta \text{ τῷ } (x+2)(5x-1).$$

διότι οἱ μηδενίζοντες αὐτὸ ἀριθμοὶ εἶναι  $-2$  καὶ  $\frac{1}{5}$ .

Ἡ ἀνάλυσις αὕτη ἐξηγεῖ, διὰ τί ἡ ἐξίσωσις τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ἔχει δύο ρίζας. Καὶ ὄντως, γινόμενον δύο παραγόντων, οἷον τὸ  $(x-p)(x-p')$ , μηδενίζεται κατὰ δύο διαφόρους τρόπους, δηλονότι μηδενιζομένου ἢ τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου παραγόντος. Ἐὰν δὲ ἐξίσωσωμεν τῷ 0 πρῶτον τὸν ἕνα παράγοντα καὶ ἔπειτα τὸν ἄλλον, θὰ λάβωμεν τὰς δύο ρίζας τοῦ πολυωνύμου  $x^2+bx+c$ .

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ.** Δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν δευτεροβάθμιον ἐξίσωσιν ἔχουσαν ρίζας δύο ὡς ἔτυχε δεδομένους ἀριθμούς, ὡς τοὺς  $\lambda$  καὶ  $\rho$ . πρὸς τοῦτο σχηματίζομεν τὸ γινόμενον  $(x-\lambda)(x-\rho)$  καὶ ἐξισοῦμεν αὐτὸ μὲ τὸ 0. ἦτοι θέτομεν

$$(x-\lambda)(x-\rho)=0.$$

Ὅτι δὲ οὐδεμία ἄλλη δευτεροβάθμιος ἐξίσωσις τῆς μορφῆς  $x^2+bx+c=0$  ἔχει τὰς δοθείσας ρίζας, εἶναι φανερόν.

\*Τὴν ἀνάλυσιν παντὸς τριωνύμου  $x^2+bx+c$  εἰς πρωτοβαθμίους παραγόντας δυνάμεθα νὰ δεῖξωμεν καὶ ὡς ἐξῆς.

Ἐστω τὸ τριώνυμον  $x^2+bx+c$ .

Συμπληροῦντες τὸ τετράγωνον, εἰς ὃ ἀνήκουσιν οἱ δύο πρῶτοι ὄροι (ἐδ. 207), γράφομεν αὐτὸ ὡς ἔπεται

$$\left(x + \frac{1}{2}b\right)^2 + c - \frac{1}{4}b^2,$$

ἔπειτα διακρίνομεν τὰς ἐξῆς τρεῖς περιπτώσεις.

1) Ἐὰν  $c - \frac{1}{4}b^2$  εἶναι θετικόν, παριστῶντες τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν αὐτοῦ διὰ τοῦ  $\tau$ , θὰ ἔχωμεν τὸ πολυώνυμον ὑπὸ τὴν μορφήν

$$\left(x + \frac{1}{2}b\right)^2 + \tau^2. \quad (1)$$

$$\eta \quad \left( \chi + \frac{1}{2} \beta + \tau \right) \left( \chi + \frac{1}{2} \beta - \tau \right).$$

2) Ἐὰν εἶναι  $\gamma - \frac{1}{4} \beta^2$  ἀρνητικόν, ὁ ἀντίθετος ἀριθμὸς  $\frac{1}{4} \beta^2 - \gamma$  θὰ εἶναι θετικὸς καὶ παριστῶντες τὴν τετραγ. αὐτοῦ ρίζαν διὰ  $\tau$ , θὰ ἔχωμεν τὸ τριώνυμον ὑπὸ τὴν μορφήν

$$\left( \chi + \frac{1}{2} \beta \right)^2 - \tau^2 \quad (2)$$

$$\eta \quad \left( \chi + \frac{1}{2} \beta + \tau \right) \left( \chi + \frac{1}{2} \beta - \tau \right).$$

3) Ἐὰν τέλος εἶναι  $\gamma - \frac{1}{4} \beta^2 = 0$ , τὸ τριώνυμον κατανατᾶ

$$(3) \quad \left( \chi + \frac{1}{2} \beta \right)^2 \quad \eta \quad \left( \chi + \frac{1}{2} \beta \right) \left( \chi + \frac{1}{2} \beta \right)$$

ὥστε καὶ κατὰ τὰς τρεῖς περιπτώσεις τὸ τριώνυμον ἀναλύεται εἰς γινόμενον δύο παραγόντων πρωτοβαθμίων (ὡς πρὸς τὸ  $\chi$ ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ. Ἐὰν δύο πραγματικοὶ ἀριθμοί,  $\lambda$  καὶ  $\mu$ , τιθέμενοι ἀντὶ τοῦ  $\chi$  εἰς τὸ τριώνυμον  $\chi^2 + \beta\chi + \gamma$ , δίδωσιν ἐξαγόμενα ἕτεροειδῆ, αἱ ρίζαι τῆς ἐξίσωσως  $\chi^2 + \beta\chi + \gamma = 0$  εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι καὶ μία ἐξ αὐτῶν περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν αὐτῶν δύο ἀριθμῶν  $\lambda$  καὶ  $\mu$ .

Διότι τὸ τριώνυμον τότε τίθεται ὑπὸ τὴν μορφήν (2)

$$\left( \chi + \frac{1}{2} \beta \right)^2 - \tau^2,$$

διότι εἰς τὰς ἄλλας δύο μορφάς (1) καὶ (3) τὸ τριώνυμον εἶναι ἢ τετράγωνον τέλειον ἢ ἄθροισμα δύο τετραγώνων καὶ διὰ τοῦτο δὲν δύναται νὰ δώσῃ ἀρνητικὸν ἐξαγόμενον διὰ πραγματικὴν τιμὴν τοῦ  $\chi$ . αἱ ρίζαι ἄρα θὰ εἶναι πραγματικαὶ  $\left( \alpha\acute{\iota} - \frac{1}{2} \beta + \tau \text{ καὶ } -\frac{1}{2} \beta - \tau \right)$  καὶ ἄνισοι, καὶ ἂν παραστήσωμεν αὐτάς διὰ  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$ , δυνάμεθα νὰ γράψωμεν τὸ τριώνυμον καὶ ὡς ἐξῆς

$$(\chi - \rho_1) (\chi - \rho_2).$$

ἀντικαθιστῶντες δὲ τὸ  $\chi$  εἰς αὐτὸ πρῶτον μὲν ὑπὸ τοῦ  $\lambda$ , ἔπειτα δὲ ὑπὸ τοῦ  $\mu$ , εὐρίσκομεν τὰ δύο ἐξαγόμενα

$$(\lambda - \rho_1) (\lambda - \rho_2) \text{ καὶ } (\mu - \rho_1) (\mu - \rho_2),$$

ἄτινα ἐξ ὑποθέσεως εἶναι ἑτεροειδῆ· ἐπομένως τὸ πηλίκον αὐτῶν

$$\frac{\lambda - \rho_1}{\mu - \rho_1} \cdot \frac{\lambda - \rho_0}{\mu - \rho_2}$$

εἶναι ἀρνητικόν· ἐντεῦθεν συνάγεται, ὅτι τὸ ἐν ἑκ τῶν πηλίκων, θὰ εἶναι ἀρνητικόν· ἔστω τὸ πρῶτον· τότε οἱ ἀριθμοὶ  $\lambda - \rho_1$  καὶ  $\mu - \rho_1$ , θὰ εἶναι ἑτεροειδεῖς· ἦτοι ἡ ρίζα  $\rho_1$  θὰ περιλαμβάνηται μεταξὺ  $\lambda$  καὶ  $\mu$ .

### Ἐξισώσεις ἔχουσαι ῥιζικά.

214. Ἐὰν ἐξίσωσις ἔχῃ τετραγωνικὴν τινα ρίζαν, ὑπὸ τὴν ὁποίαν ὑπάρχει ὁ ἀγνωστος, κατορθοῦμεν, ὥστε αὕτη μόνη νὰ ἀποτελεῖ τὸ ἕτερον τῶν μελῶν καὶ ὑψοῦμεν ἔπειτα ἀμφότερα τὰ μέλη εἰς τὸ τετράγωνον, ὅτε ἡ ρίζα ἐξαφανίζεται. Ἀναμνηστέον ὁμῶς, ὅτι ἡ προκύπτουσα ἐξίσωσις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς δύο ἐξισώσεις, τὴν ἀρχικὴν καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς προκύπτουσαν, ὅταν ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ληφθῇ μετὰ τοῦ ἀνιθέτου σημείου. Λέγονται δὲ αἱ δύο αὗται ἐξισώσεις συζυγεῖς ἀλλήλων.

### Παραδείγματα.

1ον)  $x + \sqrt{x} = 20$   
 γράφομεν  $\sqrt{x} = 20 - x$   
 ὅθεν ὑψοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον ἀμφότερα τὰ μέλη  
 $x = 400 + x^2 - 40x$   
 ἢ  $x^2 - 41x = -400$ ,  
 καὶ λύοντες εὐρίσκομεν  $x = 16$ , ἢ  $x = 25$ . τῶν λύσεων τούτων μόνον ἡ πρώτη ἀρμόζει εἰς τὴν δοθεῖσαν ἐξίσωσιν, ἡ δὲ δευτέρα εἰς τὴν συζυγῆ αὐτῆς

$$x - \sqrt{x} = 20.$$

2ον)  $x + \sqrt{x^2 - 5} = 5$   
 γράφομεν  $\sqrt{x^2 - 5} = 5 - x$   
 ὅθεν  $x^2 - 5 = 25 - 10x + x^2$   
 ἢ  $10x = 30$   
 καὶ  $x = 3$ .

Ἡ λύσις αὕτη ἀρμόζει εἰς τὴν δοθεῖσαν ἐξίσωσιν· ἐπομένως ἡ συζυγῆς αὐτῆς

$$x - \sqrt{x^2 - 5} = 5 \text{ οὐδεμίαν ἐπιδέχεται λύσιν.}$$

3ον)  $x - \sqrt{2x^2 - 8x + 9} = 1$   
 γράφομεν  $\sqrt{2x^2 - 8x + 9} = x - 1$   
 ὅθεν  $2x^2 - 8x + 9 = x^2 - 2x + 1$   
 ἢ  $x^2 - 6x + 8 = 0$ .

Αἱ λύσεις τῆς ἐξίσωσως ταύτης εἶναι ἢ  $\chi=2$  ἢ  $\chi=4$ , ἀρμόζουσι δὲ ἀμφότεραι εἰς τὴν δοθεῖσαν ἐξίσωσιν· ἐπομένως ἡ συζυγῆς αὐτῆς

$$\chi + \sqrt{2\chi^2 - 8\chi + 9} = 1$$

οὐδεμίαν ἔχει λύσιν.

4ον)

$$\chi + \sqrt{\chi^2 - 10\chi + 1} = 5$$

γράφομεν

$$\sqrt{\chi^2 - 10\chi + 1} = 5 - \chi.$$

ἔθεν

$$\chi^2 - 10\chi + 1 = 25 + \chi^2 - 10\chi$$

ἢ

$$0 = 24.$$

ἐπομένως καὶ ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις καὶ ἡ συζυγῆς αὐτῆς οὐδεμίαν ἔχουσι λύσιν.

Καὶ περισσότερα ριζικὰ (δευτέρου βαθμοῦ) ἐξαφανίζονται διὰ τῆς ἀλεπαλλήλου ὑψώσεως εἰς τὸ τετράγωνον, ὡς φαίνεται ἐκ τοῦ ἐπομένου παραδείγματος.

5ον)

$$\sqrt{\chi} + \sqrt{\chi - 9} = 9,$$

ὑψοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον ἀμφότερα τὰ μέλη, εὐρίσκομεν

$$\chi + \chi - 9 + 2 \cdot \sqrt{\chi^2 - 9\chi} = 81$$

ἢτοι

$$2\chi - 90 = -2 \sqrt{\chi^2 - 9\chi}$$

ἢ

$$\chi - 45 = -\sqrt{\chi^2 - 9\chi}. \quad (1)$$

ὑψοῦντες δὲ καὶ πάλιν εἰς τὸ τετράγωνον, εὐρίσκομεν

$$\chi^2 - 90\chi + 2025 = \chi^2 - 9\chi$$

ἔθεν

$$81\chi = 2025, \quad \text{ἐξ ἧς } \chi = 25.$$

Ἡ ἐξίσωσις  $81\chi = 2025$  εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν (1) καὶ τὴν συζυγῆ αὐτῆς  $\chi - 45 = \sqrt{\chi^2 - 9\chi}$ . τούτων δὲ πάλιν ἡ μὲν (1) εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὰς ἐξισώσεις

$$\sqrt{\chi} + \sqrt{\chi - 9} = 9$$

$$-\sqrt{\chi} - \sqrt{\chi - 9} = 9,$$

ἢ δὲ συζυγῆς τῇ (1) εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὰς

$$\sqrt{\chi} - \chi\sqrt{-9} = 9$$

$$-\sqrt{\chi} + \chi\sqrt{-9} = 9.$$

ὥστε ἡ εὐρεθεῖσα ἄνευ ριζικῶν ἐξίσωσις  $81\chi = 2025$  εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὰς τέσσαρας ταύτας ἐξισώσεις (αἵτινες προκύπτουσιν ἐκ τῆς δοθείσης, λαμβανομένης ἐκάστης ρίζης μετὰ τοῦ θετικοῦ ἢ μετὰ τοῦ ἀρνητικοῦ σημείου καθ' ἅπαντας τοὺς δυνατοὺς συνδυασμούς).

Ἐπειδὴ δὲ ἡ λύσις  $\chi=25$  ἀρμόζει (ὡς εὐκόλως βλέπει τις) εἰς τὴν δοθεῖσαν ἐξίσωσιν, συναγεται, ὅτι αἱ λοιπαὶ τρεῖς οὐδεμίαν ἔχουσι λύσιν.

ΣΗΜ. Αἱ ἐξισώσεις αἱ ἔχουσαι ριζικὰ λύνονται ἐνίοτε εὐκολώτερον διὰ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἀγνώστου. Οὕτως ἡ πρώτη, ἂν τεθῆ  $\sqrt{\chi}=\omega$ , ἀνάγεται εἰς τὴν  $\omega^2+\omega=20$ . ἐξ ἧς λύνοντες εὐρίσκομεν ἢ  $\omega=4$ , ἢ  $\omega=-5$  ἄρα  $\chi=16$  ἢ  $\chi=25$ .

Ἡ δὲ πέμπτη λύεται, ἂν τεθῆ  $\sqrt{\chi}=\omega$ , καὶ  $\sqrt{\chi-9}=\phi$ . διότι ἀνάγεται τότε εἰς τὸ σύστημα

$$\omega+\phi=9 \text{ καὶ } \omega^2-\phi^2=(\omega+\phi)(\omega-\phi)=9.$$

ἔθεν  $\omega+\phi=9$  καὶ  $\omega-\phi=1$ .

ἄρα  $\omega=5$ ,  $\phi=4$  καὶ ἐπομένως  $\chi=25$ .

Ἡ ἀλλαγὴ αὕτη ὠφελεῖ μάλιστα, ὅταν ὑπὸ τὸ ριζικὸν δὲν ὑπάρχη ἢ ἡ πρώτη δυνάμις τοῦ ἀγνώστου.

### Διτετράγωνοι ἐξισώσεις.

215. Οὕτω καλοῦνται αἱ ἐξισώσεις τοῦ τετάρτου βαθμοῦ, αἱ ἀρτίας μόνον δυνάμεις τοῦ ἀγνώστου περιέχουσαι, ἥτοι αἱ ἐξισώσεις τῆς μορφῆς

$$a\chi^4 + b\chi^2 = \gamma. \quad (1)$$

Ἐὰν τεθῆ  $\chi^2=\omega$ , ἔπεται καὶ  $\chi^4=\omega^2$  καὶ ἡ ἐξίσωσις γίνεται  $a\omega^2 + b\omega = \gamma$ , ἥτοι δευτέρου βαθμοῦ πρὸς τὸν ἀγνώστον  $\omega$ .

Εὐρεθεισῶν δὲ τῶν δύο τιμῶν τοῦ  $\omega$  ἐκ τῆς δευτεροβαθμίου ταύτης ἐξισώσεως, εὐρίσκομεν καὶ τὰς τιμὰς τοῦ  $\chi$  ἐκ τῆς ἐξισώσεως  $\chi^2=\omega$ .

Ἐστῶσαν  $\omega'$  καὶ  $\omega''$  αἱ δύο τιμαὶ τοῦ  $\omega$ . τότε ἔχομεν ἐκ μὲν τῆς πρώτης  $\chi^2=\omega'$ , ἔθεν  $\chi=\pm\sqrt{\omega'}$ , ἐκ δὲ τῆς δευτέρας  $\chi^2=\omega''$ , ἔθεν  $\chi=\pm\sqrt{\omega''}$ . ὥστε εὐρίσκονται τέσσαρες ρίζαι τῆς ἐξισώσεως (1)

$$+\sqrt{\omega'}, \quad -\sqrt{\omega'}, \quad +\sqrt{\omega''}, \quad -\sqrt{\omega''}.$$

Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον λύνοντες τὴν ἐξίσωσιν

$$\chi^4 - 13\chi^2 + 36 = 0$$

εὐρίσκομεν τὰς ρίζας  $+2$ ,  $-2$ ,  $+3$ ,  $-3$ .

### Προβλήματα.

1<sup>ον</sup>) Ἐμπορος πωλήσας πρᾶγμα τι ἀντὶ 16 δραχμῶν ἐζημιώθη τόσον τοῖς ἑκατόν, ὅσον εἶχεν ἀγοράσει αὐτό. Ζητεῖται ἀντὶ πόσων δραχμῶν εἶχεν ἀγοράσει τὸ πρᾶγμα.

Ἐὰν παρασταθῆ διὰ τοῦ  $\chi$  ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς, ἡ ζημία θὰ εἶναι  $\chi-16$ . Ἀλλὰ κατὰ τὸ πρόβλημα ἐζημιώθη τὸν τόκον τῶν  $\chi$  δραχ-

μῶν πρὸς  $\chi$  τοῖς ἑκατὸν (δι' ἓν ἔτος), ἦτο  $\frac{\chi^2}{100}$ . Ὅθεν ἔπεται ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος

$$\frac{\chi^2}{100} = \chi - 16.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι  $\chi$  θετικόν.

Ἐκ τῆς ἐξίσωσεως εὐρίσκομεν λύοντες

$$\eta \chi = 80, \quad \eta \chi = 20.$$

ἀμφότεραι δὲ αἱ λύσεις αὗται πληροῦσι πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

2ον) Ἠγόρασε τις ὕφασμα ἀντὶ 600 δραχμῶν. Ἐὰν δὲ ἀντὶ τῶν αὐτῶν χρημάτων ἐλάμβανεν 20 πήχεις περισσότερον, ἢ τιμὴ τοῦ πήχεως θὰ ἦτο κατὰ 5 δραχμὰς μικροτέρα. Πόσους πήχεις ἠγόρασεν;

Ἐστω  $\chi$  ὁ ἀριθμὸς τῶν πήχεων· ἡ τιμὴ τοῦ ἑνὸς πήχεως εἶναι  $\frac{600}{\chi}$  ἂν δὲ οἱ πήχεις ἦσαν  $\chi + 20$ , ἡ τιμὴ τοῦ ἑνὸς θὰ ἦτο  $\frac{600}{\chi + 20}$ . ὅθεν ἔπεται ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος

$$\frac{600}{\chi} - \frac{600}{\chi + 20} = 5,$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι καὶ  $\chi$  θετικόν.

Ἐκ τῆς ἐξίσωσεως ταύτης εὐρίσκομεν τὰς λύσεις,

$$\eta \chi = 40 \quad \eta \chi = -60,$$

ὧν μόνον ἡ πρώτη εἶναι παραδεκτὴ ὡς πληροῦσα πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

3ον) Ἐκ δύο ἐργατῶν ὁ εἰς εἰργάσθη 3 ἡμέρας περισσοτέρας τοῦ ἄλλου, ἔλαβον δὲ ὁμοῦ διὰ τὰ ἡμερομίσθιά των 147 δραχμὰς. Ἄλλ' ἂν ὁ πρῶτος εἰργάζετο ὅσας ὁ δεῦτερος ἡμέρας, θὰ ἐλάμβανεν 60 δραχμὰς· ἂν δὲ ὁ δεῦτερος εἰργάζετο ὅσας ὁ πρῶτος, θὰ ἐλάμβανεν 90. Πόσας ἡμέρας εἰργάσθη ἑκάτερος τῶν ἐργατῶν;

Ἐὰν παρυσταθῇ διὰ  $\chi$  ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν, καθ' ἃς εἰργάσθη ὁ πρῶτος, ὁ δεῦτερος εἰργάσθη ἡμέρας  $\chi - 3$ . Ἄν ὁ πρῶτος εἰργάζετο  $\chi - 3$  ἡμέρας, θὰ ἐλάμβανεν 60 δραχμὰς· ἐπομένως τὸ ἡμερομίσθιον του εἶναι  $\frac{60}{\chi - 3}$  καὶ ἐργασθεὶς  $\chi$  ἡμέρας ἔλαβεν  $\frac{60\chi}{\chi - 3}$ . Ἄν ὁ δεῦτερος εἰργάζετο  $\chi$  ἡμέρας, θὰ ἐλάμβανεν 90 δραχμὰς· ἐπομένως τὸ ἡμερομίσθιον του εἶναι  $\frac{90}{\chi}$  καὶ ἐργασθεὶς  $\chi - 3$  ἡμέρας ἔλαβεν  $\frac{90(\chi - 3)}{\chi}$ .



Ἐντεῦθεν προκύπτει ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος

$$\frac{90(\chi-3)}{\chi} + \frac{60\chi}{\chi-3} = 147.$$

πρέπει δὲ νὰ εἶναι ὁ  $\chi$  θετικὸς καὶ ἀκέραιος ἀριθμὸς καὶ μεγαλύτερος τοῦ 3.

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi=15$ , ἢ  $\chi=18$ . ἀμφότεραι δὲ αἱ λύσεις αὗται πληροῦσι πάντας τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος· ἐπομένως, ἢ ὁ πρῶτος εἰργάσθη 15 ἡμέρας καὶ ὁ δεῦτερος 12, ἢ ὁ πρῶτος 18 καὶ ὁ δεῦτερος 15.

4<sup>ον</sup>) Ἐμπορος πωλήσας 8 πήχεις υἰάσματος, ἔλαβε τόσας δραχμάς, ὅσους πήχεις ἔπρεπε νὰ πωλήσῃ, ἵνα λάβῃ 50 δραχμάς· πόσας δραχμάς ἔλαβεν ;

Ἐὰν παραστήσωμεν διὰ τοῦ  $\chi$  τὰς δραχμάς, τὰς ὁποίας ἔλαβε διὰ τοὺς 8 πήχεις, ἡ τιμὴ τοῦ ἑνὸς πήχεως εἶναι  $\frac{\chi}{8}$  καὶ ἵνα λάβῃ 50 δραχμάς,

ἔπρεπε νὰ πωλήσῃ πήχεις 50:  $\frac{\chi}{8}$ , ἥτοι  $\frac{400}{\chi}$ . εἶναι δὲ κατὰ τὸ πρό-

βλημα

$$\chi = \frac{400}{\chi}, \quad \text{ἢ} \quad \chi^2 = 400.$$

ἐκ τῆς ἐξισώσεως ταύτης εὐρίσκομεν λύοντες  
ἢ  $\chi=20$ , ἢ  $\chi=-20$ .

φανερὸν δέ, ὅτι μόνον ἡ πρώτη λύσις εἶναι παραδεκτὴ.

5<sup>ον</sup>) Ἐάν τις ἀριθμὸς αὐξηθῇ κατὰ μονάδα, ὁ κύβος αὐτοῦ αὐξάνεται κατὰ 721· τίς ὁ ἀριθμὸς οὗτος ;

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\chi$  παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, θὰ εἶναι

$$(\chi+1)^3 - \chi^3 = 721.$$

καὶ ἐπειδὴ εἶναι  $(\chi+1)^3 = \chi^3 + 3\chi^2 + 3\chi + 1$  (σελ. 35), ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος γίνεται  $3\chi^2 + 3\chi + 1 = 721$

$$\text{ἢ} \quad 3\chi^2 + 3\chi = 720.$$

$$\text{ὅθεν καὶ} \quad \chi^2 + \chi = 240.$$

λύοντες τὴν ἐξίσωσιν ταύτην εὐρίσκομεν τὰς δύο λύσεις

$$\text{ἢ} \quad \chi=15, \quad \text{ἢ} \quad \chi=-16.$$

6<sup>ον</sup>) Νὰ μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς 20 εἰς δύο μέρη τοιαῦτα, ὥστε τὰ τετράγωνα αὐτῶν νὰ διαφέρωσι κατὰ 120.

Παριστῶντες τὰ ἄγνωστα μέρη διὰ  $\chi$  καὶ  $\psi$ , θὰ ἔχωμεν

$$\begin{aligned} \chi + \psi &= 20 \\ \chi^2 - \psi^2 &= 120. \end{aligned}$$

ἐπειδὴ δὲ  $\chi^2 - \psi^2$  εἶναι ἴσον μὲ τὸ γινόμενον  $(\chi + \psi)(\chi - \psi)$ , ἤτοι μὲ τὸ  $20(\chi - \psi)$ , ἡ δευτέρα ἐξίσωσις γίνεται  $\chi - \psi = 6$ , καὶ αἱ ἐξισώσεις τοῦ προβλήματος γίνονται

$$\begin{aligned} \chi + \psi &= 20 \\ \chi - \psi &= 6, \end{aligned}$$

ἐξ ὧν προκύπτει ἡ λύσις  $\chi = 13 \quad \psi = 7$ .

7<sup>ον</sup>) Δύο ταχυδρόμοι ὁμαλῶς κινούμενοι ἀνεχώρησαν συγχρόνως ἐκ δύο πόλεων A καὶ B, ὁ μὲν πορευόμενος ἐκ τῆς A πρὸς τὴν B, ὁ δὲ ἐκ τῆς B πρὸς τὴν A. Συνέβη δὲ ὁ μὲν πρῶτος νὰ φθάσῃ εἰς τὴν πόλιν B ἐννέα ὥρας μετὰ τὴν συνάντησίν των, ὁ δὲ δεύτερος εἰς τὴν A δεκαεξὶ ὥρας μετ' αὐτήν. Ζητεῖται ὁ λόγος τῶν ταχυτήτων, μεθ' ὧν ἐβάδιζον.

A Γ B

Ἐστω  $\chi$  ἡ ταχύτης τοῦ ἐκ τῆς πόλεως A ἐκκινήσαντος καὶ  $\psi$  ἡ ταχύτης τοῦ ἐκ τῆς πόλεως B· ἔστω πρὸς τούτοις Γ τὸ σημεῖον τῆς ὁδοῦ AB, εἰς ὃ ἐγένετο ἡ συνάντησις τῶν ταχυδρόμων. Ὁ πρῶτος ταχυδρόμος διήνυσε τὸ διάστημα ΓB εἰς 9 ὥρας μὲ ταχύτητα  $\chi$ · ἄρα εἶναι  $\Gamma B = 9\chi$ . Ὁ δεύτερος διήνυσε τὸ διάστημα ΓA εἰς 16 ὥρας μὲ ταχύτητα  $\psi$ · ἄρα εἶναι  $\Gamma A = 16\psi$ .

Ἐπειδὴ δὲ συγχρόνως ἐξεκίνησαν καὶ συγχρόνως ἔφθασαν εἰς τὸ Γ, ἔπεται, ὅτι ὁ χρόνος, ἐν ᾧ διήνυσεν ὁ πρῶτος τὸ διάστημα ΑΓ (ὅστις εἶναι  $\frac{ΑΓ}{\chi}$  ἤτοι  $\frac{16\psi}{\chi}$ ), εἶναι ἴσος μὲ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ διήνυσεν ὁ δεύτερος τὸ διάστημα ΒΓ (οὗτος δὲ εἶναι  $\frac{ΒΓ}{\psi}$  ἢ  $\frac{9\chi}{\psi}$ ), ὥστε ἔχομεν

$$\frac{16\psi}{\chi} = \frac{9\chi}{\psi}, \text{ ἤτοι } 16\psi^2 = 9\chi^2,$$

ἐξ ἧς καὶ

$$\frac{\chi^2}{\psi^2} = \frac{16}{9},$$

καὶ ἐξάγοντες τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἀμφοτέρων τῶν ἴσων, εὐρίσκομεν

$$\frac{\chi}{\psi} = \frac{4}{3},$$

τοῦτ' ἔστιν ἡ ταχύτης τοῦ πρώτου εἶναι πρὸς τὴν τοῦ δευτέρου, ὅπως ὁ 4 πρὸς τὸν 3.

8<sup>ον</sup>) Εὐρεῖν δύο ἀριθμούς, γνωσιῶν ὄντων τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν α καὶ τοῦ γινομένου αὐτῶν γ.

Αἱ ἐξισώσεις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\begin{aligned} \chi + \psi &= \alpha \\ \chi\psi &= \gamma. \end{aligned} \quad (1)$$

Ἐὰν δὲ ἡ τιμὴ τοῦ  $\psi$  ληφθῆ ἐκ τῆς πρώτης καὶ τεθῆ εἰς τὴν δευτέραν, ἀπαλείφεται ὁ  $\psi$  καὶ εὐρίσκομεν

$$\begin{aligned} \chi(\alpha - \chi) &= \gamma \\ \chi^2 - \alpha\chi &= -\gamma. \end{aligned} \quad (2)$$

ἦτοι

$$\delta\theta\epsilon\nu \quad \chi = \frac{\alpha}{2} \pm \frac{\sqrt{\alpha^2 - 4\gamma}}{2}.$$

Ἄν ὁ  $\chi$  ληφθῆ ἴσος τῷ  $\frac{\alpha}{2} + \frac{\sqrt{\alpha^2 - 4\gamma}}{2}$ , ὁ  $\psi$  θὰ εἶναι ἴσος τῷ

$$\frac{\alpha}{2} - \frac{\sqrt{\alpha^2 - 4\gamma}}{2}, \text{ διότι τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι } \alpha. \text{ ἂν δὲ πάλιν ὁ } \chi$$

$$\text{ληφθῆ ἴσος τῷ } \frac{\alpha}{2} - \frac{\sqrt{\alpha^2 - 4\gamma}}{2}, \text{ ὁ } \psi \text{ θὰ εἶναι ἴσος τῷ } \frac{\alpha}{2} + \frac{\sqrt{\alpha^2 - 4\gamma}}{2}.$$

ἐπομένως οἱ ζητούμενοι δύο ἀριθμοὶ εἶναι οἱ

$$\frac{\alpha}{2} + \frac{\sqrt{\alpha^2 - 4\gamma}}{2} \text{ καὶ } \frac{\alpha}{2} - \frac{\sqrt{\alpha^2 - 4\gamma}}{2}, \quad (3)$$

τοῦτ' ἔστιν εἶναι αἱ δύο ρίζαι τῆς ἐξισώσεως (2).

**ΣΗΜ.** Ὅτι αἱ δύο ρίζαι τῆς ἐξισώσεως (2) ἔχουσιν ἄθροισμα  $\alpha$  καὶ γινόμενον  $\gamma$ , (ἐπομένως λύουσι τὸ πρόβλημα), ἦτο ἤδη γνωστὸν (211)· ὅτι ὅμως μόνον οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι λύουσι τὸ πρόβλημα, τοῦτο ἐδείχθη νῦν διὰ τῆς ἀμέσου λύσεως τοῦ προβλήματος.

**Διερεῦνησις.** Οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ θὰ εἶναι πραγματικοί, ἐὰν τὸ  $\alpha^2 - 4\gamma$  δὲν εἶναι ἀρνητικόν. Καὶ ἂν μὲν τὸ  $\gamma$  εἶναι ἀρνητικόν (ὅτε οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἕτεροειδεῖς), τὸ  $\alpha^2 - 4\gamma$  εἶναι πάντοτε θετικόν· ἂν δὲ τὸ  $\gamma$  εἶναι θετικόν (ὅτε οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ὁμοειδεῖς), δὲν πρέπει νὰ εἶναι ὁ  $4\gamma$  μεγαλύτερος τοῦ  $\alpha^2$ . Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι τὸ γινόμενον δύο ὁμοειδῶν ἀριθμῶν οὐδέποτε ὑπερβαίνει τὸ τέταρτον τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν, ἢ, ὅπερ τὸ αὐτό, ἐὰν δοθέντα ἀριθμὸν ( $\alpha$ ) μερῶσμεν ὁπωσδήποτε εἰς δύο ὁμοειδῆ μέρη, τὸ μέγιστον γινόμενον τῶν μερῶν τούτων εἶναι ἴσον τῷ τετάρτῳ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀριθμοῦ. Εὐρίσκεται δὲ τὸ μέγιστον τοῦτο γινόμενον, ὅταν μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς εἰς ἴσα μέρη· διότι, ἐὰν ὑποτεθῇ  $\gamma = \frac{\alpha^2}{4}$ , οἱ τύποι (3) δίδουσι τὰ δύο μέρη

$$\frac{\alpha}{2} \text{ καὶ } \frac{\alpha}{2}.$$

Και γενικῶς. Ἐὰν δοθέντα ἀριθμὸν μερίσωμεν εἰς ὁσαδήποτε ὁμοειδῆ μέρη, τὸ γινόμενον τῶν μερῶν τούτων γίνεται μέγιστον, ὅταν τὰ μέρη γίνωσιν ἴσα.

Διότι, ἂν δύο μέρη δὲν εἶναι ἴσα, ἔστωσαν λόγου χάριν 5 καὶ 7, καθιστῶντες αὐτὰ ἴσα χωρὶς νὰ βλάψωμεν τὸ ἄθροισμά των, ἦτοι λαμβάνοντες ἀντ' αὐτῶν τὰ 6, 6, εὐρίσκομεν γινόμενον 6.6 μεγαλύτερον τοῦ 5·7 ἄρα καὶ τὸ γινόμενον πάντων τῶν μερῶν θὰ γίνῃ μεγαλύτερον.

9<sup>ov</sup>) Εὐρεῖν δύο ἀριθμούς, γνωσιῶν ὄντων τῶν γινομένου αὐτῶν γ καὶ τοῦ ἀθροίσματος τῶν τετραγώνων αὐτῶν β.

Αἱ ἐξισώσεις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\chi^2 + \psi^2 = \beta \quad (1)$$

$$\chi\psi = \gamma.$$

Ἐὰν ἡ δευτέρα διπλασιασθεῖσα προστεθῇ εἰς τὴν πρώτην (κατὰ μέλη), προκύπτει

$$(\chi + \psi)^2 = \beta + 2\gamma.$$

ἐὰν δὲ ἀφαιρεθῇ, ἔπεται

$$(\chi - \psi)^2 = \beta - 2\gamma.$$

Ἐκ τούτων εὐρίσκομεν

$$\chi + \psi = \pm \sqrt{\beta + 2\gamma}, \quad \chi - \psi = \pm \sqrt{\beta - 2\gamma}.$$

Καὶ ἂν μὲν τὸ ἄθροισμα τῶν ζητούμενων ἀριθμῶν ὑποτεθῇ θετικόν, εὐρίσκομεν τοὺς δύο ἀριθμούς

$$\frac{1}{2}\sqrt{\beta + 2\gamma} + \frac{1}{2}\sqrt{\beta - 2\gamma} \quad \text{καὶ} \quad \frac{1}{2}\sqrt{\beta + 2\gamma} - \frac{1}{2}\sqrt{\beta - 2\gamma}.$$

ἂν δὲ τὸ αὐτὸ ἄθροισμα ὑποτεθῇ ἀρνητικόν, εὐρίσκονται οἱ ἀντίθετοι τούτων ἀριθμοί· φαίνεται δὲ καὶ ἐκ τῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος (1), ὅτι, ἂν ἀληθεύωσιν αὐταὶ διὰ δύο ἀριθμούς, ἀληθεύουσι καὶ διὰ τοὺς ἀντιθέτους αὐτῶν.

**Διερεῦνησις.** Ἀμφότεραι αἱ λύσεις θὰ εἶναι πραγματικαί, ἂν οἱ ἀριθμοὶ  $\beta + 2\gamma$  καὶ  $\beta - 2\gamma$  εἶναι θετικοί, ἦτοι ἂν εἶναι  $\beta$  θετικόν καὶ ὁ  $2\gamma$  (θετικῶς λαμβανόμενος) δὲν ὑπερβαίνῃ τὸν  $\beta$ .

10<sup>ov</sup>) Εὐρεῖν δύο ἀριθμούς, γνωσιῶν ὄντων τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν α καὶ τοῦ ἀθροίσματος τῶν τετραγώνων αὐτῶν β.

Αἱ ἐξισώσεις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\chi + \psi = \alpha \quad (1)$$

$$\chi^2 + \psi^2 = \beta.$$

Ἐψοῦντες ἀμφοτέρω τὰ μέλη τῆς πρώτης εἰς τὸ τετράγωνον, εὐρίσκομεν

$$\chi^2 + \psi^2 + 2\chi\psi = \alpha^2.$$

Ἐξ ἧς, ἀφαιροῦντες τὴν δευτέραν κατὰ μέλη, εὐρίσκομεν

$$2\chi\psi = \alpha^2 - \beta, \quad \eta \quad \chi\psi = \frac{\alpha^2 - \beta}{2}.$$

Ἐπειδὴ δὲ νῦν ἔχομεν  $\chi + \psi = \alpha$  καὶ  $\chi\psi = \frac{\alpha^2 - \beta}{2}$ , ἀνάγεται τὸ πρό-

βλημα εἰς τὸ 8<sup>ον</sup>.

Δύναται δὲ νὰ λυθῆ τὸ πρόβλημα τοῦτο καὶ διὰ τῆς ἀπαλοιφῆς τοῦ ἑτέρου τῶν ἀγνώστων ἐκ τῶν δύο ἐξισώσεων (1)· πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ ληφθῆ ἡ τιμὴ αὐτοῦ ἐκ τῆς πρώτης καὶ νὰ τεθῆ εἰς τὴν δευτέραν.

Οἱ ζητούμενοι δύο ἀριθμοὶ εἶναι

$$\frac{\alpha}{2} + \frac{\sqrt{2\beta - \alpha^2}}{2} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\alpha}{2} - \frac{\sqrt{2\beta - \alpha^2}}{2} \quad (2)$$

**Διερεῦνησις.** Οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι θὰ εἶναι πραγματικοί, ἂν εἶναι  $2\beta$  θετικὸν καὶ μεγαλύτερον ἢ τοῦλάχιστον ἴσον πρὸς τὸ  $\alpha^2$ . εἰ δὲ μὴ, εἶναι μιγάδες.

Ἐκ τούτου συνάγεται, ὅτι, ἐὰν ἀριθμὸς μερισθῆ ὀπωσδήποτε εἰς δύο μέρη, τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν μερῶν τούτων θὰ εἶναι τοῦλάχιστον ἴσον πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀριθμοῦ. Τοῦτο δὲ τὸ ἐλάχιστον ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν δύο μερῶν εὐρίσκεται, ἐὰν τὰ δύο μέρη εἶναι ἴσα.

\* 11<sup>ον</sup>) Εὐρεῖν δύο ἀριθμούς, γνωστῶν ὄντων τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν  $a$  καὶ τοῦ ἀθροίσματος τῶν κύβων αὐτῶν  $\kappa$ .

Αἱ ἐξισώσεις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\begin{aligned} \chi + \psi &= a \\ \chi^3 + \psi^3 &= \kappa. \end{aligned} \quad (1)$$

Ἴνα λύσωμεν ταύτας, ὑψοῦμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς πρώτης εἰς τὸν κύβον· ὅτε εὐρίσκομεν

$$\chi^3 + \psi^3 + 3\chi^2\psi + 3\chi\psi^2 = a^3.$$

Ἐξ ἧς ἀφαιροῦντες τὴν δευτέραν κατὰ μέλη, ἔχομεν

$$3\chi^2\psi + 3\chi\psi^2 = a^3 - \kappa$$

ἢ

$$3\chi\psi(\chi + \psi) = a^3 - \kappa.$$

καὶ ἀντικαθιστῶντες τὸ ἄθροισμα  $\chi + \psi$  ὑπὸ τοῦ ἴσου αὐτῶ  $a$ , ἔχομεν

$$3a\chi\psi = a^3 - \kappa$$

ἢ

$$\chi\psi = \frac{a^3 - \kappa}{3a}.$$

Ἐχομεν ἄρα τὸ ἄθροισμα καὶ τὸ γινόμενον τῶν ζητουμένων ἀριθμῶν· ἐπομένως τὸ πρόβλημα ἀνήχθη εἰς τὸ 8<sup>ον</sup>.

Οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ εἶναι

$$\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\kappa - \alpha^3}{3\alpha}} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\alpha}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\kappa - \alpha^3}{3\alpha}}$$

**Διερεῦνησις.** Γράφοντες τὴν ὑπόρριζον παράστασιν ὑπὸ τὴν μορφήν

$$\frac{4\kappa}{3\alpha} - \frac{\alpha^2}{3}$$

βλέπομεν, ὅτι, ἵνα οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι εἶναι πραγματικοί, ἀνάγκη τὰ  $\alpha$  καὶ  $\kappa$  νὰ εἶναι ὁμοειδῆ καὶ νὰ εἶναι  $4\kappa$  οὐχὶ μικρότερον τοῦ  $\alpha^3$ . Ἐξ οὗ συναγεται, ὅτι, ἐὰν ἀριθμὸς μερισθῆ ὀπωσδήποτε εἰς δύο μέρη, τὸ ἄθροισμα τῶν κύβων τῶν μερῶν τούτων θὰ εἶναι τοῦλάχιστον ἴσον πρὸς τὸ τέταρτον τοῦ κύβου τοῦ ἀριθμοῦ. Τοῦτο δὲ τὸ ἐλάχιστον ἄθροισμα τῶν κύβων τῶν μερῶν γίνεται, διὰ τὰ δύο μέρη εἶναι ἴσα.

\*12<sup>ον</sup>) Εὐρεῖν δύο ἀριθμούς, γνωστῶν ὄντων τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν  $\alpha$  καὶ τοῦ ἀθροίσματος τῶν τετάρτων δυνάμεων αὐτῶν  $\tau$ .

Πρὸς τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ λυθῆ τὸ σύστημα

$$\begin{aligned} \chi + \psi &= \alpha \\ \chi^4 + \psi^4 &= \tau, \end{aligned} \tag{1}$$

λύεται δὲ τοῦτο ὡς ἐξῆς.

Τετραγωνίζοντες τὴν πρώτην λαμβάνομεν

$$\chi^2 + \psi^2 + 2\chi\psi = \alpha^2, \tag{2}$$

τετραγωνίζοντες δὲ καὶ ταύτην εὐρίσκομεν

$$\chi^4 + \psi^4 + 6\chi^2\psi^2 + 4\chi^3\psi + 4\chi\psi^3 = \alpha^4,$$

ἐξ ἧς ἀφαιροῦντες τὴν δευτέραν εὐρίσκομεν

$$6\chi^2\psi^2 + 4\chi\psi(\chi^2 + \psi^2) = \alpha^4 - \tau.$$

Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἐξίσωσιν ταύτην ἀντικαταστήσωμεν τὸ  $\chi^2 + \psi^2$  διὰ τοῦ ἴσου αὐτῆ  $\alpha^2 - 2\chi\psi$  ἐκ τῆς ἐξίσωσεως (2), εὐρίσκομεν

$$(\chi\psi)^2 - 2\alpha^2(\chi\psi) = \frac{\tau - \alpha^4}{2}. \tag{3}$$

περιέχει δὲ ἡ ἐξίσωσις αὕτη ἓνα μόνον ἄγνωστον, τούτέστι τὸ γινόμενον  $\chi\psi$ . ὅθεν λύοντες αὐτὴν εὐρίσκομεν τὸ γινόμενον  $\chi\psi$  τῶν ζητουμένων ἀριθμῶν ἔχοντες δὲ τὸ ἄθροισμα καὶ τὸ γινόμενον αὐτῶν, ἀνάγομεν τὸ πρόβλημα εἰς τὸ 8<sup>ον</sup>.

Ἐκ τῆς ἐξίσωσεως (3) εὐρίσκονται αἱ ἐπόμεναι δύο τιμαὶ τοῦ  $\chi\psi$

$$\alpha^2 - \sqrt{\frac{\alpha^4 + \tau}{2}}, \quad \alpha^2 + \sqrt{\frac{\alpha^4 + \tau}{2}}$$

Καὶ ἂν μὲν λάβωμεν τὴν πρώτην ὡς γινόμενον τῶν δύο ζητουμένων ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν τοὺς δύο ἀριθμούς,

$$\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{-3\alpha^2 + \sqrt{8\tau + 8\alpha^4}}$$

$$\frac{\alpha}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{-3\alpha^2 + \sqrt{8\tau + 8\alpha^4}}.$$

ἂν δὲ τὴν δευτέραν, εὐρίσκομεν τοὺς ἐκ τούτων προκύπτοντας, ὅταν τὸ ριζικὸν  $\sqrt{8\tau + 8\alpha^4}$  ληφθῆ μετὰ τοῦ ἀρνητικοῦ σημείου· ἐπομένως τὸ δεύτερον τοῦτο ζεῦγος εἶναι μιγάδες ἀριθμοί.

**Διερεῦνσις.** Ἡ πρώτη λύσις ἀποτελεῖται ἐκ πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἐὰν ἢ  $\sqrt{8\tau + 8\alpha^4}$  δὲν εἶναι μικροτέρα τοῦ  $3\alpha^2$ , ἤτοι, ἂν ὁ ἀριθμὸς  $8\tau + 8\alpha^4$  δὲν εἶναι μικρότερος τοῦ  $9\alpha^4$ . ἤτοι ἂν ὁ  $\tau$  εἶναι θετικὸς καὶ ὄχι μικρότερος τοῦ ὀγδόου τοῦ  $\alpha^4$ . ἐξ ὧν συνάγεται, ὅτι, ἐὰν ἀριθμὸς μερισθῆ ὁπωσδήποτε εἰς δύο μέρη, τὸ ἄθροισμα τῶν τετάρτων δυνάμεων τῶν μερῶν εἶναι τοῦλάχιστον ἴσον πρὸς τὸ ὄγδοον τῆς τετάρτης δυνάμεως τοῦ ἀριθμοῦ.

\* 13ον) *Εὑρεῖν δύο ἀριθμούς, γνωστῶν ὄντων τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν  $\alpha$  καὶ τοῦ ἀθροίσματος τῶν πέμπτων δυνάμεων αὐτῶν  $\pi$ .*

Αἱ ἐξισώσεις τοῦ προβλήματος εἶναι

$$\chi + \psi = \alpha$$

$$\chi^5 + \psi^5 = \pi. \tag{1}$$

Ἴνα λύσωμεν αὐτάς, ὑποῦμεν τὴν πρώτην εἰς τὸν κύβον, ὅτε εὐρίσκομεν

$$\chi^3 + \psi^3 + 3\chi\psi(\chi + \psi) = \alpha^3. \tag{2}$$

ἔπειτα τὴν αὐτὴν πρώτην ὑποῦμεν εἰς τὴν πέμπτην δύναμιν (ἦ, ὅπερ τὸ αὐτό, πολλαπλασιάζομεν τὴν (2) ἐπὶ τὴν πρώτην τετραγωνισθεῖσαν), ὅτε εὐρίσκομεν

$$\chi^5 + \psi^5 + 5\chi\psi(\chi^3 + \psi^3) + 10\chi^2\psi^2(\chi + \psi) = \alpha^5.$$

Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἐξίσωσιν ταύτην ἀντικαταστήσωμεν τὸ ἄθροισμα  $\chi^5 + \psi^5$  ὑπὸ τοῦ ἴσου του  $\pi$ , τὸ δὲ ἄθροισμα  $\chi^3 + \psi^3$  ἐκ τῆς ἐξισώσεως (2) ὑπὸ τοῦ ἴσου του  $\alpha^3 - 3\chi\psi(\chi + \psi)$  καὶ τέλος τὸ  $\chi + \psi$  ὑπὸ τοῦ ἴσου του  $\alpha$ , εὐρίσκομεν τὴν ἐξίσωσιν

$$(\chi\psi)^2 - \alpha^2(\chi\psi) = \frac{\pi - \alpha^5}{5\alpha}.$$

ἐξ ἧς εὐρίσκομεν, ὅτι τὸ  $\chi\psi$  εἶναι ἴσον πρὸς τὸν ἕτερον τῶν ἀριθμῶν

$$\eta \quad \frac{\alpha^2}{2} - \sqrt{\frac{4\pi + \alpha^5}{20\alpha}}, \quad \eta \quad \frac{\alpha^2}{2} + \sqrt{\frac{4\pi + \alpha^5}{20\alpha}}.$$

Και ἂν μὲν λάβωμεν τὸν πρῶτον ὡς γινόμενον τῶν ζητούμενων ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν τοὺς δύο ἀριθμοὺς

$$\frac{\alpha}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{-\alpha^2 + 2\sqrt{\frac{4\pi + \alpha^5}{5\alpha}}} \quad (4)$$

εἰάν δὲ λάβωμεν τὸν δεύτερον, εὐρίσκομεν τοὺς ἐκ τούτων προκύπτοντας, ὅταν ἡ ἐντὸς τῆς ἄλλης ρίζα ληφθῆ μετὰ τοῦ σημείου —, ἐπομένως τὸ δεύτερον τοῦτο ζεύγος εἶναι μιγάδες ἀριθμοί.

**Διερεύνησις.** Οἱ δύο ἀριθμοὶ (4), οἱ τὴν πρώτην λύσιν ἀποτελοῦντες, θὰ εἶναι πραγματικοί, ἂν τὸ ὑπόριζον  $\frac{4\pi + \alpha^5}{5\alpha}$  εἶναι θετικὸν καὶ ἡ ρίζα οὐχὶ μικροτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ  $\alpha^2$ . τούτέστιν ἂν εἶναι

$$2\sqrt{\frac{4\pi + \alpha^5}{5\alpha}} \geq \alpha^2, \quad \text{ἤτοι} \quad 4 \cdot \frac{4\pi + \alpha^5}{5\alpha} \geq \alpha^4.$$

ὅθεν ἐπεταὶ 
$$\frac{16\pi}{5\alpha} + \frac{4\alpha^4}{5} \geq \alpha^4, \quad \text{ἤτοι} \quad \frac{\pi}{\alpha} \geq \frac{\alpha^4}{16}.$$

τούτέστιν, ἵνα τὸ πρόβλημα ἐπιδέχεται πραγματικὴν τινα λύσιν, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι  $\pi$  καὶ  $\alpha$  ὁμοειδῆ καὶ ὁ  $\pi$  νὰ εἶναι τοῦλάχιστον ἴσος πρὸς τὸ δέκατον ἕκτον τοῦ  $\alpha^5$ . Θὰ ἀποτελεῖται δὲ ἡ λύσις ἐξ ὁμοειδῶν ἀριθμῶν, ἂν τὸ γινόμενον  $\chi\psi$  εἶναι θετικόν, τούτέστιν ἂν εἶναι

$$\frac{\alpha^4}{4} > \frac{4\pi + \alpha^5}{20\alpha}, \quad \text{ἤτοι} \quad \alpha^4 > \frac{\pi}{\alpha}.$$

ἤτοι ἂν ὁ  $\pi$  δὲν ὑπερβαίνει τὴν πέμπτην δύναμιν τοῦ  $\alpha$ .

**ΣΗΜ.** Ἐκ τῶν τριῶν τελευταίων προβλημάτων βλέπομεν, ὅτι καὶ ἐξισώσεις ἀνωτέρου βαθμοῦ δύνανται ἐνίοτε νὰ ἀναχθῶσιν εἰς ἐξισώσεις τοῦ δευτέρου βαθμοῦ.

### Προβλήματα γεωμετρικά.

Ἐν τῇ γεωμετρίᾳ ἐμάθομεν ἤδη, ὅτι πᾶσα γραμμὴ μετρεῖται καὶ παρίσταται ὑπὸ τινος ἀριθμοῦ· καὶ τάνάπαινον, ὅτι πᾶς ἀριθμὸς παρίσταται γραμμῆν, ὅταν ὀρίσθῃ ἡ γραμμὴ, ἣν παρίσταται ἡ μονάς. Δυνάμεθα ἐπομένως νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸν ἀλγεβρικὸν λογισμὸν ἐπὶ γεωμετρικῶν προβλημάτων.

14<sup>ov</sup>) Διαιρέσαι τὴν δοθεῖσαν εὐθεΐαν  $AB$  μέσον καὶ ἄκρον λόγον. τούτέστιν εἰς δύο μέρη, ὧν τὸ ἕτερον νὰ εἶναι μέσον ἀνάλογον μεταξὺ τῆς ὅλης εὐθείας καὶ τοῦ ἕτερου μέρους.

A

M

B



Ἐστω  $\alpha$  ὁ τὴν δοθεῖσαν γραμμὴν  $AB$  παριστῶν ἀριθμὸς καὶ  $\chi$  ὁ παριστῶν τὸ ἄγνωστον μέρος αὐτῆς  $AM$ , τὸ ὁποῖον θὰ εἶναι μέσον ἀνάλογον· τότε τὸ λοιπὸν μέρος  $MB$  θὰ παριστᾶται ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ  $\alpha - \chi$ .  
Θὰ εἶναι δὲ

$$\alpha : \chi = \chi : \alpha - \chi, \text{ ἤτοι } (\alpha - \chi)\alpha = \chi^2.$$

Πρέπει δὲ νὰ εἶναι καὶ  $\chi$  θετικὸν καὶ μικρότερον τοῦ  $\alpha$ .

Λύοντες τὴν ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν  $\chi = -\frac{\alpha}{2} \pm \frac{\alpha}{2}\sqrt{5}$ · ἐκ δὲ τού-

των τῶν τιμῶν μόνη ἡ πρώτη, ἡ  $\frac{\alpha}{2}(\sqrt{5} - 1)$ , πληροῖ πάντας τοὺς

ἄλλους τοῦ προβλήματος καὶ παριστᾶ τὸ μῆκος τοῦ ζητουμένου μέρους  $AM$ .

**Παρατήρησις** Τὸ πρόβλημα τοῦτο δύναται νὰ προταθῆ καὶ γενικώτερον ὡς ἑξῆς.

Ἐπὶ εὐθείας ἀπεράντου δίδονται δύο σημεῖα  $A$  καὶ  $B$ , ὧν ἡ ἀπόστασις μετρεῖται ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ  $\alpha$ . Ζητεῖται δὲ νὰ εὐρεθῆ σημεῖον τῆς εὐθείας τοιοῦτον, ὥστε ἡ ἀπὸ τοῦ  $A$  ἀπόστασις αὐτοῦ νὰ εἶναι μέση ἀνάλογος μεταξὺ τῆς ἀποστάσεως αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ  $B$  καὶ τῆς  $AB$ .

M                  A                  M                  B                  M

Τὸ ζητούμενον σημεῖον  $M$  δύναται νὰ ὑποτεθῆ κείμενον ἢ μεταξὺ τοῦ  $A$  καὶ  $B$ , ἢ ὀπισθεν τοῦ  $A$ , ἢ πέραν τοῦ  $B$ . Τὸ πρόβλημα ἄρα διαίρεται εἰς τρία· καὶ αἱ τρεῖς αὐτοῦ περιπτώσεις δίδουσι τὰς ἐπομένους ἐξισώσεις· ( $\chi$  παριστᾶ τὴν ἀπόστασιν  $AM$ ).

Ἡ πρώτη  $\chi^2 = \alpha(\alpha - \chi)$       περιορ.  $0 < \chi < \alpha$ .

Ἡ δευτέρα  $\chi^2 = \alpha(\alpha + \chi)$       περιορ.  $\chi$  θετικόν.

Ἡ τρίτη  $\chi^2 = \alpha(\chi - \alpha)$       περιορ.  $\chi > \alpha$ .

Αἱ δύο πρῶται περιπτώσεις δύνανται νὰ συμπεριληφθῶσιν εἰς μίαν, ἂν οἱ ἀριθμοὶ οἱ μετροῦντες τὰς ἀπὸ τοῦ  $A$  ἀποστάσεις λαμβάνωνται θετικοὶ μὲν διὰ τὰ ἔμπροσθεν τοῦ  $A$  σημεῖα, ἀρνητικοὶ δὲ διὰ τὰ ὀπισθεν· διότι τότε ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐξίσωσει πρέπει νὰ γραφῆ ἀντὶ τοῦ  $\chi$  ὁ  $-\chi$ · τοῦτο δὲ τρέπει αὐτὴν εἰς τὴν πρώτην· ὥστε ἡ εὐρεθεῖσα ἀρνητικὴ λύσις τῆς πρώτης ἐξισώσεως εἶναι θετικὴ λύσις τῆς δευτέρας, καὶ ἐπομένως δίδει σημεῖον τι ὀπισθεν τοῦ  $A$  κείμενον καὶ πληροῦν τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

Ἡ τρίτη ἐξίσωσις οὐδεμίαν λύσιν πραγματικὴν ἔχει· ὥστε οὐδὲν σημεῖον τοιοῦτον ὑπάρχει πέραν τοῦ  $B$ .

15<sup>ον</sup>) Δίδονται ἐπ' εὐθείας ἰεσσαρα σημεῖα, τὰ  $A, B, \Gamma, \Delta$ , καὶ ζη-

τεῖται νὰ εὐρεθῇ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας σημεῖον τοιοῦτον, ὥστε αἱ ἀποστάσεις αὐτοῦ ἀπὸ τῶν τεσσάρων σημείων νὰ ἀποτελῶσιν ἀναλογίαν· τούτεστι νὰ εἶναι  $AM:BM=GM:\Delta M$ ,

A                      B                      Γ                      Δ

Τὸ ζητούμενον σημεῖον M δύναται νὰ ὑποθεθῇ κείμενον ἢ ὀπισθεν τοῦ A, ἢ μεταξὺ A καὶ B, ἢ μεταξὺ B καὶ Γ, ἢ μεταξὺ Γ καὶ Δ, ἢ τέλος πέραν τοῦ Δ· τὸ πρόβλημα ἄρα διαιρεῖται εἰς πέντε, καὶ ἂν οἱ θετικοὶ ἀριθμοί, οἱ τὰς ἀποστάσεις AM, AB, AΓ, AΔ μετροῦντες, παρασταθῶσι κατὰ σειρὰν διὰ  $\chi, \beta, \gamma, \delta$ , αἱ ῥηθεῖσαι πέντε ὑποθέσεις δίδουσι τὰς ἐπομένους ἐξισώσεις·

ἡ 1η	$\chi(\beta + \gamma - \delta) + \beta \cdot \gamma = 0,$	περ. $\chi > 0,$
ἡ 2α	$2\chi^2 - (\beta + \gamma + \delta)\chi + \beta\gamma = 0,$	περ. $0 < \chi < \beta,$
ἡ 3η	$\chi(\beta + \gamma - \delta) - \beta\gamma = 0,$	περ. $\beta < \chi < \gamma,$
ἡ 4η	$2\chi^2 - (\beta + \gamma + \delta)\chi + \beta\gamma = 0,$	περ. $\gamma < \chi < \delta,$
ἡ 5η	$\chi(\beta + \gamma - \delta) - \beta\gamma = 0,$	περ. $\chi > \delta$

**Διερεῦνησις.** Ἡ πρώτη περίπτωσις ἐπιδέχεται λύσιν, ἂν εἶναι  $\delta > \beta + \gamma$ · διότι τότε ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$  ἢ ἐκ τῆς ἐξισώσεως λαμβανομένη εἶναι θετικὴ· ἀλλ' ἂν εἶναι  $\delta < \beta + \gamma$ , ἢ  $\delta = \beta + \gamma$ , ἡ πρώτη περίπτωσις εἶναι ἀδύνατος.

Ἡ τρίτη περίπτωσις εἶναι πάντοτε ἀδύνατος· διότι ἡ ἐκ τῆς ἐξισώσεως αὐτῆς εὐρισκομένη τιμὴ τοῦ  $\chi$  δὲν εἶναι μικροτέρα τοῦ  $\gamma$ .

Ἡ πέμπτη περίπτωσις ἐπιδέχεται λύσιν, μόνον ἂν εἶναι  $\delta < \beta + \gamma$ · διότι τότε ἡ τιμὴ τοῦ  $\chi$  εἶναι θετικὴ καὶ ὑπερβαίνει τὸν  $\delta$ .

Ἡ δευτέρα καὶ ἡ τετάρτη ἐπιδέχονται ἀνὰ μίαν λύσιν πάντοτε· διότι ἡ κοινὴ αὐτῶν ἐξισώσις ἔχει δύο πραγματικὰς καὶ ἀνίσους ῥίζας, ὧν ἡ μὲν κεῖται μεταξὺ 0 καὶ  $\beta$ , ἡ δὲ μεταξὺ  $\gamma$  καὶ  $\delta$ · βεβαιούμεθα δὲ περὶ τούτου, ἂν παρατηρήσωμεν, ὅτι οἱ ἀριθμοὶ 0 καὶ  $\beta$  ἀντικαθιστῶντες τὸ  $\chi$  ἐν τῇ πολυωνύμῳ  $2\chi^2 - (\beta + \gamma + \delta)\chi + \beta\gamma$  παρέχουσι ἐξαχόμενα ἕτεροειδή· ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $\gamma$  καὶ  $\delta$  (σελ. 156 Παρατηρ.).


Ὡστε ἐν συνόλῳ τὸ πρόβλημα ἐπιδέχεται τρεῖς λύσεις, ἂν  $\delta$  καὶ  $\beta + \gamma$  εἶναι ἄνισα, εἰ δὲ μὴ, δύο· εὐρίσκεται δὲ τὸ ἐν ἐκ τῶν τριῶν σημείων τῶν μικρότερα ἐπὶ τῆς εὐθείας, ὅσῳ ὀλιγώτερον διαφέρουσι τὰ  $\beta + \gamma$  καὶ  $\delta$ .

**Παρατήρησις.** Ἐνίοτε πρόβλημά τι, ἵνα λυθῇ, διαιρεῖται εἰς πολλὰς περιπτώσεις, ἐκάστη τῶν ὁποίων παρέχει ἰδίαν ἐξίσωσιν (τοι-αῦτα ἦσαν τὰ δύο τελευταῖα προβλήματα)· ἐκάστη τῶν περιπτώσεων τούτων θεωρεῖται τότε καὶ ἐξετάζεται ὡς ἴδιον πρόβλημα.

Δυνατὸν δὲ δύο περιπτώσεις τοῦ προβλήματος νὰ ἀποκλείωσιν ἀλλή-  
 λας, τουτέστιν ἀληθεύουσας τῆς ἐτέρας ἐξ αὐτῶν νὰ εἶναι ἡ ἐτέρα ἀδύνα-  
 τος, καὶ τἀνάπαλιν, τὸ ἀδύνατον τῆς ἐτέρας νὰ δεικνύῃ τὴν ἀλήθειαν τῆς  
 ἄλλης. Ἐάν, παραδείγματος χάριν, πρόκειται ἔν τινι προβλήματι νὰ ὀρι-  
 σθῆ ἔν ἐπιπέδῳ ἡ θέσις εὐθείας τινὸς ἀγνώστου πρὸς δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἐν  
 τῷ ἐπιπέδῳ κειμένην, δύνανται νὰ γίνωσι δύο ὑποθέσεις ἀποκλείουσαι  
 ἀλλήλας, ἡ ὅτι ἡ ζητούμενη εὐθεῖα τέμνει πῶς τὴν δοθεῖσαν, ἡ ὅτι εἶναι  
 παράλληλοι· φανερόν δὲ εἶναι, ὅτι, ἂν ἡ ἐξίσωσις, τὴν ὁποίαν ἡ πρώτη  
 ὑπόθεσις παρέχει, ἀληθεύῃ, ἡ δευτέρα ὑπόθεσις εἶναι ἀδύνατος· ἂν δὲ  
 ἡ ῥηθεῖσα ἐξίσωσις εἶναι ἀδύνατος, ἡ δευτέρα ὑπόθεσις ἀληθεύει.

16<sup>ον</sup>) *Εἰς δοθὲν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ νὰ ἐγγραφῆ ὀρθογώνιον  
 ἔχον περίμετρον ἴσην πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν καθέτων τοῦ τριγώνου  
 πλευρῶν ΑΒ καὶ ΑΓ καὶ μίαν τῶν κορυφῶν αὐτοῦ εἰς τὸ Α.*

Ἐκαστον σημεῖον τῆς ὑποτείνουσας ΒΓ εἶναι κορυφή ἐγγεγραμμένου ὀρθο-  
 γωνίου, ὅπερ εὐρίσκομεν ἄγοντες ἐξ αὐ-  
 τοῦ τὰς καθέτους ἐπὶ τὰς πλευράς ΑΒ  
 καὶ ΑΓ τῆς ὀρθῆς γωνίας Α· διὰ τοῦτο  
 ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν ἐπὶ τῆς ὑποτείνουσας τὴν κορυφὴν τοῦ ζητουμένου  
 ὀρθογωνίου.



Ἐστῶσαν β καὶ γ οἱ τὰς πλευράς ΑΓ καὶ ΑΒ παριστῶντες ἀριθμοί,  
 χ δὲ καὶ ψ οἱ παριστῶντες τὰς ἀποστάσεις τοῦ ζητουμένου σημείου Μ  
 ἀπὸ τῶν πλευρῶν ΑΓ καὶ ΑΒ.

Ἐν πρώτοις θὰ εἶναι  $2\chi + 2\psi = \beta + \gamma$ .

Ἐάν δὲ ἀχθῆ ἡ ΑΜ, διαίρει τὸ δοθὲν τρίγωνον εἰς δύο τρίγωνα,  
 τὰ ΑΜΒ καὶ ΑΜΓ, ἐξ ὧν τὸ πρῶτον ἔχει βάσιν ΑΒ καὶ ὕψος ΜΠ, τὸ  
 δὲ δεύτερον ἔχει βάσιν ΑΓ καὶ ὕψος ΜΚ. Ἐκφράζοντες δέ, ὅτι τὰ ἐμ-  
 βαδᾶ αὐτῶν ἀποτελοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δοθέντος τριγώνου, εὐρίσκο-  
 μεν τὴν ἐξίσωσιν

$$\beta\chi + \gamma\psi = \beta\gamma. \quad (2)$$

περιορ.  $0 < \chi < \gamma$  καὶ  $0 < \psi < \beta$ .

Ἐκ τῶν ἐξισώσεων τούτων ὑποθέτοντες β ἄνισον τῷ γ, εὐρίσκομεν


$$\chi = \frac{1}{2} \gamma \text{ καὶ } \psi = \frac{1}{2} \beta$$

τοῦτ' ἔστιν ἡ κορυφὴ τοῦ ζητουμένου ὀρθογωνίου κεῖται εἰς τὸ μέσον  
 τῆς ὑποτείνουσας.

Ἐὰν ὁμῶς εἶναι  $\beta = \gamma$ , ἤτοι, ἂν τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον εἶναι καὶ ἰσοσκελές, αἱ δύο ἐξισώσεις καταντῶσι μίᾳ μόνῃ καὶ τὸ σύστημα ἀποβαίνει ἀόριστον· ὥστε πᾶν σημεῖον τῆς ὑποτείνουσας εἶναι κορυφὴ ὀρθογωνίου πληροῦντος τοὺς ὅρους τοῦ προβλήματος.

17<sup>ον</sup>) Τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου  $AB\Gamma$  ἀξάνεται μὲν ἡ πλευρὰ  $AG$  κατὰ ἕνα εὐθεῖαν  $\Gamma\Gamma'$ , ἐλοιπῶνται δὲ ἡ  $AB$  κατὰ τὴν ἴσην  $BB'$ . Ζητεῖται, ἂν ἀχθῇ ἡ  $B'\Gamma'$ , εἰς ποῖον σημεῖον θὰ τέμνη τὴν ὑποτείνουσαν  $B\Gamma$ .

\* Ἄς ἀχθῶσιν αἱ  $MP$  καὶ  $MK$  ἐκ τοῦ  $M$  κάθετοι ἐπὶ τὰς πλευρὰς  $AB$



καὶ  $AG$  καὶ ἄς νοηθῶσιν αἱ εὐθεῖαι τοῦ σχήματος πᾶσαι μεμετρημέναι καὶ ὑπ' ἀριθμῶν παριστώμεναι.

Ἡ τομὴ  $M$  θὰ εἶναι γνωστὴ, ὅταν εὐρεθῶσιν οἱ τὰς ἀποστάσεις  $PM$  καὶ  $KM$  μετροῦντες ἀριθμοί, οἵτινες ἔστωσαν  $\psi$  καὶ  $\chi$ · πρὸς τούτοις ἄς παριστᾶ τὰς εὐθείας  $BB'$  καὶ  $\Gamma\Gamma'$  ὁ  $\epsilon$ , καὶ τὰς πλευρὰς τοῦ τριγώνου οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$  (τὴν  $B\Gamma$ ),  $\beta$  (τὴν  $AG$ ) καὶ  $\gamma$  (τὴν  $AB$ ). Ἄν ἀχθῇ ἡ  $AM$ , διαίρει τὸ τρίγωνον  $AB\Gamma$  εἰς δύο, τὰ  $AMB$  καὶ  $AM\Gamma$ · ὡσαύτως διαίρει καὶ τὸ τρίγωνον  $AB'\Gamma'$  εἰς δύο, τὰ  $AMB'$  καὶ  $AM\Gamma'$ . Ἐκ τούτων εὐρίσκομεν ὡς καὶ ἐν τῷ προηγουμένῳ προβλήματι

$$\beta\chi + \gamma\psi = \beta\gamma \quad (1)$$

$$\text{καὶ} \quad (\beta + \epsilon)\chi + (\gamma - \epsilon)\psi = (\beta + \epsilon)(\gamma - \epsilon).$$

Ἐξ ὧν ἐπεταὶ τὸ σύστημα

$$(2) \quad \begin{cases} \beta\chi + \gamma\psi = \beta\gamma \\ \epsilon(\chi - \psi) = \epsilon(\gamma - \beta - \epsilon) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{περιορ.} \\ 0 < \chi < \gamma \\ 0 < \psi < \beta. \end{array}$$

Ἐκ τοῦ συστήματος τούτου, ἂν ὑποθεθῇ  $\epsilon$  διάφορον τοῦ 0, εὐρίσκομεν μετὰ τὴν ἐξάλειψιν τοῦ κοινοῦ παραγόντος  $\epsilon$  ἐκ τῆς δευτέρας ἐξισώσεως

$$\chi = \frac{\gamma^2 - \epsilon\gamma}{\beta + \gamma}, \quad \psi = \frac{\beta^2 + \epsilon\beta}{\beta + \gamma} \quad (3)$$

Ἐὰν ὁ  $\epsilon$  ἐλαττούμενος καταντήσῃ 0, αἱ δύο ἐξισώσεις τοῦ συστήματος (1), ἢ καὶ τοῦ (2), γίνονται μίᾳ μόνῃ καὶ τὸ σύστημα καταντᾶ ἀόριστον· ἀλλὰ τότε καὶ αἱ δύο εὐθεῖαι ἐφαρμόζουσι καὶ ἔχουσι κοινὰ πάντα τὰ σημεῖα τῆς  $B\Gamma$ · ὥστε καὶ τὸ πρόβλημα καταντᾶ ἀόριστον.

Δυνάττον ὁμῶς νὰ ζητηθῇ, πρὸς ποῖον σημεῖον τῆς  $B\Gamma$  πλησιάζει ἡ τομὴ  $M$ , ὅταν ἡ  $B'\Gamma'$  πλησιάζῃ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τὴν  $B\Gamma$  (τοῦτ' ἔστιν, ὅταν τὸ  $\epsilon$  τείνῃ πρὸς τὸ 0)· τοῦτο εὐρίσκεται ἐκ τῶν τιμῶν (3) εὐκόλως· διότι, ὅσῳ τὸ  $\epsilon$  πλησιάζει πρὸς τὸ 0, τόσοι αἱ τιμαὶ τῶν  $\chi$  καὶ  $\psi$  πλησιάζουσι

νά γίνωσι

$$\chi = \frac{\gamma^2}{\beta + \gamma}$$

$$\psi = \frac{\beta^2}{\beta + \gamma}$$

ὥστε καὶ ἡ τομὴ πλησιάζει πρὸς τὸ σημεῖον, οὐ αἱ ἀποστάσεις ἀπὸ τῶν AB καὶ AG μετροῦνται ὑπὸ τῶν ἀριθμῶν τούτων.

Τὸ σημεῖον τοῦτο διαμερῆ τὴν ὑποτείνουσαν εἰς δύο μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰς ἄλλας πλευράς ὥστε δύναται καὶ γεωμετρικῶς νὰ εὑρεθῇ.

18<sup>ον</sup>) Ἐκ τοῦ στομίου φρέατος ἀφένθη λίθος εἰς αὐτό· ἠκούσθη δὲ ὁ κρότος τοῦ λίθου (κιτυπήσαντος τὸν πυθμένα) μετὰ παρέλευσιν θ δευτέρων λεπτῶν ἀπὸ τῆς συγμῆς τῆς πτώσεως. Ζητεῖται τὸ βάθος τοῦ φρέατος.

Ἴνα λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψει τοὺς ἐπομένους νόμους τῆς φυσικῆς.

1) Ἐὰν σῶμα. ἀπὸ τινος ὕψους ἀφεθῆν, πίπτῃ ἐπὶ χ δεύτερα λεπτά, τὸ διανυσθὲν ὑπ' αὐτοῦ διάστημα εἶναι

$$\frac{1}{2} \gamma \chi^2, \text{ ἔνθα } \gamma = 9,8088 \text{ μέτρα.}$$

ἢ τοῦ ἀέρος ἀντίστασις δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν.

2) Ὁ ἦχος διαδίδεται μετ' ὀμαλῆς κινήσεως διανύων ἐν τῷ ἀέρι 340 περίπου μέτρα καθ' ἕκαστον δεύτερον λεπτόν. Τὴν ταχύτητα ταύτην τοῦ ἤχου θὰ παραστήσωμεν χάριν συντομίας διὰ τοῦ τ.

Ἐστω νῦν φ τὸ βάθος τοῦ φρέατος εἰς μέτρα· φανερόν εἶναι ὅτι ὁ μετρηθεὶς χρόνος θ συνίσταται ἐκ δύο μερῶν· ἐκ τοῦ χρόνου τῆς πτώσεως τοῦ λίθου μέχρι τοῦ πυθμένος καὶ ἐκ τοῦ χρόνου, ὃν ἐχρειάσθη ὁ ἦχος, ἵνα φθάσῃ ἐκ τοῦ πυθμένος μέχρι τοῦ στομίου.

Καὶ ὁ μὲν χρόνος τῆς πτώσεως τοῦ λίθου ἐκ τοῦ ὕψους φ εὐρίσκεται κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκ τοῦ τύπου

$$\varphi = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot \chi^2, \text{ ἐξ οὗ } \chi = + \sqrt{\frac{2\varphi}{\gamma}}$$

ὁ δὲ χρόνος τῆς ἀναβάσεως τοῦ ἤχου, ἂν παρασταθῇ διὰ χ', θὰ εἶναι

$$\varphi = \tau \cdot \chi',$$

διότι φ εἶναι τὸ διανυσθὲν ὑπ' αὐτοῦ διάστημα· ἐπομένως εἶναι

$$\chi' = \frac{\varphi}{\tau}$$

Ἐκ τούτων ἔπεται ἡ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος

$$(1) \quad \frac{\varphi}{\tau} = \sqrt{\frac{2\varphi}{\gamma}} = \theta.$$

Ἡ ἐξίσωσις (1) ἀπαλλασσομένη τῆς τετραγ. ρίζης (214) γίνεται

$$\varphi^2 - 2\tau \left( \theta + \frac{\tau}{\gamma} \right) \varphi = -\theta^2 \tau^2.$$

ἐξ οὗ βλέπομεν, ὅτι ἔχει δύο ρίζας ἀμφοτέρως θετικάς (212).

$$\text{εἶναι δὲ αὗται } \varphi = \tau \left( \theta + \frac{\tau}{\gamma} \right) \pm \tau \sqrt{\frac{\tau}{\gamma} \left( \frac{\tau}{\gamma} + 2\theta \right)}.$$

Ἡ μία ἐκ τῶν τιμῶν τοῦ  $\varphi$  εἶναι προφανῶς μεγαλύτερα τοῦ  $\tau\theta$ . ἐπομένως καθιστᾷ τὸ  $\frac{\varphi}{\tau}$  μεγαλύτερον τοῦ  $\theta$  καὶ διὰ τοῦτο δὲν εἶναι λύσις τῆς ἐξίσωσεως (1), ἀλλὰ τῆς συζυγοῦς αὐτῆς· ἡ δὲ ἄλλη εἶναι μικρότερα τοῦ  $\tau\theta$ · διότι τὸ γινόμενον τῶν δύο ριζῶν (211) εἶναι  $\tau\theta$ . ἐπομένως δὲν δύνανται ἀμφοτέρωι νὰ εἶναι μεγαλύτερα τοῦ  $\tau\theta$ · ἡ δευτέρα αὕτη λύσις εἶναι τῆς ἐξίσωσεως (1), διότι δι' αὐτὴν εἶναι τὸ  $\theta - \frac{\varphi}{\tau}$  θετικόν· ἐπομένως αὕτη λύει τὸ πρόβλημα.

19<sup>ον</sup>) Ἐπὶ τῆς εὐθείας, ἣτις διέρχεται διὰ δύο φωτεινῶν σημείων A καὶ B, εὐρεῖν σημεῖον ἐξ ἴσου φωτιζόμενον ὑπ' αὐτῶν.

A

B

Ἴνα λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψει τὸν ἐπόμενον φυσικὸν νόμον.

Τὸ ποσὸν τοῦ φωτός, ὅπερ δέχεται ἐπιφάνειά τις, εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογον τοῦ τετραγώνου τῆς ἀποστάσεως αὐτῆς ἀπὸ τοῦ φωτεινοῦ σημείου.

Κατὰ τὸν νόμον τοῦτον, ἂν παραστήσωμεν διὰ  $\mu$  τὸ ποσὸν τοῦ φωτός, ὅπερ δέχεται ἐπιφάνειά τις ἐκ φωτεινοῦ σημείου, ὅταν εὐρίσκηται εἰς ἀπόστασιν ἑνὸς μέτρου ἀπ' αὐτοῦ, καὶ διὰ  $\omega$  τὸ ποσὸν τοῦ φωτός, ὅπερ δέχεται ἡ αὐτὴ ἐπιφάνεια, ὅταν εὐρίσκηται εἰς ἀπόστασιν  $\chi$  μέτρων, θὰ εἶναι

$$\omega : \mu = 1 : \chi^2, \quad \text{ἤτοι } \omega = \frac{\mu}{\chi^2}.$$

Τὸ ζητούμενον σημεῖον M δύναται νὰ ὑποτεθῆ κείμενον ἢ ὀπισθεν τοῦ A, ἢ μεταξὺ A καὶ B, ἢ πέραν τοῦ B. Ἐὰν δὲ παραστήσωμεν διὰ  $\chi$  τὴν ἀπόστασιν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ A, καὶ διὰ τοῦ  $\alpha^2$  τὸ ποσὸν τοῦ φωτός, ὅπερ δέχεται ἐκ τοῦ A τὴν ἀπόστασιν 1 ἀπέχον ἀπ' αὐτοῦ σημεῖον, καὶ διὰ  $\beta^2$  τὸ ὅμοιον ποσὸν τοῦ φωτεινοῦ σημείου B, πρὸς δὲ τούτοις διὰ  $\delta$

τὴν ἀπόστασιν AB, εὐρίσκομεν κατὰ τὰς τρεῖς εἰρημέναις ὑποθέσεσι, ἑξισοῦντες τὰ ποσὰ τοῦ φωτός, τὰ ὁποῖα δέχεται τὸ ἐξ ἴσου φωτιζόμενον

$$\text{σημεῖον} \cdot \quad \frac{\alpha^2}{\chi^2} = \frac{\beta^2}{(\delta + \chi)^2} \quad \chi > 0$$

$$2^{\alpha} \text{ καὶ } 3^{\eta} \quad \frac{\alpha^2}{\chi^2} = \frac{\beta^2}{(\delta - \chi)^2} \quad \chi > 0$$

Αἱ ἐξισώσεις αὗται δύνανται νὰ συμπεριληφθῶσιν εἰς μίαν, ἂν αἱ ἀποστάσεις τῶν ὀπισθεν τοῦ A κειμένων σημείων παριστῶνται ὑπὸ ἀρνητικῶν ἀριθμῶν, διότι τότε ἐν τῇ πρώτῃ πρέπει νὰ τεθῆ  $-\chi$  ἀντὶ τοῦ  $\chi$ . (διότι ἐν τῇ ἐξίσωσει ἐκείνῃ τὸ  $\chi$  σημαίνει τὴν θετικὴν ἀπόστασιν AM, αὕτη δὲ εἶναι νῦν  $-\chi$ ). ἀλλὰ τότε τρέπεται ἡ πρώτη ἐξίσωσις εἰς τὴν δευτέραν· ἐπομένως ὡς ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος δύναται νὰ ληθῆ ἡ ἐπομένη

$$\frac{\alpha^2}{\chi^2} = \frac{\beta^2}{(\delta - \chi)^2} \quad (1)$$

καὶ ἂν μὲν εἶναι  $\chi < 0$ , τὸ σημεῖον κεῖται ὀπισθεν τοῦ A· ἂν δὲ  $0 < \chi < \delta$ , μεταξὺ A καὶ B· ἂν δὲ  $\chi > \delta$ , τὸ σημεῖον κεῖται πέραν τοῦ B.

Ἡ ἐξίσωσις (1) δύναται νὰ λυθῆ καὶ κατὰ τὸν συνήθη τρόπον· ἐπειδὴ ὅμως ἀμφότερα τὰ μέλη αὐτῆς εἶναι τέλεια τετράγωνα, ἐξάγομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν αὐτῶν καὶ οὕτως εὐρίσκομεν τὰς πρὸς αὐτὴν ἰσοδυναμούς δύο ἐξισώσεις.

$$\eta \quad \frac{\alpha}{\chi} = + \frac{\beta}{\delta - \chi}, \quad \eta \quad \frac{\alpha}{\chi} = - \frac{\beta}{\delta - \chi}.$$

ἐξ ὧν εὐκολώτατα λαμβάνομεν τὰς λύσεις

$$\eta \quad \chi = \delta \cdot \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad \eta \quad \chi = \delta \cdot \frac{\alpha}{\alpha - \beta}.$$

**Διερεύνησις.** Ἡ πρώτη τῶν λύσεων τούτων εἶναι πάντοτε θετικὴ καὶ μικρότερα τοῦ  $\delta$ · διότι τὸ κλάσμα, ἐφ' ὃ ὁ  $\delta$  πολλαπλασιάζεται, εἶναι μικρότερον τῆς μονάδος· ἐπομένως ὑπάρχει πάντοτε μεταξὺ τῶν φωτεινῶν σημείων A καὶ B σημεῖόν τι ἐξ ἴσου φωτιζόμενον ὑπ' αὐτῶν· τὸ σημεῖον τοῦτο εἶναι τὸ μέσον τῆς AB, ἂν τὰ φῶτα εἶναι ἴσα τὴν δύναμιν, ἥτοι ἂν εἶναι  $\alpha = \beta$ · εἰ δὲ μὴ, εἶναι πλησιέστερον πρὸς τὸ ἀσθενέστερον· καὶ τῷ ὄντι, ἂν εἶναι  $\alpha > \beta$ , εἶναι καὶ  $2\alpha > \alpha + \beta$  καὶ διὰ τοῦτο τὸ κλάσμα, ἐφ' ὃ πολλαπλασιάζεται ὁ  $\delta$ , εἶναι μεγαλύτερον τοῦ

$$\frac{\alpha}{2\alpha} \quad \eta \text{τοι τοῦ } \frac{1}{2}, \quad \text{ὥστε } \chi > \frac{1}{2} \delta. \quad \text{ἂν δὲ εἶναι } \alpha < \beta, \quad \text{θὰ εἶναι καὶ}$$

$2x < \alpha + \beta$  και τὸ αὐτὸ κλάσμα θὰ εἶναι μικρότερον τοῦ  $\frac{1}{2}$ . ὥστε  
θὰ εἶναι  $x < \frac{1}{2} \delta$ .

Ἡ δευτέρα λύσις ὑπάρχει, μόνον ὅταν τὰ φῶτα εἶναι ἀνισα τὴν δύναμιν· (διότι, ἂν ὑποθεθῇ  $\alpha = \beta$ , ἡ ἐξίσωσις, ἐξ ἧς ἐλήφθη, γίνεται  $\alpha\delta = 0$  και ὁ ἄγνωστος δὲν ὀρίζεται). Καὶ ἂν μὲν ὑποθεθῇ  $\beta > \alpha$ , ἡ λύσις εἶναι ἀρνητική, ἤτοι ὑπάρχει σημεῖον ἐξ ἴσου φωτιζόμενον ὀπισθεν τοῦ Α· ἂν δὲ ὑποθεθῇ  $\alpha > \beta$ , ἡ λύσις εἶναι θετική και μεγαλύτερα τοῦ δ· διότι τὸ κλάσμα, ἐφ' ὃ ὁ δ πολλαπλασιάζεται, ὑπερβαίνει τὴν μονάδα· ἐπομένως ὑπάρχει τότε σημεῖον ἐξ ἴσου φωτιζόμενον πέραν τοῦ Β· ὥστε ἐν συνόλῳ ὑπάρχει (πλὴν τοῦ μεταξὺ τῶν δύο φώτων κειμένου σημείου) και δεύτερον σημεῖον ἐξ ἴσου φωτιζόμενον· κείται δὲ και τοῦτο πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἀσθενεστέρου φωτός.

Ἐὰν τὰ φῶτα, ἀνισα ὄντα τὴν δύναμιν, τείνωσι νὰ καταστῶσιν ἴσα, ἡ δευτέρα λύσις δίδει τιμὴν τοῦ  $x$  ἐπὶ μᾶλλον και μᾶλλον αὐξανόμενην και δυναμένην νὰ ὑπερβῇ πάντα δοθέντα ἀριθμὸν, τοῦτ' ἔστι τὸ σημεῖον, τὸ ἐξ ἴσου φωτιζόμενον, τὸ ἐκτὸς τῆς ΑΒ ὑπάρχον, ἀπομακρύνεται ἐπὶ μᾶλλον και μᾶλλον ἀπὸ τῶν φωτεινῶν σημείων και ἡ ἀπόστασις αὐτοῦ ἀπὸ τούτων δύναται νὰ ὑπερβῇ πᾶσαν δοθεῖσαν ἀπόστασιν· ἀπέχει δὲ ἀπ' αὐτῶν τόσῳ περισσότερον, ὅσῳ ὀλιγώτερον διαφέρουσι τὰ φῶτα ἀπ' ἀλλήλων.

Ἐὰν τὸ ἕτερον τῶν φώτων, ἔστω τὸ Β, γίνηται ἐπὶ μᾶλλον και μᾶλλον ἀσθενέστερον, ἀμφοτέρω τὰ ἐξ ἴσου φωτιζόμενα σημεία πλησιάζουσιν ἐπὶ μᾶλλον και μᾶλλον πρὸς τὸ σημεῖον τοῦτο Β. Διότι ὅσῳ μικρότερον γίνεται τὸ  $\beta$ , τόσῳ πλησιάζουσιν αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  ἀμφοτέρω πρὸς τὸ δ.

### Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν

1) Τίς ἀριθμὸς πρέπει νὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ δύο δοθέντων  $\alpha$  και  $\beta$ , ἵνα τὰ τετράγωνα αὐτῶν γίνωσιν ἴσα;

(Ἀπ. ὁ  $\frac{1}{2}(\alpha + \beta)$ . ἀλλ' ἐὰν εἶναι  $\alpha = \beta$ , πᾶς ἀριθμὸς ποιεῖ τὸ προτεινόμενον).

2) Δοθέντων δύο ὀρθογωνίων ζητεῖται νὰ ἐλαττωθῶσιν αἱ πλευραὶ αὐτῶν κατὰ τινὰ (τὴν αὐτὴν πᾶσαι) γραμμὴν, ὥστε νὰ γίνωσιν ἴσα τὴν ἐπιφάνειαν.



(Ἐὰν τὰ ὀρθογώνια εἶναι ἰσοπερίμετρα ἀλλ' ἄνισα, τὸ προτεινόμενον εἶναι ἀδύνατον· ἐὰν δὲ εἶναι καὶ ἴσα, ἀόριστον).

3) Δοθέντων δύο τριγώνων, ζητεῖται νὰ ἐλαττωθῶσιν αἱ τρεῖς πλευραὶ τοῦ πρώτου κατὰ τινα γραμμὴν καὶ αἱ τοῦ δευτέρου κατ' ἄλλην, ὥστε νὰ γίνωσιν ὅμοια.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ἢ ἀδύνατον ἢ ἀόριστον.

4) Δοθέντος ὀρθογωνίου νὰ ἐλαττωθῶσιν αἱ πλευραὶ κατὰ τινα γραμμὴν, ὥστε τὸ ἐμβαδὸν του νὰ γίνῃ τὸ ἡμισυ ἢ πρότερον.

(Ἄπ. Ἐὰν αἱ πλευραὶ τοῦ ὀρθογωνίου ἔχωσι μήκη  $\alpha, \beta$ , τὸ μῆκος τῆς γραμμῆς, καθ' ἣν πρέπει νὰ ἐλαττωθῶσιν, εἶναι  $\chi = \frac{\alpha + \beta - \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{2}$ ).

5) Κλάσματα ὑψοῦνται ἀμφοτέρωθεν οἱ ὅροι εἰς τὸ τετράγωνον καὶ προκύπτει νέον κλάσμα· ζητεῖται, τίς ἀριθμὸς πρέπει νὰ προστεθῇ εἰς ἐκάτερον τῶν ὄρων τοῦ νέου κλάσματος, ἵνα γίνῃ ἴσον τῷ ἀρχικῷ.

6) Εὐρεῖν ἀριθμὸν, ὅστις ἐλαττούμενος κατὰ τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν αὐτοῦ, γίνεται ἴσος τῷ 1406. (Ἄπ. 1444.)

7) 1320 δραχμαὶ διενεμήθησαν εἰς τινὰς ἀνθρώπους· ἂν οἱ ἀνθρωποὶ ἦσαν κατὰ ἓνα ὀλιγώτεροι, θὰ ἐλάμβανεν ἕκαστος 10 δραχμάς περισσοτέρας· πόσοι ἦσαν οἱ ἀνθρωποὶ; (Ἄπ. 12)

8) Ἐπληρώθησαν 96 δραχμαὶ εἰς 14 ἐργάτας, ἀνδρας καὶ γυναῖκας· ἔλαβε δὲ ἕκαστος ἀνὴρ τόσας δραχμάς, ὅσαι ἦσαν αἱ γυναῖκες, καὶ ἐκάστη γυνὴ τόσας δραχμάς, ὅσαι ἦσαν οἱ ἀνδρες· πόσοι ἦσαν οἱ ἀνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναῖκες; (Ἄπ 6 καὶ 8.)

9) Εὐρεῖν τοὺς τέσσαρας ὄρους ἀναλογίας γνωστοῦ ὄντος, ὅτι ὁ λόγος αὐτῆς εἶναι 2, τὸ ἄθροισμα τῶν ἡγουμένων 20 καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν τεσσάρων ὄρων 260.

10) Δύο ἐργάται ὁμοῦ ἐργαζόμενοι ἐκτελοῦσιν ἔργον τι εἰς  $\alpha$  ὥρας· ἂν ὁμοῦ ἐκάτερος ἐξετέλει διαδοχικῶς τὸ ἡμισυ τοῦ ἔργου, θὰ ἐχρειάζοντο  $\beta$  ὥραι πρὸς ἀποπεράτωσιν αὐτοῦ. Ζητεῖται εἰς πόσας ὥρας ἕκαστος ἤθελεν ἐκτελέσει μόνος τὸ ἔργον.

11) Εὐρεῖν δύο ἀριθμούς, γινωστων ὄντων τοῦ ἄθροίσματος αὐτῶν καὶ τῆς διαφορᾶς τῶν τετραγώνων αὐτῶν.

12) Εὐρεῖν δύο ἀριθμούς ἔχοντας ἄθροισμα 12, τὸ δὲ τετράγωνον τοῦ ἐνὸς νὰ διαφέρῃ τοῦ διπλασίου τετραγώνου τοῦ ἄλλου κατὰ μίαν μονάδα.

(Ἄπ. Ἐὰν τὸ διπλάσιον τοῦ τετραγώνου εἶναι μεγαλύτερον, ἢ

λύσεις είναι 5 και 7 ἢ  $-29$  και  $41$ . ἐὰν δὲ μικρότερον, ἢ λύσεις εἶναι  $-12 \pm \sqrt{287}$  και  $24 \mp \sqrt{287}$ .

13) Εὕρετν ἀριθμόν, ὅστις εἶτε διὰ 7, εἶτε διὰ 9 διαιρεθῆ, νὰ ἀφίνη ὑπόλοιπον 3, τὰ δὲ πηλίκα πολλαπλασιαζόμενα νὰ δίδωσι τὸν ἀριθμόν 28.

14) Τίς ἀριθμὸς ἀφαιρούμενος ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν παραγόντων γινομένου δὲν βλάπτει αὐτό; και τίς ἐν γινομένῳ τριῶν παραγόντων ἔχει τὴν αὐτὴν ιδιότητα;

15) Λῦσαι τὸ σύστημα

$$(\chi + \psi)(\chi^2 + \psi^2) = \alpha$$

$$(\chi - \psi)(\chi^2 - \psi^2) = \beta.$$

16) Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις

$$\frac{\chi - \sqrt{\chi}}{\chi + \sqrt{\chi}} = \frac{5}{6}.$$

17) Νὰ λυθῆ τὸ ἐξῆς σύστημα

$$\frac{\alpha}{\chi\psi} + \frac{\beta}{\psi\zeta} = \lambda$$

$$\frac{\gamma}{\zeta\chi} + \frac{\delta}{\chi\psi} = \mu$$

$$\frac{\epsilon}{\psi\zeta} + \frac{\theta}{\zeta\chi} = \nu.$$

18) Πότε ἡ τιμὴ τοῦ κλάσματος

$$\frac{A'\chi^2 + B'\chi + \Gamma'}{A\chi^2 + B\chi + \Gamma}$$

εἶναι ἡ αὐτὴ διὰ πάσας τὰς τιμὰς τοῦ  $\chi$ ;

$$\left( \text{Ἀπ. Ὅταν εἶναι } \frac{A'}{A} = \frac{B'}{B} = \frac{\Gamma'}{\Gamma} \right).$$

\* 19) Σφαῖρα κοίλη ἐκ χυτοῦ σιδήρου ἔχει βάρους  $\alpha$  χιλιογράμμων. τεθεῖσα δὲ ἐν τῷ ὕδατι ἐπιπλέει μένοντος τοῦ ἡμίσεος αὐτῆς ἐκτὸς τοῦ ὕδατος· νὰ εὕρεθῆ ἡ ἀκτίς και τὸ πάχος αὐτῆς.

20) Ἀμαξοστοιχία τις ἀπεμακρύνετο ἀπὸ τινος φρουρίου κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν με ταχύτητα 45 στχδίων καθ' ὥραν, ὅτε οἱ ἐν αὐτῇ εὐριπτόμενοι εἶδον τὴν λάμπην ἐκπυροσκοπήσεως και μετὰ 15'' ἤκουσαν τὸν κρότον αὐτῆς. Πόσον ἀπεῖχον ἀπὸ τοῦ φρουρίου τὴν στιγμὴν, καθ' ἣν εἶδον τὴν λάμπην;

$$\left( \text{Ἀπ. } 4912 \frac{1}{2} \text{ μέτρα} \right).$$

21) Οἱ ἐν τῇ αὐτῇ ἀμαξοστοιχίᾳ εὐρισκόμενοι ἤκουσαν δύο κανονιο-  
βολισμοὺς ἐκ ταῦ φρουρίου τὸν ἕνα 5 πρῶτα λεπτὰ μετὰ τὸν ἄλλον.  
Ἡ ταχύτης τῆς ἀμαξοστοιχίας ἦτο 10 στάδια καθ' ὥραν. Ζητεῖται ὁ  
μεταξὺ τῶν δύο ἐκπυροσκοπήσεων μεσολαβήσας χρόνος.

$$\left( \text{Ἀπ. } 4', 57'', \frac{28}{51} \right).$$

22) Εὐρεῖν ἅπαντα τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα, ὧν μία μὲν ἐκ τῶν κα-  
θέτων πλευρῶν εἶναι ἴση μὲ 12 μέτρα, αἱ δὲ λοιπαὶ δύο πλευραὶ αὐτῶν  
σὺγκεινται ἐξ ἀκεραίων ἀριθμῶν μέτρων.

Ἐὰν διὰ τῶν ἀριθμῶν  $\chi, \psi, 12$  παρασταθῶσιν αἱ τρεῖς πλευραὶ ἐνός  
τοιούτου τριγώνου (διὰ τοῦ  $\chi$  ἢ ὑποτείνουσας), θὰ εἶναι

$$\chi^2 - \psi^2 = 12^2 = 144$$

$$\eta \quad (\chi + \psi)(\chi - \psi) = 144.$$

ἐξ ὧν βλέπομεν, ὅτι οἱ δύο ἀριθμοὶ  $\chi + \psi$  καὶ  $\chi - \psi$  εἶναι συζυγεῖς  
διαιρέται τοῦ 144 (ἦτοι τοιοῦτοι, ὥστε τὸ γινόμενον αὐτῶν εἶναι ὁ 144).  
ἄρκει λοιπὸν νὰ εὐρωμεν πάντας τοὺς διαιρέτας τοῦ 144 (ιδὲ θεωρ.  
ἀριθμητικῆς ἐδ. 125), ἵνα λύσωμεν τὸ πρόβλημα· κατὰ τὸν τρόπον  
τοῦτον εἶναι

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c} \chi + \psi = 144 & 72 & 48 & 36 & 24 & 18 & 16 & 12 \\ \chi - \psi = & 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 8 & 9 & 12 \end{array}$$

$$\text{ἔθεν} \quad \begin{array}{c|c|c|c} \chi = 37 & 20 & 15 & 13 \\ \psi = 35 & 16 & 9 & 5 \end{array}$$

Τέλος παραθέτομεν καὶ τὸ ἐπόμενον πρόβλημα ἐκ τῆς ἀπροσδιορί-  
στου ἀναλύσεως τοῦ δευτέρου βαθμοῦ.

23) Εὐρεῖν τὰς ἀκεραίας λύσεις τῆς ἐξίσωσως

$$\chi^2 + \psi^2 = \omega^2. \quad (1)$$

Ἐὰν οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ, οἱ λύσιν τινι τῆς ἐξίσωσως ταύτης ἀπο-  
τελοῦντες, ἔχωσι κοινόν τινα διαιρέτην  $\delta$ , καὶ τὰ πηλίκα αὐτῶν, διαιρου-  
μένων διὰ  $\delta$ , ἐπαληθεύουσι τὴν αὐτὴν ἐξίσωσιν· ἀρκει λοιπὸν νὰ εὐρε-  
θῶσιν αἱ ἀκέραιοι λύσεις, ὧν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

Ἐὰν τρεῖς ἀριθμοὶ  $\chi, \psi, \omega$ , πρῶτοι ὄντες πρὸς ἀλλήλους, ἐπαλη-  
θεύουσι τὴν ἐξίσωσιν, εἷς ἐκ τῶν  $\chi$  καὶ  $\psi$  εἶναι ἄρτιος, οἱ δὲ δύο ἄλλοι  
εἶναι περιττοὶ (ὅτι καὶ οἱ τρεῖς δὲν δύνανται νὰ εἶναι περιττοί, εἶναι φανε-  
ρόν)· διότι, ἂν ἦσαν δύο ἄρτιοι καὶ τὸ τετράγωνον τοῦ τρίτου θὰ ἦτο  
ἄρτιον· ἀρα καὶ ὁ τρίτος ἄρτιος· καὶ θὰ εἶχον οἱ τρεῖς κοινὸν διαιρέτην  
τὸν 2· ἀλλ' ὁ  $\omega$  πρέπει νὰ εἶναι περιττός· διότι, ἂν ἦτο ἄρτιος, τὸ

τετράγωνον αὐτοῦ  $\omega^2$ , ἢ  $\chi^2 + \psi^2$ , θὰ διηρεῖτο διὰ 4· τὸ ἄθροισμα ὅμως  $\chi^2 + \psi^2$  τῶν τετραγώνων δύο περιττῶν ἀριθμῶν  $\chi$  καὶ  $\psi$  διαιρεῖται μόνον διὰ 2 καὶ οὐχὶ διὰ 4· διότι, ἂν ὁ εἷς εἶναι  $2\mu + 1$  καὶ ὁ ἄλλος  $2\nu + 1$ , τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων αὐτῶν εἶναι

$$4(\mu^2 + \nu^2 + \mu + \nu) + 2.$$

ὥστε ὁ  $\omega$  εἶναι περιττός.

Ἐστω ἄρτιος ὁ  $\chi'$ · καὶ ἄς τεθῆ  $\chi = 2\chi'$ · τότε ἡ ἐξίσωσις γίνεται

$$4\chi'^2 = \omega^2 - \psi^2.$$

$$\eta \quad \chi'^2 = \frac{1}{2}(\omega + \psi) \cdot \frac{1}{2}(\omega - \psi). \quad (2)$$

Οἱ δύο ἀκέραιοι  $\frac{1}{2}(\omega + \psi)$  καὶ  $\frac{1}{2}(\omega - \psi)$  δὲν δύνανται νὰ ἔχωσι κοινὸν διαιρέτην· διότι, ἂν ἀριθμὸς τις πρῶτος διήρει αὐτούς, θὰ διήρει καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν  $\omega$  καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν  $\psi$  καὶ τὸ γινόμενον αὐτῶν  $\chi'^2$ · ἐπομένως καὶ αὐτὸν τὸν  $\chi'$ , ὥστε θὰ εἶχον οἱ τρεῖς  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  κοινὸν διαιρέτην· ὅπερ ἐναντίον τῆς ὑποθέσεως.

Ἐπειδὴ δὲ τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν πρώτων πρὸς ἀλλήλους τότε μόνον εἶναι τετράγωνον, ὅταν ἑκάτερος αὐτῶν εἶναι τετράγωνος, ἔπεται, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι

$$\frac{1}{2}(\omega + \psi) = \alpha^2 \quad \text{καὶ} \quad \frac{1}{2}(\omega - \psi) = \beta^2.$$

Ἐὰν δὲ αἱ τιμαὶ αὗται τεθῶσιν εἰς τὴν ἐξίσωσιν (2), προκύπτει  $\chi' = \alpha\beta$ · ὅθεν ἔπεται, ὅτι πᾶσαι αἱ ζητούμεναι λύσεις περιέχονται εἰς τοὺς τύπους

$$(3) \quad \begin{aligned} \chi &= 2\alpha\beta \\ \psi &= \alpha^2 - \beta^2 \\ \omega &= \alpha^2 + \beta^2, \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{ἐνθα } \alpha \text{ καὶ } \beta \text{ εἶναι} \\ &\text{τυχόντες ἀκέραιοι.} \end{aligned}$$

Ἡ ἀπλουστάτη τῶν λύσεων εἶναι ἡ (3, 4, 5) καὶ δίδεται ὑπὸ τῶν τύπων (3), ἂν τεθῆ  $\alpha = 2$  καὶ  $\beta = 1$ · μετ' αὐτὴν ἔρχονται αἱ ἐξῆς (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25).

Οἱ τὴν ἐξίσωσιν (1) ἐπαληθεύοντες ἀριθμοὶ  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  μετροῦσι τὰς πλευρὰς ὀρθογωνίου τριγώνου· ὥστε διὰ τῶν προηγουμένων ἐλύθη καὶ τὸ ἐπόμενον γεωμετρικὸν πρόβλημα.

Ἐυρεῖν ἅπαντα τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα, ὧν αἱ πλευραὶ εἶναι σύμμετροι πρὸς τὴν μονάδα τοῦ μήκους.

## ΒΙΒΛΙΟΝ Δ'.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

#### ΠΕΡΙ ΠΡΟΟΔΩΝ

##### Α') ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ

216. Σειρά ἀριθμῶν, ὧν ἕκαστος γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου τῆ προσθήκῃ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, λέγεται, ὅτι ἀποτελεῖ πρόοδον ἀριθμητικὴν ἢ κατὰ διαφοράν· τοιοῦτοι εἶναι οἱ ἀριθμοὶ

5, 7, 9, 11, 13, 15,...

ὧν ἕκαστος γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου τῆ προσθήκῃ τοῦ ἀριθμοῦ 2.

Τοιοῦτοι καὶ οἱ ἀριθμοὶ

19, 16, 13, 10, 7,...

ὧν ἕκαστος γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου τῆ προσθήκῃ τοῦ ἀριθμοῦ —3.

Οἱ πρόοδον ἀποτελοῦντες ἀριθμοὶ λέγονται ὄροι τῆς προόδου, ὁ δὲ ἀριθμὸς, ὅστις προστιθέμενος εἰς ἕκαστον παράγει τὸν ἐπόμενον, λέγεται λόγος τῆς προόδου.

Ἡ πρόοδος λέγεται αὐξουσα, ἐὰν οἱ ὄροι αὐτῆς προβαίνωσιν αὐξανόμενοι· συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅταν ὁ λόγος αὐτῆς εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς· τοιαύτη ἡ πρόοδος 3, 7, 11, 15, ... Φθίνουσα δὲ λέγεται ἡ πρόοδος, ἐὰν οἱ ὄροι αὐτῆς προβαίνωσιν ἐλαττούμενοι· συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅταν ὁ λόγος εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς· τοιαύτη ἡ πρόοδος 21, 16, 11, 6, ...

**Ἐύρεαις τοῦ ὄρου τοῦ κατέχοντος ὠρισμένην τάξιν ἐν τῇ προόδῳ.**

217. Ἐν πάσῃ ἀριθμητικῇ προόδῳ ἕκαστος ὄρος ἰσοῦται τῷ πρώτῳ αὐξηθέντι κατὰ τὸ γινόμενον τοῦ λόγου ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν προηγουμένων αὐτοῦ ὄρων.

Διότι, ἂν παρασταθῇ διὰ τοῦ α ὁ πρῶτος ὄρος καὶ διὰ τοῦ τ ὁ νός, διὰ δὲ τοῦ ω ὁ λόγος, θὰ εἶναι

πρῶτος ὄρος

$\alpha$

δεύτερος

$\alpha + \omega$

τρίτος

$\alpha + 2\omega$

τέταρτος

$\alpha + 3\omega$

καὶ οὕτω καθεξῆς.

“Ὡστε ὁ ὅρος τ, ὁ τὴν νῆν τάξιν κατέχων καὶ τοῦ ὁποίου προηγούμεναι ν—1 ἄλλοι ὅροι, θὰ εἶναι

$$τ = α + (ν - 1)ω \quad (1)$$

**Ἐφαρμογαί.**

1) Εὐρεῖν τὸν 50ὸν ὅρον τῆς προόδου

$$3, \quad 9, \quad 15, \quad 21 \dots \quad \text{λόγος } 6.$$

Ἐπειδὴ τοῦ ὅρου τούτου προηγούνται 49 ἄλλοι, ἰσοῦται τῷ

$$3 + 49 \cdot 6, \quad \text{ἤτοι τῷ } 297.$$

2) Εὐρεῖν τὸν 23ὸν ὅρον τῆς φθινοῦσης προόδου

$$500 \quad 485 \quad 470 \dots \quad \text{λόγος } -15.$$

Ἐπειδὴ προηγούνται αὐτοῦ 22 ὅροι, θὰ εἶναι ἴσος τῷ

$$500 + 22(-15), \quad \text{ἤτοι } 170.$$

**Ἄθροισμα τῶν ὀρων ἀριθμητικῆς προόδου.**

218. Ἐν πάσῃ ἀριθμητικῇ προόδῳ τὸ ἄθροισμα δύο ὀρων ἐξ ἴσου ἀπεχόντων ἀπὸ τῶν ἄκρων εἶναι ἴσον τῷ ἄθροισμαί τῶν ἄκρων.

Ἄς ἀποτελῶσιν οἱ ἀριθμοὶ

$$α, \quad β, \quad γ, \dots, \quad ρ, \quad σ, \quad τ$$

ἀριθμητικὴν πρόοδον· ἔστω δὲ λόγος τῆς προόδου ὁ ω· τότε εἶναι

$$β = α + ω \quad \text{καὶ} \quad τ = σ + ω$$

ἢ καὶ

$$σ = τ - ω,$$

ἔθεν καὶ

$$β + σ = α + τ.$$

Ἐπειδὴ δὲ καὶ οἱ ἀριθμοὶ

$$β, \quad γ, \dots, \quad ρ, \quad σ$$

ἀποτελοῦσιν ἀριθμητικὴν πρόοδον, ἔπεται  $β + σ = γ + ρ$

ἔθεν

$$α + τ = β + σ = γ + ρ.$$

Ὁμοίως γίνεται ἡ ἀπόδειξις καὶ διὰ πάντας τοὺς ἐξ ἴσου ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν ἄκρων ὅρους.

Ἐπιθέσωμεν νῦν, ὅτι ζητεῖται τὸ ἄθροισμα τῶν ὀρων τῆς προόδου

$$α \quad β \quad γ \quad \dots \quad ρ \quad σ \quad τ,$$

ὧν τὸ πλῆθος εἶναι ν.

Ἐὰν παραστήσωμεν διὰ τοῦ K τὸ ζητούμενον ἄθροισμα,

θὰ εἶναι

$$K = α + β + γ + \dots + ρ + σ + τ$$

ὡσαύτως

$$K = τ + σ + ρ + \dots + γ + β + α$$

διότι οἱ αὐτοὶ ὅροι ἐγράφησαν κατ' ἀντίστροφον τάξιν.

Ἐκ τούτου ἔπεται

$$2K = (α + τ) + (β + σ) + (γ + ρ) + \dots + (ρ + γ) + (σ + β) + (τ + α).$$

καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὴν προηγουμένως ἀποδειχθεῖσαν ιδιότητα. τὰ ἐντὸς τῶν παρενθέσεων ἀθροίσματα εἶναι πάντα ἴσα ἀλλήλοις, εἶναι δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀθροισμάτων τούτων  $v$  (ὅσον καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὄρων τῆς προόδου), ἔπεται

$$2K = (\alpha + \tau)v,$$

ἐξ οὗ καὶ

$$K = \frac{v(\alpha + \tau)}{2} \quad (2)$$

τοῦτ' ἔστι

Τὸ ἀθροισμα τῶν ὄρων πάσης ἀριθμητικῆς προόδου εὐρίσκεται, ἐὰν πολλαπλασιασθῇ ὁ τὸ πλῆθος αὐτῶν ἐκφράζων ἀριθμὸς ἐπὶ τὸ ἡμί-θροισμα τῶν ἄκρων ὄρων.

Ἐὰν π. χ. ζητῆται τὸ ἀθροισμα πάντων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ 1000, θὰ εἶναι  $v=1000$ ,  $\alpha=1$  καὶ  $\tau=1000$ , ἄρα  $K=1001 \cdot 500=500500$ .

219. Δυνατὸν νὰ δοθῶσιν ὁ πρῶτος ὄρος τῆς προόδου καὶ ὁ λόγος αὐτῆς καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὄρων, νὰ ζητῆται δὲ τὸ ἀθροισμα τῶν ὄρων· τότε εὐρίσκομεν κατὰ πρῶτον τὸν τελευταῖον ὄρον ἐκ τοῦ τύπου (1) καὶ ἔπειτα ἐφαρμόζομεν τὸν τύπον (2)

ΣΗΜ. Οἱ πέντε ἀριθμοὶ  $\alpha$ ,  $\tau$ ,  $v$ ,  $\omega$  καὶ  $K$ , οἵτινες θεωροῦνται ἐν πάσῃ ἀριθμητικῇ προόδῳ, συνδέονται πρὸς ἀλλήλους διὰ τῶν ἐξισώσεων

$$\tau = \alpha + (v-1)\omega, \quad K = \frac{v(\alpha + \tau)}{2}.$$

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι, δοθέντων τῶν τριῶν ἐξ αὐτῶν, οἱ λοιποὶ δύο πρέπει νὰ προσδιορίζωνται ἐκ τῶν δύο ἐξισώσεων, ἐν αἷς περιέχονται ὡς ἄγνωστοι.

Ἐπειδὴ δὲ ἐκ πέντε πραγμάτων δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὰ δύο κατὰ δέκα διαφόρους τρόπους, ἔπεται ὅτι δύνανται νὰ προταθῶσιν ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν τούτων δέκα διάφορα προβλήματα.)

### Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Εὐρεῖν τὸ ἀθροισμα πάντων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ  $v$ .

$$\left( \text{Ἀπ. } \frac{v(v+1)}{2} \right).$$

2) Εὐρεῖν τὸ ἀθροισμα τῶν  $v$  περιττῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ 1 καὶ ἐφεξῆς κατὰ σειράν.

$$\left( \text{Ἀπ. } v^2 \right).$$

3) Εὐρεῖν τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ τῆς μονάδος μέχρι τοῦ  $v$ .

Ἐὰν εἰς τὴν ταυτότητα  $(\alpha+1)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2 + 3\alpha + 1$  τεθῇ κατὰ σειράν  $\alpha=1, 2, 3, \dots, v$ , καὶ προστεθῶσι κατὰ μέλη αἱ προ-

κύπτουσαι ισότητες, εὐρίσκεται ἡ ισότης

$$(v+1)^3 = 1^3 + 3(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + v^2) + 3(1 + 2 + 3 + \dots + v) + v$$

καὶ ἐπειδὴ εἶναι  $1 + 2 + 3 + \dots + v = \frac{1}{2} v(v+1)$ ,

ἡ εὐρεθεῖσα ισότης γίνεται

$$(v+1)^3 = 1 + 3(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + v^2) + \frac{3}{2} v(v+1) + v,$$

ἐξ ἧς  $3(1^2 + 2^2 + \dots + v^2) = (v+1)^3 - \frac{3}{2} v(v+1) - v - 1$

καὶ  $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + v^2 = \frac{v(v+1)(2v+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$ .

4) Ἀποδείξαι, ὅτι εἶναι

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + v^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \dots + v)^2.$$

5) Θέλων τις νὰ ἀνορύξη φρέαρ, συνεφώνησε μετὰ τῶν ἐργατῶν ὡς ἐξῆς. Διὰ τὴν πρώτην ὀργυιὰν τοῦ βάθους νὰ πληρώσῃ 5 δραχμάς, διὰ τὴν δευτέραν 10, διὰ τὴν τρίτην 15· καὶ οὕτω καθεξῆς δι' ἐκάστην ἐπομένην ὀργυιὰν 5 δραχμάς περισσότερον. Τὸ ὕδωρ εὐρέθη εἰς βάθος 18 ὀργυιῶν. Πόσον θὰ πληρώσῃ; (Ἀπ. 855).

6) Δύο ἀριθμητικῶν προόδων δοθεισῶν, εὐρεῖν τοὺς κοινούς αὐτῶν ὄρους. Ἄς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἐδόθησαν αἱ ἐξῆς πρόοδοι

10	13	16...	λόγος 3
8	15	22...	λόγος 7.

Ὁ τυχὼν ὄρος τῆς πρώτης ὁ ἔχων τὴν τάξιν τ εἶναι  $10 + 3(\tau - 1)$ · ὁ δὲ τυχὼν ὄρος τῆς δευτέρας, ὁ ἔχων τὴν τάξιν υ, θὰ εἶναι  $8 + 7(u - 1)$ · ἔταν δὲ οἱ ὄροι οὗτοι εἶναι ἴσοι, οἱ ἀκέραιοι τ καὶ υ συνδέονται διὰ τῆς ισότητος  $10 + 3(\tau - 1) = 8 + 7(u - 1)$  ἢ  $3\tau - 7u = -6$ .

Ἡ ἐξίσωσις αὕτη ἔχει ἀκεραίας λύσεις ἀπείρους τὸ πλῆθος (ἐδ. 168)· δίδονται δὲ αὗται ὑπὸ τῶν ἐξῆς τύπων

$$\tau = -2 + 7\omega \qquad \qquad \qquad \omega = 3\omega'$$

ἐξ ὧν εὐρίσκομεν ὑποθέτοντες  $\omega = 1, 2, 3, \dots$

$\tau = 5,$	12,	19,	26,	33,	40....
$\omega = 3,$	6,	9,	12,	15,	18....

Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι θὰ εἶναι ἴσοι ὁ 5<sup>ος</sup> ὄρος τῆς α' καὶ ὁ 3<sup>ος</sup> τῆς β', ὁ 12<sup>ος</sup> τῆς α' καὶ ὁ 6<sup>ος</sup> τῆς β', ὁ 19<sup>ος</sup> τῆς α' καὶ ὁ 9<sup>ος</sup> τῆς β', καὶ οὕτω καθεξῆς.

Ὅμοίως εὐρίσκομεν καὶ περισσοτέρων ἀριθμητικῶν προόδων τοὺς κοινούς ὄρους.

7) Εὐρεῖν τὸ ἄθροισμα πάντων τῶν ἀριθμῶν τῶν μικροτέρων τοῦ 1000, οἵτινες διαιροῦνται διὰ τοῦ 7.



Β'.) ΠΡΟΟΔΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ

220. Σειρά ἀριθμῶν, ὧν ἕκαστος γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου πολλαπλασιασθέντος ἐπὶ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, λέγεται, ὅτι ἀποτελεῖ πρόοδον γεωμετρικὴν ἢ κατὰ πληθύνον τοιοῦτοι εἶναι οἱ ἀριθμοὶ

$$2 \quad 4 \quad 8 \quad 16 \quad 32 \quad 64 \dots,$$

ὧν ἕκαστος γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου του πολλαπλασιασθέντος ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν 2.

Τοιοῦτοι καὶ οἱ ἀριθμοὶ

$$1 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{1}{32} \dots,$$

ὧν ἕκαστος γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου πολλαπλασιασθέντος ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν  $\frac{1}{2}$ .

Οἱ πρόοδον ἀποτελοῦντες ἀριθμοὶ λέγονται ὄροι τῆς προόδου, ὁ δὲ ἀριθμὸς, ὅστις πολλαπλασιάζων ἕκαστον ὄρον παράγει τὸν ἐπόμενον, λέγεται λόγος τῆς προόδου.

Ἡ πρόοδος εἶναι αὐξουσα, ἐὰν οἱ ὄροι αὐτῆς προβαίνωσιν αὐξανόμενοι, ὡς συμβαίνει, ὅταν ὁ λόγος ὑπερβαίνει τὴν μονάδα· φθίνουσα δέ, ἐὰν οἱ ὄροι προβαίνωσιν ἐλαττούμενοι, ὡς συμβαίνει ὅταν ὁ λόγος εἴη μικρότερος τῆς μονάδος.

**Εὗρεςις τοῦ ὄρου τοῦ κατέχοντος ὠρισμένην τάξιν ἐν γεωμετρικῇ προόδῳ.**

221. Ἐν πάσῃ γεωμετρικῇ προόδῳ ἕκαστος ὄρος ἰσοῦται τῷ πρώτῳ πολλαπλασιασθέντι ἐπὶ δύναμιν τοῦ λόγου ἔχουσαν ἐκθέτην τὸν ἀριθμὸν τῶν προηγουμένων ὄρων.

Διότι, ἂν παρασταθῇ διὰ τοῦ  $\alpha$  ὁ πρῶτος ὄρος γεωμετρικῆς προόδου καὶ διὰ τοῦ  $\tau$  ὁ νῆς, διὰ δὲ τοῦ  $\omega$  ὁ λόγος, θὰ εἴησι

πρῶτος ὄρος	$\alpha$
δεύτερος	$\alpha\omega$
τρίτος	$\alpha\omega^2$
τέταρτος	$\alpha\omega^3$

καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς.

Ὡστε ὁ ὄρος  $\tau$  ὁ τὴν νῆν τάξιν κατέχων καὶ τοῦ ὁποίου προηγούνται  $\nu-1$  ἄλλοι ὄροι, θὰ εἴησι

$$(1) \quad \tau = \alpha \cdot \omega^{\nu-1}.$$

**Ἐφαρμογὰί.**

Εὐρεῖν τὸν 20<sup>όν</sup> ὄρον τῆς προόδου

$$1 \quad 2 \quad 4 \quad 8 \quad 16 \dots \quad \text{λόγος } 2.$$

Ἐπειδὴ τοῦ εἰκοστοῦ ὄρου προηγούνται 19 ἄλλοι, ὁ ὄρος οὗτος ἰσοῦται τῷ 1. (2)<sup>19</sup>, ἤτοι τῷ 524288.

Εὐρεῖν τὸν 30<sup>όν</sup> ὄρον τῆς προόδου

$$1 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{16} \dots \quad \text{λόγος } \frac{1}{2}.$$

Ἐπειδὴ προηγούνται αὐτοῦ 29 ὄροι, θὰ εἶναι ἴσος τῷ

$$1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{29}, \quad \text{ἤτοι τῷ } \frac{1}{2^{29}} \quad \text{ἢ } \frac{1}{536870912}.$$

**Ἄθροισμα τῶν ὄρων γεωμετρικῆς προόδου.**

222. Ἄς ἀποτελῶσιν οἱ ἀριθμοὶ

$$\alpha \quad \beta \quad \gamma \dots \quad \rho \quad \sigma \quad \tau$$

γεωμετρικὴν πρόοδον καὶ ἄς παρασταθῆ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν διὰ τοῦ K, ἤτοι ἔστω

$$K = \alpha + \beta + \gamma + \dots + \rho + \sigma + \tau. \quad (\alpha)$$

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ἴσους ἀριθμοὺς ἐπὶ τὸν λόγον τῆς προόδου, εὐρίσκομεν

$$K\omega = \alpha\omega + \beta\omega + \gamma\omega + \dots + \rho\omega + \sigma\omega + \tau\omega.$$

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι  $\alpha\omega = \beta$ ,  $\beta\omega = \gamma \dots$ ,  $\rho\omega = \sigma$ ,  $\sigma\omega = \tau$ , ἡ δευτέρα ἰσότης δύναται νὰ γραφῆ καὶ ὡς ἐξῆς

$$K\omega = \beta + \gamma + \dots + \rho + \sigma + \tau + \tau\omega.$$

Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν δύο ἴσων ἀφαιρέσωμεν τὰ ἴσα (α), εὐρίσκομεν

$$K\omega - K = \tau\omega - \alpha$$

$$\text{ἢ} \quad K(\omega - 1) = \tau\omega - \alpha \quad (\beta)$$

καί, ἂν ὁ  $\omega$  διφέρῃ τῆς μονάδος 1,

$$K = \frac{\tau\omega - \alpha}{\omega - 1}, \quad (2)$$

τουτέστι τὸ ἄθροισμα τῶν ὄρων πάσης γεωμετρικῆς προόδου εὐρίσκεται, ἂν ὁ τελευταῖος πολλαπλασιασθῆ ἐπὶ τὸν λόγον καὶ ἀπὸ τοῦ γινόμενου ἀφαιρεθῆ ὁ πρῶτος ὄρος, τὸ δὲ ὑπόλοιπον διαιρεθῆ διὰ τοῦ λόγου ἡλαττωμένου κατὰ μονάδα.

Ἐπειδὴ ὁ τύπος (2) γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς

$$K = \tau + \frac{\tau - \alpha}{\omega - 1} \quad (2')$$

συνάγομεν, ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν ὄρων τῆς γεωμετρικῆς προόδου ἰσοῦ-

ται τῷ τελευταίῳ ὄρω ἠϋξημένῳ κατὰ τὸ πληθικόν, ὅπερ εὐρίσκομεν διαιροῦντες τὴν διαφορὰν τῶν ἄκρων διὰ τῆς διαφορᾶς τοῦ λόγου ἀπὸ τῆς μονάδος.

Ἐὰν ὁ λόγος τῆς προόδου εἶναι ἴσος τῇ μονάδι 1, ἡ ἐξίσωσις (β) δὲν δίδει τὸ ἄθροισμα K· διότι γίνεται  $0=0$ · ἀλλὰ τότε τὸ ἄθροισμα K εὐρίσκεται ἀμέσως ἐκ τῆς προόδου· διότι πάντες οἱ ὄροι εἶναι ἴσοι· ὥστε, ἂν τὸ πλῆθος αὐτῶν εἶναι ν, θὰ εἶναι  $K=v\alpha$ .

Δυνατὸν νὰ δοθῶσιν, ὁ πρῶτος ὄρος τῆς γεωμετρικῆς προόδου καὶ ὁ λόγος αὐτῆς καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὄρων, νὰ ζητηθῆται δὲ τὸ ἄθροισμα τῶν ὄρων· τότε εὐρίσκομεν πρῶτον τὸν τελευταῖον ὄρον ἐκ τοῦ τύπου (1) καὶ ἔπειτα ἐφαρμόζομεν τὸν τύπον (2), ὅτε εὐρίσκομεν εὐκόλως

$$K = \frac{\alpha(\omega^v - 1)}{\omega - 1}$$

ΣΗΜ. Τὸν τύπον τοῦτον δυνάμεθα καὶ ἄλλως νὰ εὐρωμεν· τρώντι κατὰ τὰ δεδομένα οἱ προσθετοὶ ὄροι εἶναι

$$\alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \dots + \alpha\omega^{v-1}$$

ἢ  $\alpha(1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{v-1})$ ,

ἀλλὰ τὸ ἐν τῇ παρενθέσει ἄθροισμα εὐρίσκεται ὡς πληθικόν τῆς διαιρέσεως

$$\frac{\omega^v - 1}{\omega - 1}$$

ἐντεῦθεν ἔπεται, ὅτι τὸ ἄθροισμα ἰσοῦται τῷ

$$\frac{\alpha(\omega^v - 1)}{\omega - 1}$$

### Θεωρήματα περὶ τῶν φθινουσῶν γεωμετρικῶν προόδων, αἵτινες ἔχουσιν ἄπειρον πλῆθος ὄρων (θετικῶν)

223. Ἐὰν ἐκ τῶν ἀπειρῶν τὸ πλῆθος ὄρων τῆς φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου

$$\alpha \quad \alpha\omega \quad \alpha\omega^2 \quad \alpha\omega^3 \dots \quad (\omega < 1)$$

ληφθῶσιν ὁσοιδῆποτε (εἶτε κατὰ σειρὰν εἶτε καὶ μὴ), τὸ ἄθροισμα τῶν ληφθέντων εἶναι πάντοτε μικρότερον ἀριθμοῦ τινος.

Ἐὰς ληφθῶσιν ὁσοιδῆποτε ὄροι καὶ ἐκ τῶν ληφθέντων ἔστω ὁ τὴν μεγίστην τάξιν κατέχων ὁ  $\alpha\omega^m$ · τότε πάντες οἱ ληφθέντες εὐρίσκονται μεταξὺ τῶν ὄρων  $\alpha \quad \alpha\omega \quad \alpha\omega^2 \quad \alpha\omega^3 \dots \alpha\omega^m$

καὶ ἐπομένως τὸ ἄθροισμα αὐτῶν δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἐξῆς

$$\alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \alpha\omega^3 + \dots + \alpha\omega^m$$

τουτο δέ, ἐάν διὰ τοῦ τ παρασταθῇ ὁ τελευταῖος ὄρος, εἶναι

$$\frac{\tau\omega - \alpha}{\omega - 1} \quad \eta \quad \frac{\alpha - \tau\omega}{1 - \omega} \quad \eta \quad \frac{\alpha}{1 - \omega} - \frac{\tau\omega}{1 - \omega},$$

ἀλλὰ καὶ τοῦτο εἶναι μικρότερον τοῦ ἀριθμοῦ  $\frac{\alpha}{1 - \omega}$ . ὥστε, ὅσουσδήποτε ὄρους τῆς φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου καὶ ἂν προσθέσωμεν, πάντοτε εὐρίσκομεν ἄθροισμα μικρότερον τοῦ ἀριθμοῦ  $\frac{\alpha}{1 - \omega}$ .

224. Δοθέντος ἀριθμοῦ ὅσονδήποτε μικροῦ, εὐρίσκεται ὄρος τῆς φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου μικρότερος αὐτοῦ (ὡς καὶ πάντες οἱ ἐπόμενοι).

Ἐστω ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς ε· ἂν πάντες οἱ ὄροι τῆς προόδου ἦσαν μεγαλύτεροι τοῦ ε, θὰ ἦτο δυνατόν, λαμβάνοντες ἱκανοὺς τὸ πλῆθος καὶ προσθέτοντες, νὰ εὕρωμεν ἄθροισμα ὑπερβαῖνον πάντα ἀριθμὸν· διότι καὶ ὁ ε πολλάκις ἐπαναλαμβάνομενος γίνεται μείζων παντὸς ἀριθμοῦ· ἀλλὰ τοῦτο δὲν συμβαίνει· ἐπομένως ὑπάρχει τις ὄρος μικρότερος τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ καὶ πάντες δὲ οἱ ἐπόμενοι αὐτοῦ εἶναι ὡσαύτως μικρότεροι τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ.

225. Ἐὰν λαμβάνωμεν τοὺς ὄρους τῆς φθινούσης προόδου κατὰ σειρὰν ἀπ' ἀρχῆς καὶ προσθέτωμεν, ὅσον περισσοτέρους ὄρους λαμβάνομεν, τόσοσ προσεγγίζομεν εἰς τὸν ἀριθμὸν  $\frac{\alpha}{1 - \omega}$ · καὶ, δοθέντος ἀριθμοῦ ὅσονδήποτε μικροῦ, δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τόσοσ ὄρους τῆς προόδου, ὥστε τὸ ἄθροισμα τῶν ληφθέντων νὰ διαφέρει τοῦ  $\frac{\alpha}{1 - \omega}$  διαφορὰν μικροτέραν τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ.

Καὶ ὄντως, τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὄρων τῆς φθινούσης προόδου  $\alpha \quad \beta \quad \gamma \dots \tau$  (ἂν ὁ λόγος αὐτῆς παρασταθῇ διὰ τοῦ  $\omega$ )

$$\text{εἶναι} \quad \frac{\alpha}{1 - \omega} - \frac{\omega\tau}{1 - \omega}$$

καὶ διαφέρει ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ  $\frac{\alpha}{1 - \omega}$  κατὰ  $\frac{\omega\tau}{1 - \omega}$ . ἀλλ' ἡ διαφορὰ αὕτη

εἶναι γινόμενον δύο παραγόντων, ὧν ὁ μὲν εἰς  $\frac{\omega}{1 - \omega}$  μένει ἀμετάβλητος, ὁ δὲ ἕτερος εἶναι ὁ τελευταῖος ὄρος τοῦ ἀθροίσματος, ὅστις κατὰ τὰ ἀποδειχθέντα γίνεται μικρότερος παντὸς δοθέντος ἀριθμοῦ· ἐπομένως

καὶ τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν  $\frac{\omega}{1-\omega}$ , τοῦτ' ἔστιν ἡ θεωρου-  
μένη διαφορὰ, γίνεται μικρότερον παντὸς δοθέντος ἀριθμοῦ.

Τὴν ιδιότητα ταύτην τῆς φθίνουσας γεωμετρικῆς προόδου ἐκφρά-  
ζομεν συντόμως λέγοντες, ὅτι τὸ ἄθροισμα πάντων τῶν ὄρων αὐτῆς  
ἀποτελεῖ τὸν ἀριθμὸν  $\frac{\alpha}{1-\omega}$ ,

ἢτοι τὸν πρῶτον ὄρον διαιρεθέντα διὰ τῆς μονάδος ἡλαττωμένης κατὰ  
τὸν λόγον.

### Ἐφαρμογὴ.

1) Τὸ ἄθροισμα πάντων τῶν ὄρων τῆς προόδου

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots$$

ἰσοῦται τῷ  $\frac{1}{1-\frac{1}{2}}$  ἢτοι τῷ 2.

2) Τὸ ἄθροισμα τῶν ὄρων τῆς προόδου

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{A^2} + \frac{1}{A^3} + \dots \quad A > 1$$

εἶναι  $\frac{1}{A-1}$ .

3) Εὐρεῖν τὸ ἄθροισμα πασῶν τῶν ἀκεραίων καὶ θετικῶν δυνάμεων  
τοῦ κλάσματος  $\frac{\alpha}{\beta}$  ( $\beta > \alpha$ )

ἢτοι τὸ ἄθροισμα  $\frac{\alpha}{\beta} + \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 + \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^3 + \dots$  (Ἀπ.  $\frac{\alpha}{\beta-\alpha}$ ).

4) Πᾶν ἀπλοῦν περιοδικὸν κλάσμα δύναται νὰ ἐκληφθῇ ὡς ἄθροισμα  
τῶν ὄρων γεωμετρικῆς προόδου· διότι ἔστω τὸ κλάσμα

$$0,52525252 \dots$$

τοῦτο εἶναι  $\frac{52}{100} + \frac{52}{100^2} + \frac{52}{100^3} + \dots$

καὶ τὸ ἄθροισμα πάντων τούτων τῶν κλασμάτων εἶναι κατὰ τὰ προηγούμενα

$$\frac{\frac{52}{100}}{1-\frac{1}{100}} \quad \text{ἢτοι} \quad \frac{52}{99},$$

ὅπερ καὶ ἐκ τῆς ἀριθμητικῆς εἶναι γνωστὸν.

5) Εἰς δοθὲν τετράγωνον ἐγγράφομεν ἄλλο τετράγωνον συνάπτοντες

τὰ μέσα τῶν πλευρῶν αὐτοῦ· εἰς τοῦτο πάλιν ἄλλο· καὶ οὕτω καθεξῆς εἰς ἄπειρον· ζητεῖται τὸ ἄθροισμα πάντων τούτων τῶν τετραγώνων.

(Ἄπ.  $2\alpha^2$ , ἔνθα  $\alpha$  δηλοῖ τὴν πλευρὰν τοῦ δοθέντος τετραγώνου)

6) Ἀνθρωπὸς τις διέταξεν ἐν τῇ διχθήκῃ του νὰ μερισθῇ ἡ περιουσία αὐτοῦ εἰς τοὺς τρεῖς υἱοὺς του ὡς ἐξῆς· ὁ μὲν πρωτότοκος νὰ λάβῃ

τὸ  $\frac{1}{2}$ , ὁ δὲ δεύτερος τὸ  $\frac{1}{4}$  καὶ ὁ τελευταῖος τὸ  $\frac{1}{5}$  τῆς περιουσίας·

δὲν ἐσυλλογίσθη ὁμως, ὅτι τὰ τρία ταῦτα μέρη (τὸ ἡμισυ καὶ τὸ τέταρτον καὶ τὸ πέμπτον) δὲν συναποτελοῦσι τὴν ὅλην περιουσίαν, ἀλλὰ

μόνον τὰ  $\frac{19}{20}$  αὐτῆς· πῶς πρέπει νὰ γίνῃ ἡ διανομή, ἵνα ὅσον τὸ

δυνατὸν πραγματωθῇ ἡ θέλησις τοῦ διαθέτου;

Λύσις. Ἀφοῦ δοθῇ τὸ ἡμισυ τῆς περιουσίας εἰς τὸν πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον αὐτῆς εἰς τὸν δεύτερον καὶ τὸ πέμπτον αὐτῆς εἰς τὸν τρίτον,

θὰ μείνῃ τὸ  $\frac{1}{20}$  τῆς περιουσίας· τοῦτο δέ, ὡς πατρικὴ περιουσία, ἵα

διανεμηθῇ πάλιν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ νέον περίσσευμα  $\left(\frac{1}{20}\right)^2$

θὰ διανεμηθῇ πάλιν ὁμοίως, καὶ οὕτω καθεξῆς ἐπ' ἄπειρον.

Οὕτως εὐρίσκομεν, ὅτι τὰ τρία μερίδια εἶναι

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{20} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{20}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{20}\right)^3 + \dots \quad \text{ἦτοι} \quad \frac{10}{19}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{20}\right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{20}\right)^3 + \dots \quad \text{ἦτοι} \quad \frac{5}{19}$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{20} + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{20}\right)^2 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{20}\right)^3 + \dots \quad \text{ἦτοι} \quad \frac{4}{19}$$

7) Δύο κινητὰ Α καὶ Β κινουῦνται ἐπὶ μιᾶς εὐθείας καὶ ἀπέχουσι τὴν στιγμὴν ταύτην ἀπ' ἀλλήλων ἀπόστασιν ἴσην τῇ  $\alpha$ · ἡ κίνησις ἀμφοτέρων γίνεται κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν ΑΒ, εἶναι δὲ ἡ ταχύτης  $\tau$  τοῦ Α μεγαλύτερα τῆς ταχύτητος  $\tau'$  τοῦ Β. Ζητεῖται, μετὰ πόσον χρόνον ἀπὸ τῆς παρούσης στιγμῆς τὸ Α θὰ φθάσῃ τὸ Β.

Λύσις. Ἰνα τὸ Α φθάσῃ τὸ Β, πρέπει πρῶτον νὰ διανύσῃ τὸ χωρίζον νῦν αὐτὰ διάστημα  $\alpha$ · καὶ πρὸς τοῦτο χρειάζεται χρόνον  $\frac{\alpha}{\tau}$  (διότι  $\tau$  εἶναι ἡ ταχύτης του)· ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ τὸ κινητὸν Β θὰ προχω-

ρήση κατὰ τὸ διάστημα  $\frac{\alpha}{\tau} \tau'$  (διότι  $\tau'$  εἶναι ἡ ταχύτης του) ὥστε μετὰ παρέλευσιν τοῦ χρόνου  $\frac{\alpha}{\tau}$  ἡ ἀπόστασις τῶν δύο κινητῶν θὰ εἶναι  $\alpha \cdot \frac{\tau'}{\tau}$ . ἀνάγκη λοιπὸν τὸ Α νὰ διανύσῃ καὶ τὸ διάστημα τοῦτο (ἵνα φθάσῃ τὸ Β) καὶ πρὸς τοῦτο χρειάζεται δευτέρον χρονικὸν διάστημα  $\frac{\alpha}{\tau} \cdot \frac{\tau'}{\tau}$ .

Ἐν τῷ δευτέρῳ τούτῳ χρονικῷ διαστήματι τὸ κινητὸν Β θὰ προχωρήσῃ κατὰ τὴν ἀπόστασιν  $\frac{\alpha}{\tau} \cdot \frac{\tau'}{\tau} \tau'$  ἥτοι  $\alpha \left(\frac{\tau'}{\tau}\right)^2$ . τὴν λοιπὴν θὰ εἶναι ἡ ἀπόστασις τῶν δύο κινητῶν εἰς τὸ τέλος τοῦ δευτέρου χρονικοῦ διαστήματος· ἀνάγκη ἄρα τὸ Α νὰ διανύσῃ καὶ τὴν ἀπόστασιν ταύτην καὶ πρὸς τοῦτο χρειάζεται τρίτον χρονικὸν διάστημα  $\frac{\alpha}{\tau} \cdot \left(\frac{\tau'}{\tau}\right)^2$ .

Ἐξακολουθοῦντες τοιοῦτοτρόπως, βλέπομεν, ὅτι ἵνα τὸ Α φθάσῃ τὸ Β, χρειάζεται ἀπειρα τὸ πλῆθος χρονικὰ διαστήματα, τὰ ἐξῆς

$$\frac{\alpha}{\tau}, \quad \frac{\alpha}{\tau} \left(\frac{\tau'}{\tau}\right), \quad \frac{\alpha}{\tau} \left(\frac{\tau'}{\tau}\right)^2, \quad \frac{\alpha}{\tau} \left(\frac{\tau'}{\tau}\right)^3, \dots$$

δὲν πρέπει ὅμως ἐκ τούτου νὰ συμπεράνωμεν (\*), ὅτι τὸ Α οὐδέποτε θὰ φθάσῃ τὸ Β· διότι τὰ ἀπειροπληθῆ ταῦτα χρονικὰ διαστήματα συναποτελοῦσι χρονικόν τι διάστημα πεπερασμένον. Καὶ ὄντως τὰ χρονικὰ ταῦτα διαστήματα εἶναι ὅροι μιᾶς φθινοῦσης γεωμετρικῆς προόδου· ἄρα τὸ σύνολον αὐτῶν ἀποτελεῖ τὸν χρόνον

$$\frac{\frac{\alpha}{\tau}}{1 - \frac{\tau'}{\tau}} \quad \text{ἥτοι} \quad \frac{\alpha}{\tau - \tau'} \quad (\text{παράβαλε ἐδ. 147}),$$

εἰς τὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἡ ἀπόστασις τῶν κινητῶν θὰ εἶναι 0.

8) Ἐάν τις διπλασιάζῃ κατ' ἔτος τὴν περιουσίαν του καὶ ἀρχίσῃ ἀπὸ 1 λεπτόν, πόσα λεπτά θὰ ἔχῃ μετὰ 40 ἔτη;

(Ἄπ.  $2^{40}$  λεπτά, ἥτοι 10 995 116 277 δρ., 76).

(\*) Οὕτω συνεπείρουν οἱ ἀρχαῖοι σοφισταὶ καὶ ἀπεδείκνουν, ὅτι ὁ ὠκύπους Ἀχιλλεύς δὲν ἠδύνατο νὰ φθάσῃ τὴν χελώνην, οὐδὲ ἂν ἐν μόνον βῆμα ὑπελείπετο αὐτῆς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ

Ὡς βάσιν τῆς θεωρίας τῶν λογαρίθμων λαμβάνομεν τὴν ἐξῆς στοιχειώδη ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν θετικῶν καὶ μεγαλητέρων τῆς μονάδος ἔχει τόσα ψηφία ἀκέραια, ὅσα ἔχουσιν ἀμφότεροι οἱ παράγοντες, ἢ ἐν ὀλιγώτερον.

Ἡ ιδιότης αὕτη δύναται νὰ ὑποθεθῇ γνωστὴ ἐκ τῆς ἀριθμητικῆς, ἀλλὰ χάριν ἀκριβείας ἀποδεικνύομεν αὐτὴν ἐνταῦθα.

Ἄς λάβωμεν ὡς παράδειγμα δύο ἀριθμοὺς ἔχοντας ἀκέραια ψηφία ὁ μὲν εἰς 3, ὁ δὲ ἄλλος 5. Ὁ μὲν πρῶτος θὰ εἶναι ἴσος ἢ μεγαλήτερος τοῦ  $100(=10^2)$ , ἀλλὰ μικρότερος τοῦ  $1000(=10^3)$ . ὁ δὲ δεύτερος θὰ εἶναι ἴσος ἢ μεγαλήτερος τοῦ  $10000(=10^4)$ , ἀλλὰ μικρότερος τοῦ  $100000(=10^5)$ . Ἄρα τὸ γινόμενόν των θὰ εἶναι ἴσον ἢ μεγαλήτερον τοῦ γινομένου  $10^2 10^4$  ἤτοι τοῦ  $10^6$ , ἀλλὰ μικρότερον τοῦ γινομένου  $10^3 10^5$  ἤτοι τοῦ  $10^8$ . Καὶ ἐπειδὴ τὸ γινόμενον τῶν δύο ἀριθμῶν εἶναι ἴσον ἢ μεγαλήτερον τοῦ  $10^6$ , θὰ ἔχη τοῦλάχιστον 7 ψηφία (ὅσα ἔχει ὁ  $10^6$ ). ἀλλ' ἐπειδὴ πάλιν εἶναι μικρότερον τοῦ  $10^8$ , δὲν δύναται νὰ ἔχη 9 ψηφία (διότι ὁ  $10^8$  εἶναι ὁ ἐλάχιστος ἐκ τῶν ἀριθμῶν τῶν ἐχόντων 9 ψηφία), ἄρα θὰ ἔχη ἢ 7 ψηφία ἢ 8.

Ὁμοίως γίνεται ἡ ἀπόδειξις, ὅσαδήποτε ψηφία καὶ ἀνέχωσιν οἱ ἀριθμοί.

### Ὁρισμός.

226. Ἀριθμοῦ ἀκεραίου καὶ θετικοῦ λέγεται θέμα ὁ τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων αὐτοῦ ἐκφράζων ἀριθμὸς κατὰ μονάδα ἠλαττωμένος.

Παραδείγματος χάριν τοῦ ἀριθμοῦ 5 θέμα εἶναι 0, τοῦ ἀριθμοῦ 37 θέμα εἶναι 1, τοῦ 3893 ὁ 3 καὶ τοῦ 73805 ὁ 4.

227. Παντὸς ἀριθμοῦ θετικοῦ καὶ μεγαλητέρου τῆς μονάδος θέμα λέγεται τὸ θέμα τοῦ ἀκεραίου μέρους αὐτοῦ.

Παραδείγματος χάριν τοῦ 3,55 θέμα εἶναι τὸ τοῦ 3 ἤτοι 0, καὶ τοῦ 18,7 θέμα εἶναι τὸ τοῦ 18 ἤτοι 1.

### Ἰδιότητες τῶν θεμάτων.

228. Τὸ θέμα τοῦ γινομένου δύο ἀριθμῶν εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν θεμάτων τῶν παραγόντων, ἢ ὑπερβαίνει αὐτὸ κατὰ μονάδα.



Ἄς ὑποθέσωμεν δύο ἀριθμοὺς ἔχοντας θέματα, ὁ μὲν εἰς τὸ 3, ὁ δὲ ἄλλος τὸ 8· λέγω, ὅτι τὸ γινόμενόν των θὰ ἔχη θέμα  $\eta$  τὸ 11 ἢ τὸ 12.

Διότι ὁ μὲν πρῶτος ἀριθμὸς ἔχει 4 ψηφία (ἀκέραια), ὁ δὲ δεύτερος 9· ἄρα τὸ γινόμενόν των θὰ ἔχη ψηφία  $\eta$  12 ἢ 13 καὶ διὰ τοῦτο θὰ ἔχη θέμα  $\eta$  τὸ 11 (ἂν ἔχη 12 ψηφία) ἢ τὸ 12 (ἂν ἔχη 13 ψηφία).

### Παραδείγματα.

θεμ. (185)=2 θεμ. (3974)=3	θεμ. (87)=1 θεμ. (542)=2
θεμ. γινομένου 735190=5	θεμ. γινομένου 47154=4

229. Τὸ θέμα παντὸς ἀριθμοῦ ἀποτελεῖ τὰς δεκάδας εἰς τὸ θέμα τῆς δεκάτης δυνάμεως αὐτοῦ.

Ἐστω ἀριθμὸς τις  $\alpha$  ἔχων θέμα 3· λέγω, ὅτι τὸ θέμα τοῦ  $\alpha^{10}$  θὰ ἔχη 3 δεκάδας, ἥτοι θὰ εἶναι εἰς ἓκ τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν

30    31    32    33    34    35    36    37    38    39.

Διότι τὸ θέμα τοῦ γινομένου  $\alpha \cdot \alpha$ , ἥτοι τοῦ  $\alpha^2$ , θὰ εἶναι  $\eta$  6 ἢ 6+1, δυνάμεθα λοιπὸν νὰ γράψωμεν

$$\text{θεμ. } (\alpha^2) = 6 + \epsilon_1, \quad \text{ἔνθα } \epsilon_1 \text{ εἶναι } \eta \text{ 0 } \eta \text{ 1.}$$

Καὶ τὸ θέμα τοῦ γινομένου  $\alpha^2 \alpha$ , ἥτοι τοῦ  $\alpha^3$ , θὰ εἶναι  $\eta$  9+ $\epsilon_1$  ἢ 9+ $\epsilon_1$ +1· δυνάμεθα λοιπὸν νὰ γράψωμεν

$$\text{θεμ. } (\alpha^3) = 9 + \epsilon_1 + \epsilon_2, \quad \text{ἔνθα } \epsilon_2 \text{ εἶναι } \eta \text{ 0 } \eta \text{ 1.}$$

Καὶ τὸ θέμα τοῦ γινομένου  $\alpha^3 \alpha$ , ἥτοι τοῦ  $\alpha^4$ , θὰ εἶναι  $\eta$  12+ $\epsilon_1$ + $\epsilon_2$  ἢ 12+ $\epsilon_1$ + $\epsilon_2$ +1· δυνάμεθα λοιπὸν νὰ γράψωμεν

$$\text{θεμ. } (\alpha^4) = 12 + \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3, \quad \text{ἔνθα } \epsilon_3 \text{ εἶναι } \eta \text{ 0 } \eta \text{ 1.}$$

Ἐξακολουθοῦντες τοιοῦτοτρόπως βλέπομεν, ὅτι εἶναι

$$\text{θεμ. } (\alpha^{10}) = 30 + \epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_9,$$

ἔνθα ἕκαστον τῶν  $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_9$  εἶναι  $\eta$  0 ἢ 1.

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι τὸ θέμα τοῦ  $\alpha^{10}$  δὲν εἶναι μικρότερον τοῦ 30 οὐδὲ μεγαλύτερον τοῦ 39· ἄρα θὰ εἶναι εἰς ἓκ τῶν ἀριθμῶν

30,    31,    32, ..... 39

Ἐκ τούτου συναίγεται τὸ ἐξῆς.

Ἐστω ἀριθμὸς τις θετικὸς καὶ μεγαλύτερος τῆς μονάδος, ὁ  $\alpha$ · ἔὰν ὑψώσωμεν αὐτὸν κατὰ σειράν εἰς τὰς δυνάμεις

$$\alpha^1 \quad \alpha^{10} \quad \alpha^{100} \quad \alpha^{1000} \quad \alpha^{10000} \quad \dots\dots\dots$$

ἐκάστη ἐκ τούτων εἶναι δεκάτη δύναμις τῆς προηγουμένης αὐτῆ (ἐδ. 71)· ἐπομένως τὸ θέμα ἐκάστης ἐξ αὐτῶν θὰ ἀποτελῆ τὰς δεκάδας εἰς τὸ θέμα τῆς ἐπομένης.

Παραδείγματος χάριν είναι	θέμα τοῦ (11)	= 1
	θέμα τοῦ $11^{10}$	= 10
	θέμα τοῦ $11^{100}$	= 104
	θέμα τοῦ $11^{1000}$	= 1041.

### Ὁρισμὸς τῶν λογαρίθμων.

230. Λογάριθμος ἀριθμοῦ τινος  $\alpha$  λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ὅστις ἔχει ἀκέραιον μὲν μέρος τὸ θέμα τοῦ  $\alpha$ , δέκατα δὲ ἐν συνόλῳ τὸ θέμα τοῦ  $\alpha^{10}$ , ἑκατοστὰ δὲ τὸ θέμα τοῦ  $\alpha^{100}$ , καὶ οὕτω καθεξῆς· τοῦτ' ἔστιν ὁ ἀριθμὸς, ὅστις ἔχει ἐν συνόλῳ τόσας μονάδας ἐκάστης δεκαδικῆς τάξεως, ὅσας ἔχει τὸ θέμα τῆς ὁμωνύμου δυνάμεως τοῦ  $\alpha$ .

Παραδείγματος χάριν ὁ λογαρίθμος τοῦ 11

ἔχει 1	ἀκέραιον, ἢ εἶναι 1, . . .	διότι θέμ. (11)	= 1
ἔχει 10	δέκατα, ἢτοι εἶναι 1,0 . . .	διότι θέμ. ( $11^{10}$ )	= 10
ἔχει 104	ἑκατοστὰ, ἢτοι εἶναι 1,04 . . .	διότι θέμ. ( $11^{100}$ )	= 104
ἔχει 1041	χιλιοστὰ, ἢτοι εἶναι 1,041 . .	διότι θέμ. ( $11^{1000}$ )	= 1041

Ὁ λογαρίθμος τοῦ  $\alpha$  παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου  $\log \alpha$ · εἶναι δὲ ἐντελῶς ὠρισμένος ἀριθμὸς, διότι πάντα τὰ ψηφία αὐτοῦ εἶναι ὠρισμένα.

231. Τῆς μονάδος 1 λογαρίθμος εἶναι τὸ 0, καὶ τοῦ 10 ἡ μονάς.

Ἐπειδὴ πᾶσα δύναμις τοῦ 1 εἶναι πάντοτε 1 καὶ ἔχει διὰ τοῦτο θέμα 0, ἔπεται, ὅτι ὁ λογαρίθμος τοῦ 1 εἶναι 0, ἢτοι  $\log 1 = 0$ .

Ἐπειδὴ δὲ πάλιν εἶναι θέμα τοῦ 10 = 1

$$\text{θέμα τοῦ } 10^{10} = 10$$

$$\text{θέμα τοῦ } 10^{100} = 100$$

ἔπεται  $\log 10 = 1, 000 \dots = 1$ .

### Παραδείγματα

Πρὸς εὔρεσιν τῶν ψηφίων τοῦ λογαρίθμου δοθέντος ἀριθμοῦ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπολογίσωμεν τὰς δυνάμεις τοῦ ἀριθμοῦ, ἀλλὰ μόνον τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων αὐτῶν· τοῦτο δὲ εἶναι ἀπλούστερον, ὡς δεικνύουσι τὰ ἐπόμενα παραδείγματα. (Οἱ ἐν παρενθέσει κλειόμενοι ἀριθμοὶ σημαίνουν πλῆθος μηδενικῶν, ὡς 11(2) σημαίνει 1100, 13(5) σημαίνει 1300000, κτλ.)

Διὰ τὸν ἀριθμὸν 2 παρατηροῦμεν, ὅτι εἶναι  $2^{10} = 1024$ · ὥστε  $2^{10}$  περιέχεται μεταξὺ  $10^3$  καὶ 11(2).

Ἐπομένως	$2^{20} = (2^{10})^2$	περιέχεται	μεταξὺ	$10^6$	καὶ	$13(5)$
	$2^{40} = (2^{20})^2$	»	»	$10^{12}$	»	$17(11)$
	$2^{80} = (2^{40})^2$	»	»	$10^{24}$	»	$29(23)$
	$2^{160} = 2^{80} \cdot 2^{80}$	»	»	$10^{30}$	»	$38(29)$

Ἐξ ὧν βλέπομεν, ὅτι ἡ ἑκατοστὴ δύναμις τοῦ 2 ἔχει 31 ψηφία· ἄρα εἶναι  $\log. 2 = 0,30 \dots$

Διὰ τὸν ἀριθμὸν 3 παρατηροῦμεν ὡσαύτως, ὅτι

$3^{10}$	περιέχεται	μεταξὺ	$59(3)$	καὶ	$6(4)$
$3^{20}$	»	»	$34(8)$	»	$36(8)$
$3^{40}$	»	»	$11(18)$	»	$13(18)$
$3^{80}$	»	»	$12(37)$	»	$17(37)$
$3^{100}$	»	»	$40(46)$	»	$52(46)$

ἦτοι ἡ ἑκατοστὴ δύναμις τοῦ 3 ἔχει 48 ψηφία καὶ ἐπομένως εἶναι  $\log. 3 = 0,47 \dots$

Διὰ τὸν ἀριθμὸν 7 παρατηροῦμεν ὁμοίως, ὅτι

$7^5$	περιέχεται	μεταξὺ	$168(2)$	καὶ	$169(2)$
Ὥστε $7^{10}$	»	»	$28(7)$	»	$29(7)$
$7^{20}$	»	»	$78(15)$	»	$85(15)$
$7^{40}$	»	»	$60(32)$	»	$73(32)$
$7^{80}$	»	»	$36(66)$	»	$54(66)$
$7^{100}$	»	»	$28(83)$	»	$56(83)$

Ὥστε ἡ ἑκατοστὴ δύναμις τοῦ 7 ἔχει 85 ψηφία, καὶ ἐπομένως εἶναι  $\log. 7 = 0,84$ .

Ἐὰν θέλωμεν περισσότερα ψηφία τοῦ λογαρίθμου, ἀνάγκη νὰ διατηρῶμεν ἐν τοῖς πολλαπλασιασμοῖς περισσότερα σημαντικὰ ψηφία.

Ἐὰν π. χ. πρόκειται νὰ εὑρεθῇ ὁ λογάριθμος τοῦ 2 μέχρι τῶν χιλιοστῶν, ὑπολογίζομεν ὡς ἑξῆς  $2^{10} = 1024$

$2^{20}$	περιέχεται	μεταξὺ	$1048(3)$	καὶ	$105(4)$
$2^{40}$	»	»	$1099(9)$	»	$111(10)$
$2^{80}$	»	»	$1207(21)$	»	$124(22)$
$2^{100}$	»	»	$1264(27)$	»	$131(28)$
$2^{200}$	»	»	$1597(57)$	»	$172(58)$
$2^{400}$	»	»	$255(118)$	»	$296(118)$
$2^{800}$	»	»	$65(239)$	»	$88(239)$
$2^{1000}$	»	»	$10(300)$	»	$16(300)$

Ὥστε ἡ χιλιοστὴ δύναμις τοῦ 2 ἔχει 302 ψηφία, καὶ διὰ τοῦτο εἶναι  $\log. 2 = 0,301 \dots$

**Ἰδιότητες τῶν λογαρίθμων.**

232. Οἱ λογάριθμοι ἔχουσι τὴν ἐπομένην ἀρχικὴν ιδιότητα.

Ὁ λογάριθμος τοῦ γινομένου δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται τῷ ἀθροίσματι τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν τούτων.

Τοῦτ' ἔστιν εἶναι  $\log(\alpha\beta) = (\log \alpha) + (\log \beta)$ .

Πρὸς ἀπόδειξιν τούτου ἄς θεωρήσωμεν κατὰ πρῶτον τὰ εἰς τοὺς λογαρίθμους τούτους περιεχόμενα χιλιοστά· κατὰ τὸν ὄρισμὸν ἕκαστος τῶν τριῶν τούτων λογαρίθμων ἔχει τόσα χιλιοστά, ὅσας μονάδας ἔχει τὸ θέμα τῆς χιλιοστῆς δυνάμεως τοῦ ἀριθμοῦ, οὗτινος εἶναι λογάριθμος· ἐπομένως εἶναι (ἐὰν πρὸς συντομίαν τεθῆ  $\tau = 1000$ )

$$\log \alpha = \frac{\text{θεμ.}(\alpha^\tau)}{1000} + \varepsilon$$

$$\log \beta = \frac{\text{θεμ.}(\beta^\tau)}{1000} + \eta$$

$$\log(\alpha\beta) = \frac{\text{θεμ.}(\alpha\beta^\tau)}{1000} + \theta,$$

ἐνθα ἕκαστος τῶν τριῶν ἀριθμῶν  $\varepsilon, \eta, \theta$ , εἶναι μικρότερος ἐνός χιλιοστοῦ.

Ἄλλ' ἐπειδὴ εἶναι  $\text{θεμ.}(\alpha\beta)^\tau = \text{θεμ.}(\alpha^\tau\beta^\tau) = \text{θεμ.}(\alpha^\tau) + \text{θεμ.}(\beta^\tau) + \iota$  (ἐνθα  $\iota = \eta 0, \eta 1$ ), ἡ τελευταία ἰσότης γίνεται

$$\log(\alpha\beta) = \frac{\text{θεμ.}(\alpha^\tau)}{1000} + \frac{\text{θεμ.}(\beta^\tau)}{1000} + \theta + \frac{\iota}{1000},$$

ἀθροίζοντες δὲ τὰς δύο πρώτας ἰσότητες κατὰ μέλη, λαμβάνομεν

$$\log \alpha + \log \beta = \frac{\text{θεμ.}(\alpha^\tau)}{1000} + \frac{\text{θεμ.}(\beta^\tau)}{1000} + \varepsilon + \eta.$$

Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι, ἂν τὸ ἀθροισμα  $\log \alpha + \log \beta$  διαφέρει ἀπὸ τοῦ  $\log(\alpha\beta)$ , ἡ διαφορὰ θὰ εἶναι μικροτέρα τῶν δύο χιλιοστῶν.

Ὅμοίως θεωροῦντες τὰ εἰς τοὺς τρεῖς λογαρίθμους περιεχόμενα ἑκατομμυριοστά, δυνάμεθα ν' ἀποδείξωμεν, ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν εἶναι μικροτέρα τῶν δύο ἑκατομμυριοστῶν.

Ἐπειδὴ δὲ δυνάμεθα ν' ἀποδείξωμεν, ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν παραβαλλομένων ἀριθμῶν εἶναι μικροτέρα δύο μονάδων οἰασδῆποτε δεκαδικῆς τάξεως, συμπεραίνομεν, ὅτι οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι οὐδεμίαν ἔχουσι διαφορὰν, ἥτοι εἶναι ἴσοι.

Ἡ ιδιότης αὕτη ἐκτείνεται ἐπὶ ὅσωνδῆποτε παραγόντων.

Καὶ ὄντως εἶναι  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = (\alpha\beta) \cdot \gamma$ .

ὅθεν  $\log(\alpha\beta\gamma) = \log(\alpha\beta) + \log \gamma = \log \alpha + \log \beta + \log \gamma$ .

Ὁμοίως ἀποδεικνύεται καὶ ἐπὶ περισσοτέρων.

Κατὰ ταῦτα εἶναι

$$\log 100 = \log 10^2 = 2$$

$$\log 1000 = \log 10^3 = 3$$

$$\text{καὶ γενικῶς } \log 10^p = p.$$

233. Ἐκ τῆς ἀρχικῆς ταύτης ιδιότητος τῶν λογαρίθμων ὁρμώμενοι δυνάμεθα νὰ ἐκτείνωμεν τὸν ὄρισμὸν τῶν λογαρίθμων ἐπὶ πάντων τῶν θετικῶν ἀριθμῶν. Ἐὰν τῷ ὄντι θέλωμεν νὰ ἔχωσι πάντες οἱ θετικοὶ ἀριθμοὶ λογάριθμον, νὰ διατηρηῆται δὲ ἡ ἀρχικὴ ιδιότης τῶν λογαρίθμων, ἀνάγκη νὰ ὀρίσωμεν καταλλήλως τοὺς λογαρίθμους τῶν μικροτέρων τῆς μονάδος ἀριθμῶν.

Ἐστω  $\alpha$  θετικὸς ἀριθμὸς καὶ μικρότερος τῆς μονάδος· τότε  $\frac{1}{\alpha}$  εἶναι ἀριθμὸς μεγαλῆτερος τῆς μονάδος· ἔχομεν δὲ κατὰ τὴν παραδεδεγμένην γενικὴν ιδιότητα τῶν λογαρίθμων

$$\log \left( \alpha \cdot \frac{1}{\alpha} \right) = \log \alpha + \log \frac{1}{\alpha} = \log 1 = 0,$$

ἐξ ὧν ἔπεται

$$\log \alpha = -\log \left( \frac{1}{\alpha} \right)$$

τοῦτ' ἔστιν ὁ λογάριθμος παντὸς ἀριθμοῦ  $\alpha$  θετικοῦ καὶ μικροτέρου τῆς μονάδος εἶναι ἀνάγκη νὰ ὀρισθῆ ὡς ἀντίθετος τῷ λογαρίθμῳ τοῦ ἀντιστρόφου ἀριθμοῦ  $\frac{1}{\alpha}$ .

Κατὰ ταῦτα εἶναι

$$\log \frac{1}{10} = -\log 10 = -1$$

$$\log \frac{1}{100} = -\log 100 = -2$$

$$\log \frac{1}{10^p} = -\log (10^p) = -p.$$

234. Ἐκ τῆς ἀρχικῆς ιδιότητος ἔπονται νῦν αἱ ἐξῆς.

Ὁ λογάριθμος τοῦ πηλίκου δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται τῇ διαφορᾷ τῶν λογαρίθμων αὐτῶν.

Ἐστῶσαν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  δύο ἀριθμοὶ (θετικοί) καὶ  $\frac{\alpha}{\beta}$  τὸ πηλίκον αὐτῶν·

Τότε εἶναι

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta = \alpha,$$

ὅθεν  $\log \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) + \log \beta = \log \alpha$

καὶ  $\log \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) = \log \alpha - \log \beta.$

Ὁ λογάριθμος πάσης δυνάμεως (σύμμετρον ἐχούσης ἐκθέτην) ἰσοῦται τῷ λογαρίθμῳ τῆς βάσεως πολλαπλασιασθέντι ἐπὶ τὸν ἐκθέτην.

Ἡ βᾶσις ὑποτίθεται θετικὸς ἀριθμὸς καὶ ἡ δύναμις ἐπίσης.

Ἐστω πρότερον ὁ ἐκθέτης  $\mu$  ἀκέραιος καὶ θετικὸς· τότε εἶναι

$$\alpha^\mu = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha, \quad \text{ὅθεν καὶ}$$

$$\log (\alpha^\mu) = (\log \alpha) + (\log \alpha) + (\log \alpha) + \dots + (\log \alpha) = \mu \cdot (\log \alpha).$$

Ἐστω δεύτερον ὁ ἐκθέτης  $\frac{\mu}{\nu}$  κλασματικὸς καὶ θετικὸς.

Ἡ δύναμις  $\alpha^{\frac{\mu}{\nu}}$  πολλαπλασιασθεῖσα  $\nu$  φορὰς ἐφ' ἑαυτὴν γίνεται  $\alpha^\mu$ , ὡς ἐξῆς φαίνεται

$$\alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \dots \alpha^{\frac{\mu}{\nu}} = \alpha^{\nu \cdot \frac{\mu}{\nu}} = \alpha^\mu.$$

ἀρα εἶναι  $\log \alpha^{\frac{\mu}{\nu}} + \log \alpha^{\frac{\mu}{\nu}} + \dots + \log \alpha^{\frac{\mu}{\nu}} = \mu \cdot \log \alpha$

$$\text{ἢ } \nu \log \left( \alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \right) = \mu \log \alpha$$

$$\text{καὶ } \log \left( \alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \right) = \frac{\mu}{\nu} \cdot (\log \alpha).$$

Ἐστω τέλος ὁ ἐκθέτης ἀρνητικὸς  $-\varphi$ .

Ἡ δύναμις  $\alpha^{-\varphi}$  πολλαπλασιασθεῖσα ἐπὶ τὴν  $\alpha^\varphi$  γίνεται 1

ἦτοι  $\alpha^{-\varphi} \cdot \alpha^\varphi = 1.$

Ἐκ τούτου ἔπεται  $\log \left( \alpha^{-\varphi} \right) + \log \left( \alpha^\varphi \right) = 0,$

ὅθεν  $\log \left( \alpha^{-\varphi} \right) = -\log \left( \alpha^\varphi \right) = -\varphi (\log \alpha).$

Ἐκ τούτων συνάγεται, ὅτι ἔχομεν γενικῶς

$$\log (x^x) = x \cdot \log \alpha,$$

οἰοῦδήποτε ὄντος τοῦ συμμέτρου ἀριθμοῦ  $x$ .

**ΠΟΡΙΣΜΑ Α'.** Ὁ λογάριθμος πάσης δυνάμεως τοῦ 10 ἰσοῦται τῷ ἐκθέτῃ αὐτῆς.

Καὶ ὄντως εἶναι  $\log (10^x) = x \cdot \log 10 = x.$

**ΠΟΡΙΣΜΑ Β'.** Ὁ λογάριθμος τῆς τετραγωνικῆς ῥίζης ἀριθμοῦ ἰσοῦ-

ται πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ λογαριθμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ· καὶ γενικῶς ὁ λογάριθμος πάσης ῥίζης εἶναι ἴσος πρὸς τὸν λογάριθμον τοῦ ὑπορρίζου διαιρεθέντα διὰ τοῦ δείκτου τῆς ῥίζης.

$$\text{Καὶ ὕντως εἶναι } \log \sqrt{\alpha} = \log \left( \alpha^{\frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{2} \cdot \log \alpha$$

$$\text{καὶ } \log \sqrt[\nu]{\alpha} = \log \left( \alpha^{\frac{1}{\nu}} \right) = \frac{1}{\nu} \cdot \log \alpha.$$

235. Πλὴν τῆς μονάδος 1 οὐδεὶς ἄλλος ἀριθμὸς ἔχει λογάριθμον ἴσον τῷ 0.

\* Ἄς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀριθμοῦ τινος μεγαλύτερου τῆς μονάδος ὁ λογάριθμος εἶναι 0, ἔστω δὲ ὁ ἀριθμὸς οὗτος ὁ  $1 + \epsilon$ . τότε θὰ ἦτο  
 $\log (1 + \epsilon) = 0$ ,  $\log (1 + \epsilon)^2 = 2 \log (1 + \epsilon) = 0$ , καὶ γενικῶς  
 $\log (1 + \epsilon)^\nu = 0$ .

\* Ἀλλὰ δύνανται νὰ εὑρεθῇ δυνάμεις τοῦ  $1 + \epsilon$  ὑπερβαίνουσα τὸν 10· διότι εἶναι  $(1 + \epsilon)^2 > 1 + 2\epsilon$ ,

$$\text{ἄρα } (1 + \epsilon)^3 > (1 + 2\epsilon)(1 + \epsilon) > 1 + 3\epsilon$$

$$\text{καὶ γενικῶς } (1 + \epsilon)^\rho > 1 + \rho\epsilon.$$

ἐπομένως ἡ δυνάμεις  $(1 + \epsilon)^\rho$  θὰ ὑπερβαίῃ τὸν 10, ἂν εἶναι

$$1 + \rho\epsilon > 10, \text{ ἤτοι } \rho > \frac{9}{\epsilon}.$$

\* Ἐπειδὴ δὲ ἡ δυνάμεις  $(1 + \epsilon)^\rho$  ὑπερβαίνει τὸν 10, ὁ λογάριθμος αὐτῆς ἔχει ἀκέραιον μέρος, καὶ διὰ τοῦτο διαφέρει τοῦ 0· ἄρα καὶ ὁ λογάριθμος τοῦ  $(1 + \epsilon)$  διαφέρει τοῦ 0.

Οὐδὲ μικροτέρου τῆς μονάδος ἀριθμοῦ δύναται νὰ εἶναι ὁ λογάριθμος 0· διότι ἂν ἦτο

$$\rho < 1 \text{ καὶ } \log \rho = 0, \text{ θὰ ἦτο καὶ } \log \frac{1}{\rho} = 0$$

καὶ ὁ  $\frac{1}{\rho}$  εἶναι μεγαλύτερος τῆς μονάδος· ὅπερ ἀδύνατον.

236. Αὐξανόμενον τοῦ ἀριθμοῦ αὐξάνεται καὶ ὁ λογάριθμος αὐτοῦ καὶ ἐλαττουμένου ἐλαττοῦται.

$$\text{* Ἐστω } \alpha > \beta, \text{ ἢ } \frac{\alpha}{\beta} > 1.$$

ἐπειδὴ ὁ ἀριθμὸς  $\frac{\alpha}{\beta}$  ὑπερβαίνει τὴν μονάδα, ὁ λογάριθμος αὐτοῦ εἶναι

διάφορος τοῦ 0 καὶ θετικός, ἦτοι  $\log \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) > 0$

ἢ  $\log \alpha - \log \beta > 0$ , ὅθεν καὶ  $\log \alpha > \log \beta$ .

Ἐκ τούτων ἐπεταί, ὅτι, ἂν οἱ λογάριθμοὶ δύο ἀριθμῶν εἶναι ἴσοι, καὶ οἱ ἀριθμοὶ θὰ εἶναι ἴσοι.

### Παρατηρήσεις περὶ τῶν λογαρίθμων.

237. Οἱ λογάριθμοὶ τῶν μικροτέρων τῆς μονάδος ἀριθμῶν εἶναι ἀρνητικοί. Ἄλλὰ τοὺς ὅλως ἀρνητικούς λογαρίθμους τρέπομεν συνήθως εἰς ἄλλους, ὧν μόνον τὸ ἀκέραιον μέρος εἶναι ἀρνητικόν, τὸ δὲ δεκαδικὸν μέρος θετικόν.

Ἐστω ὡς παράδειγμα ὁ ὅλως ἀρνητικὸς λογάριθμος

$$-2,54327 \quad \text{ἦτοι} \quad = -2 - 0,54327.$$

ἐὰν προσθέσωμεν εἰς αὐτὸν +1 καὶ -1, ὅπερ δὲν μεταβάλλει αὐτόν, λαμβάνομεν

$$-3 + 1 - 0,54327$$

καὶ ἀφαιροῦντες τὸ δεκαδικὸν μέρος ἀπὸ τῆς θετικῆς μονάδος, εὐρίσκομεν

$$-3 + 0,45673,$$

ὅπερ γράφεται ὡς ἐξῆς  $\bar{3},45673$ ,

γράφομεν δηλαδὴ τὸ ἀρνητικὸν σημεῖον ὑπεράνω τοῦ ἀκεραίου μέρους, ἵνα δείξωμεν, ὅτι μόνον αὐτὸ εἶναι ἀρνητικόν.

Ἐκ τούτων συναγεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

Ἴνα τρέψωμεν λογάριθμον ὅλως ἀρνητικὸν εἰς ἄλλον, ὅστινος μόνον τὸ ἀκέραιον μέρος νὰ εἶναι ἀρνητικόν, ἀξάνομεν τὸ ἀκέραιον μέρος αὐτοῦ κατὰ μονάδα καὶ γράφομεν τὸ σημεῖον — ὑπεράνω αὐτοῦ, μετὰ δὲ ταῦτα ἀφαιροῦμεν τὸ δεκαδικὸν μέρος ἀπὸ τῆς μονάδος.

Ἡ δὲ ἀφίρσις τοῦ δεκαδικοῦ μέρους ἀπὸ τῆς μονάδος γίνεται εὐκολώτατα, ἐὰν τὸ τελευταῖον σημαντικὸν ψηφίον αὐτοῦ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τοῦ 10, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα ἀπὸ τοῦ 9.

Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον οἱ ἀρνητικοὶ λογάριθμοι

$$-4,5489087, \quad -1,5009849, \quad -0,8895070$$

τρέπονται εἰς τοὺς ἐξῆς

$$\bar{5},4510913, \quad \bar{2},4990151, \quad \bar{1},1104930.$$

Ἐν τοῖς ἐπομένοις ὑποθέτομεν τὸ δεκαδικὸν μέρος τῶν λογαρίθμων πάντοτε θετικόν.

Τὸ ἀκέραιον μέρος ἐκάστου λογαρίθμου καλεῖται *χαρακτηριστικὸν* αὐτοῦ



238. Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου παντὸς δεκαδικοῦ κλάσματος ἔχει τόσας ἀρνητικὰς μονάδας, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ ἀριθμὸς ὁ ἐκφράζων τὴν τάξιν τοῦ πρώτου σημαντικοῦ ψηφίου μετὰ τὴν ὑποδιαστολήν.

Ἐστω ὡς παράδειγμα τὸ δεκαδικὸν κλάσμα

$$0,005498.$$

ἐὰν πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ 1000 καὶ διαιρεθῇ διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, δὲν μεταβάλλεται ὥστε γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς

$$\frac{5,498}{1000}$$

καὶ διὰ τοῦτο ὁ λογάριθμος αὐτοῦ εἶναι ἴσος τῷ

$$\log (5,498) - 3.$$

καὶ ἐπειδὴ ὁ λογάριθμος τοῦ ἀριθμητοῦ ἔχει ἀκέραιον μέρος 0, ἔπεται, ὅτι τοῦ δοθέντος κλάσματος ὁ λογάριθμος θὰ ἔχῃ χαρακτηριστικὸν 3̄.

239. Ἐὰν ἀριθμὸς πολλαπλασιασθῇ ἢ διαιρεθῇ διὰ 10, τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου δὲν ἀλλάσσει.

Καὶ ὄντως, ἂν εἶναι

$$\log \alpha = \beta.$$

θὰ εἶναι καὶ  $\log (10\alpha) = \log 10 + \log \alpha = \beta + 1$

καὶ  $\log \left( \frac{\alpha}{10} \right) = \log \alpha - \log 10 = \beta - 1,$

ἤτοι μόνον τὸ ἀκέραιον μέρος μεταβάλλεται, οὐχὶ δὲ καὶ τὸ δεκαδικόν.

Κατὰ ταῦτα, τοῦ λογαρίθμου τοῦ 2 ὄντος 0,30103...

ὁ λογάριθμος τοῦ 20 θὰ εἶναι 1,30103...

ὁ τοῦ 200 2,30103...

ὁ τοῦ 2000 3,30103...

ὁ τοῦ 20000 4,30103...

καὶ οὕτω καθεξῆς.

καὶ ὁ λογάριθμος τοῦ 0,2 θὰ εἶναι  $\overline{1}$  30103...

ὁ τοῦ 0,02  $\overline{2}$  30103...

ὁ τοῦ 0,002  $\overline{3}$  30103...

ὁ τοῦ 0,0002  $\overline{4}$  30103...

ὁ τοῦ 0,00002  $\overline{5}$  30103...

καὶ οὕτω καθεξῆς.

Ἐκ τοῦ παραδείγματος τούτου βλέπομεν, ὅτι τὸ μὲν δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου ὁρίζει μόνον τὴν σειρὰν τῶν σημαντικῶν ψηφίων,

δι' ὧν γράφεται ὁ ἀριθμὸς, τὴν δὲ ἀξίαν ἐκάστου ὀρίζει τὸ χαρακτη-  
ριστικόν.

240. Διὰ τῶν ἰδιοτήτων τῶν λογαρίθμων δυνάμεθα νὰ ἀναγάγωμεν  
τὸν πολλαπλασιασμὸν εἰς τὴν πρόσθεσιν, τὴν διαίρεσιν εἰς τὴν ἀφαίρε-  
σιν, τὴν ὑψωσιν εἰς δυνάμεις εἰς πολλαπλασιασμὸν, καὶ τὴν ἐξαγωγήν  
τῶν ριζῶν εἰς διαίρεσιν· ἀρκεῖ νὰ ἔχωμεν πίνακα περιέχοντα τοὺς λο-  
γαρίθμους τῶν ἀριθμῶν.

Καὶ ὄντως πρὸς εὗρεσιν τοῦ γινομένου δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν  
ζητοῦμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν παραγόντων ἐν τῷ πίνακι καὶ ἀθροίζο-  
μεν αὐτούς· τὸ ἄθροισμα θὰ εἶναι ὁ λογαριθμὸς τοῦ γινομένου· ζητοῦμεν  
τὸν νέον τοῦτον λογαριθμὸν ἐν τῇ στήλῃ τῶν λογαρίθμων καὶ λαμβάνομεν  
τὸν πρὸς αὐτὸν ἀντιστοιχοῦντα ἀριθμὸν, ὅστις εἶναι τὸ ζητούμενον γινόμενον.

Πρὸς εὗρεσιν τοῦ πηλίκου δύο ἀριθμῶν ζητοῦμεν ἐν τῷ πίνακι τοὺς λο-  
γαρίθμους αὐτῶν καὶ ἀφαιροῦμεν τὸν λογαριθμὸν τοῦ διαιρέτου ἀπὸ τοῦ  
λογαρίθμου τοῦ διαιρετέου· ἡ διαφορὰ θὰ εἶναι ὁ λογαριθμὸς τοῦ πηλίκου·  
ζητοῦμεν τὸν νέον τοῦτον λογαριθμὸν ἐν τῇ στήλῃ τῶν λογαρίθμων καὶ  
ὁ πρὸς αὐτὸν ἀντιστοιχῶν ἀριθμὸς θὰ εἶναι τὸ ζητούμενον πηλίκον.

Ἴνα εὗρωμεν οἰανδήποτε δύναμιν δοθέντος ἀριθμοῦ, εὐρίσκομεν τὸν  
λογαριθμὸν αὐτοῦ ἐκ τοῦ πίνακος καὶ πολλαπλασιάζομεν τοῦτον ἐπὶ  
τὸν ἐκθέτην τῆς δυνάμεως· τὸ γινόμενον θὰ εἶναι ὁ λογαριθμὸς τῆς δυ-  
νάμεως· ζητοῦμεν τὸ γινόμενον τοῦτο ἐν τοῖς λογαρίθμοις καὶ ὁ πρὸς  
αὐτὸ ἀντιστοιχῶν ἀριθμὸς εἶναι ἡ ζητούμενη δύναμις.

Τὸ αὐτὸ δὲ προφανῶς ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ τῶν ριζῶν· διότι αἱ ρίζαι  
εἶναι δυνάμεις ἔχουσαι κλασματικούς ἐκθέτας.

### Περὶ τῶν λογαριθμικῶν πινάκων.

Ἴνα διὰ τῶν λογαρίθμων καταστήσωμεν ἀπλουστέρας τὰς πράξεις,  
ὡς ἐρρήθη, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχωμεν πίνακα περιέχοντα τοὺς λογαρίθμους  
τῶν ἀριθμῶν. Οἱ τοιοῦτοι πίνακες περιέχουσι τοὺς λογαρίθμους ἀκεραίων  
μόνον ἀριθμῶν ἀπὸ τῆς μονάδος καὶ ἐξῆς μέχρι τινός. Ἐπειδὴ δὲ μόνον  
τῶν συμμετρους ἐκθέτας ἔχουσῶν δυνάμεων τοῦ 10 οἱ λογαρίθμοι εἶναι σύμ-  
μετροι ἀριθμοὶ (ἐδ. 234, πρὸς Α'), αὐταὶ δὲ πλὴν τῶν ἔχουσῶν ἀκέραιον  
ἐκθέτην εἶναι πᾶσαι ἀσύμμετροι ἀριθμοὶ (ἐδ. (188), ἔπεται, ὅτι πλὴν  
τῶν ἀριθμῶν 1, 10, 100, 1000, κλπ., πάντων τῶν ἄλλων ἀκεραίων οἱ  
λογαρίθμοι εἶναι ἀσύμμετροι ἀριθμοὶ καὶ ἔχουσι διὰ τοῦτο ἀπειρὰ δεκαδικὰ  
ψηφία μὴ περιοδικὰ. Οἱ λογαριθμικοὶ πίνακες περιέχουσι κατ' ἀνάγκην ἐκά-

στου λογαρίθμου τὰ δεκαδικὰ ψηφία μέχρι τινός (μέχρι τῶν ἑκατοντάκις χιλιοστῶν οἱ τοῦ Λαλάνδου καὶ μέχρι τῶν δεκάκις ἑκατομμυριοστῶν οἱ τοῦ Καλλέτου). Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι οἱ λογαρίθμοι μόνον κατὰ προσέγγισιν εὐρέθησαν καὶ ἐγράφησαν εἰς τοὺς πίνακας, ἀρκεῖ δὲ ὅμως ἡ προσέγγισις αὕτη εἰς τὰς συνήθεις ἐφαρμογὰς τῶν λογαρίθμων.

Τὰ ἀκέραια μέρη τῶν λογαρίθμων δὲν ἐγράφησαν εἰς τοὺς πίνακας ὡς εὐκολώτατα εὐρισκόμενα.

Ἡ δὲ εὐρεσις τῶν λογαρίθμων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν δύναται μὲν νὰ γίνη καὶ μόνον διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ὡς ὁ ὀρισμὸς αὐτῶν ὑποδεικνύει, ἀλλ' αἱ ιδιότητες τῶν λογαρίθμων καὶ μάλιστα αἱ ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ μαθηματικῇ θεωρούμεναι παρέχουσι ἄλλους εὐκολωτέρους τρόπους εὐρέσεως. Ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ ἔργον τοῦτο ἐγένετο ἤδη, ὀλίγον ἐνδιαφέρει ἡμᾶς ὁ τρόπος, καθ' ὃν ἐγένετο· παρατηροῦμεν μόνον, ὅτι ἕνεκα τῆς θεμελιώδους ιδιότητος τῶν λογαρίθμων οἱ λογαρίθμοι τῶν μὴ πρώτων ἀριθμῶν ἀποτελοῦνται ἐκ τῶν λογαρίθμων τῶν πρώτων παραγόντων αὐτῶν· ὥστε ἀρκεῖ νὰ ὑπολογισθῶσιν οἱ λογαρίθμοι μόνον τῶν πρώτων ἀριθμῶν

### Διάταξις τῶν πινάκων.

Αὕτη φαίνεται ἐκ τοῦ ἐπομένου πίνακος.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
430	63347	357	367	377	387	397	407	417	428	438
1	448	458	468	478	488	498	508	518	528	538
2	548	558	568	579	589	599	609	619	629	639
3	649	659	669	679	689	699	709	719	729	739
4	749	759	769	779	789	799	809	819	829	839
5	849	859	869	879	889	899	909	919	929	939
6	949	959	969	979	988	998	*008	*018	*028	*038
7	64048	058	068	078	088	098	108	118	128	137
8	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237
9	246	256	266	276	286	296	306	316	326	335
440	345	355	365	375	385	395	404	414	424	434

Αἱ δεκάδες τῶν ἀριθμῶν εἶναι γεγραμμέναι ἐν τῇ πρώτῃ στήλῃ, εἰς τὴν κορυφὴν τῆς ὁποίας ὑπάρχει τὸ γράμμα N (Nombres), αἱ δὲ μονάδες αὐτῶν εἶναι εἰς τὴν αὐτὴν ὀριζοντίαν σειρὰν μετὰ τοῦ N. Ὁ δὲ λογαρίθμος ἐκάστου ἀριθμοῦ εὐρίσκεται ἐν τῷ τόπῳ, ἔνθα διασταυροῦνται αἱ δύο σειραί, αἱ τὰς μονάδας καὶ τὰς δεκάδας αὐτοῦ ἔχουσαι

Ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ ἐφεξῆς λογάριθμοι ἔχουσι κοινὰ τὰ πρῶτα ψηφία, γράφονται ταῦτα ἀπαξ (ἐπὶ τῶν πενταψηφίων λογαρίθμων τὰ δύο πρῶτα, ἐπὶ δὲ τῶν ἑπταψηφίων τὰ τρία πρῶτα) καὶ νοοῦνται ἐπαναλαμβανόμενα τὰ αὐτά, μέχρις οὗ ἀλλάχθῶσι.

Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον βλέπομεν, ὅτι εἶναι

$$\log 4306 = 3,63407$$

$$\log 4308 = 3,63428$$

$$\log 4320 = 3,63548$$

$$\log 4325 = 3,63599$$

$$\log 4368 = 3,64028$$

$$\log 4370 = 3,64048.$$

ΣΗΜ. Ὁ ἀστερίσκος, ὅστις ἐν τοῖς πενταψηφίοις πίναξιν ἐνιαχοῦ ἀπαντᾷ, σημαίνει, ὅτι τὰ παραλειπόμενα πρῶτα ψηφία ἤλλαξαν καὶ πρέπει νὰ λαμβάνωμεν τὰ ἀμέσως ἐπόμενα τοῦτο ἐγένετο εἰς τὸν λογάριθμον τοῦ 4366.

Παρατηρητέον πρὸς τούτοις, ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ σελίδι περιέχουσιν οἱ πίνακες τοὺς λογαρίθμους τῶν μικρῶν ἀριθμῶν κατὰ σειρὰν τεταγμένους, οἱ μὲν πενταψήφιοι πίνακες ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ 100, οἱ δὲ ἑπταψήφιοι ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ 1200· καὶ τοῦτο, ἵνα ταχύτερον εὐρίσκωνται οἱ λογάριθμοι αὐτῶν.

### Χρῆσις τῶν λογαριθμικῶν πινάκων.

Ἡ χρῆσις τῶν λογαριθμικῶν πινάκων ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν ἐπομένων δύο προβλημάτων.

- 1) Δοθέντος ἀριθμοῦ εὐρεῖν τὸν λογάριθμον αὐτοῦ.
- καὶ 2) Δοθέντος λογαρίθμου εὐρεῖν τὸν ἀντιστοιχοῦντα ἀριθμόν.

Τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων τούτων θὰ πραγματευθῶμεν νῦν, ὑποθέτοντες, ὅτι ἔχομεν ὑπ' ὄψει πενταψηφίους πίνακας.

#### Πρόβλημα 1<sup>ον</sup>.

Δοθέντος ἀριθμοῦ εὐρεῖν τὸν λογάριθμον αὐτοῦ.

Ἡ λύσις τοῦ προβλήματος τούτου περιλαμβάνει δύο μέρη.

α). Εὐρεῖν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ζητουμένου λογαρίθμου.

β). Εὐρεῖν τὸ δεκαδικὸν μέρος αὐτοῦ.

Καὶ τὸ μὲν χαρακτηριστικὸν εὐρίσκεται εὐκολώτατα· διότι ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς ὑποτίθεται γεγραμμένος ὑπὸ τὴν δεκαδικὴν πάντοτε μορφήν. Καὶ ἂν μὲν ὁ ἀριθμὸς ὑπερβαίνει τὴν μονάδα, τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ

λογαρίθμου του είναι τὸ θέμα τοῦ ἀριθμοῦ (ἐδ. 230). ἂν δὲ εἶναι μικρότερος τῆς μονάδος, τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου του εἶναι ἀρνητικὸν καὶ ἔχει τόσας μονάδας, ὅσας ἔχει ὁ ἀριθμὸς, ὅστις ἐκφράζει τὴν τάξιν τοῦ πρώτου σημαντικοῦ ψηφίου μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν (238).

Παραδείγματα χάριν, ἂν ὁ ἀριθμὸς εἶναι

58759,	ὁ λογαρίθμος του	θα ἔχη	χαρακτηριστικὸν	4
ἂν εἶναι 587,59,	»	»	»	2
ἂν εἶναι 5,8759,	»	»	»	0
ἂν 0,058,	»	»	»	<u>2</u>
ἂν δὲ 0,0008	»	»	»	<u>4</u>

Εἰς δὲ τὴν εὑρεσιν τοῦ δεκαδικοῦ μέρους τοῦ λογαρίθμου πρώτον παραλείπομεν τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ ἀριθμοῦ (ἐὰν ἔχη), ὥστε καθιστῶμεν αὐτὸν ἀκέραιον· (τοῦτο δὲ δὲν βλάπτει τὸ ζητούμενον δεκαδικὸν μέρος, διότι πολλαπλασιάζει τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10 ἢ 100 ἢ 1000 κτλ.) ἔπειτα διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

1η) Ἄν ὁ ἀριθμὸς δὲν ἔχη περισσότερα τῶν τεσσάρων ψηφίων, ὑπάρχει εἰς τοὺς πίνακας καὶ εὐρίσκοντες αὐτὸν εὐρίσκομεν ἀμέσως καὶ τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου του.

### Παραδείγματα.

Ὁ λογαρίθμος τοῦ 352 ἔχει χαρακτηριστικὸν μὲν 2, δεκαδικὸν δὲ μέρος, εὐρισκόμενον ἐκ τῶν πινάκων, ἔχει 54654 (τὸ αὐτό, ὅπερ καὶ ὁ ἀριθμὸς 3520).

ὅθεν εἶναι  $\log. 352 = 2,54654$

Ὁ λογαρίθμος τοῦ 58 ἔχει ἀκέραιον μὲν μέρος 1, δεκαδικὸν δὲ (ἐκ τῆς πρώτης σελίδος ἀμέσως εὐρισκόμενον ἢ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ 5800) ἔχει 76343,

ὅθεν εἶναι  $\log. 58 = 1,76343$ .

Ὁ λογαρίθμος τοῦ 5,401 ἔχει χαρακτηριστικὸν μὲν 0, δεκαδικὸν δὲ μέρος τὸ αὐτὸ μὲ τὸν ἀριθμὸν 5401, ἦτοι, ὡς ἐκ τῶν πινάκων εὐρίσκομεν, τὸ 73247,

ὅθεν εἶναι  $\log. 5,401 = 0,73247$ .

Ὁ λογαρίθμος τοῦ 0,8035 ἔχει χαρακτηριστικὸν 1 καὶ δεκαδικὸν μέρος, ὅσον καὶ ὁ τοῦ ἀριθμοῦ 8035, ἦτοι τὸ 90499.

ὅθεν  $\log. 0,8035 = \overline{1},90499$

ὁμοίως εἶναι  $\log. 0,08035 = \overline{2},90499$ .

2<sup>α</sup>) Ἄν ὁ ἀριθμὸς ἔχη ψηφία περισσότερα τῶν τεσσάρων, χωρίζομεν τὰ τέσσαρα πρῶτα δι' ὑποδιαστολῆς.

Ἐὰν παραδείγματος χάριν πρόκειται περὶ τοῦ ἀριθμοῦ 85946, γράφομεν 8594,6, ὅπερ οὐδὲλως μεταβάλλει τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀριθμὸς 8594,6 περιλαμβάνεται μεταξύ τῶν ἀκεραίων 8594 καὶ 8595, ἔπεται, ὅτι καὶ ὁ λογάριθμος αὐτοῦ περιλαμβάνεται μεταξύ τῶν λογαρίθμων τῶν ἀκεραίων τούτων·

εἶναι δὲ  $\log. 8594 = 3,93420$

$\log. 8595 = 3,93425$

ἡ διαφορὰ τῶν λογαρίθμων τούτων εἶναι 5 (μονάδες τῆς τελευταίας τάξεως), ἀλλὰ καὶ ἡ διαφορὰ τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν 8595 καὶ 8596 εἶναι πάλιν 5 (καὶ ἡ αὐτὴ διαφορὰ ἐπὶ πολὺ διατηρεῖται), ὥστε δυνάμεθα νὰ παραδεχθῶμεν, ὅτι ἡ αὔξησις τῶν λογαρίθμων εἶναι ἀνάλογος τῆς αὔξήσεως τῶν ἀριθμῶν, ὅτε σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς.

Δι' αὔξησιν μιᾶς μονάδος ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 8594 εἰς τὸν 8595 ἠύξηθη ὁ λογάριθμος κατὰ 5 (ἑκατοντάκις χιλιοστὰ) δι' αὔξησιν 0,6 ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 8594 εἰς τὸν 8594,6 θέλει αὔξηθῆ κατὰ  $5 \times 0,6$  ἦτοι 3. Ὡστε πρέπει νὰ προσθέσωμεν 3 μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως εἰς τὸν λογάριθμον τοῦ 8594, ἵνα λάβωμεν τὸν λογάριθμον τοῦ 8594,6, ὅστις ἐπομένως εἶναι 3,93423· ὁ δὲ λογάριθμος τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ 85946 εἶναι διὰ τοῦτο 4,93423.

Ἐὰν ὁ δοθείς ἀριθμὸς ἦτο 85,946, ὁ λογάριθμος θὰ ἦτο 1,93423· ἂν ὁ ἀριθμὸς ἦτο 0,85946, ὁ λογάριθμος θὰ ἦτο 1,93423.

Ἐστω προσέτι ὁ ἀριθμὸς 5,87984· ὁ λογάριθμος αὐτοῦ ἔχει χαρακτηριστικὸν 0. Πρὸς εὑρεσιν τοῦ δεκαδικοῦ μέρους τοῦ λογαρίθμου γράφομεν 5879,84· ἔχομεν δὲ

$\log 5879 = 3,76930$

καὶ διαφορὰν τῶν λογαρίθμων δύο ἐφεξῆς ἀκεραίων 8· ὥστε ἀνάγκη νὰ προσθέσωμεν  $8 \times 0,84$ , ἦτοι 7 δεκαδικὰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως· ὅθεν

$\log. 5879,84 = 3,76937$

καὶ  $\log. 5,87984 = 0,76937$ .

ΣΗΜ. Ἡ διαφορὰ τῶν λογαρίθμων δύο ἐφεξῆς ἀκεραίων ἀριθμῶν δὲν μένει πάντοτε ἡ αὐτὴ, ἀλλ' ἐλαττοῦται, καθ' ὅσον αὐξάνουσιν οἱ ἀριθμοί· ὥστε δὲν ἀληθεύει ὅτι ἡ αὔξησις τῶν λογαρίθμων εἶναι ἀνάλογος τῆς αὔξήσεως τῶν ἀριθμῶν.

Ἐπειδὴ ὅμως ἐκάστη διαφορὰ μένει συνήθως ἀμετάβλητος ἐπὶ πολλοὺς ἀριθμούς, δυνάμεθα νὰ συστήνωμεν κατὰ προσέγγισιν τὴν ἀναλογίαν, ἐφ' ἧς στηρίζεται ἡ προηγουμένη μέθοδος.

### Πρόβλημα 2<sup>ον</sup>.

Δοθέντος λογαρίθμου, εὑρεῖν τὸν ἀντιστοιχοῦντα ἀριθμόν.

Τὸ πρόβλημα τοῦτο ὑποδιαιρεῖται εἰς τὰ ἐξῆς δύο.

α'). *Εὑρεῖν τὰ ψηφία, δι' ὧν κατὰ σειρὰν γράφεται ὁ ἀριθμὸς.*

β'). *Προσδιορίσαι τὴν ἀξίαν ἐκάστου ψηφίου.*

Εἰς τὴν εὑρεσιν τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

1 η) Ἄν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ δοθέντος λογαρίθμου εὑρίσκηται ἐν τῷ πίνακι, θὰ εὑρωμεν ἀπέναντι τὰ τέσσαρα ψηφία τοῦ ζητουμένου ἀριθμοῦ (ζητοῦμεν δ' αὐτὸ πάντοτε μεταξὺ τῶν λογαρίθμων τῶν τετραψηφίων ἀριθμῶν), τὴν δὲ ἀξίαν ἐκάστου προσδιορίζει τὸ χαρακτηριστικόν.

Ἐστω π. χ. ὁ λογαρίθμος 3,59095.

Τὸ δεκαδικὸν μέρος εὑρίσκεται ἐν τῷ πίνακι καὶ εἶναι τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ 3899· ἐπειδὴ δὲ χαρακτηριστικόν ὁ δοθεὶς λογαρίθμος ἔχει 3, ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς πρέπει νὰ ἔχη τέσσαρα ἀκέραια ψηφία, ὥστε εἶναι ἀκριβῶς ὁ 3899· ὁμοίως εὑρίσκεται, ὅτι·

Εἰς τὸν λογαρίθμον	2,59095	ἀντιστοιγεῖ ὁ ἀριθμὸς	0,03899
εἰς τὸν λογαρίθμον	1,59095	» ὁ »	0,3899
εἰς τὸν »	0,59095	» ὁ »	3,899
εἰς τὸν »	1,59095	» ὁ »	38,99
εἰς τὸν »	2,59095	» ὁ »	389,9
εἰς τὸν »	3,59095	» ὁ »	3899
εἰς τὸν »	4,59095	» ὁ »	38990

καὶ οὕτω καθεξῆς.

2 α) Ἄν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ δοθέντος λογαρίθμου δὲν ὑπάρχη ἐν τῷ πίνακι, θὰ περιλαμβάνηται μεταξὺ τῶν δεκαδικῶν μερῶν τῶν λογαρίθμων δύο ἐφεξῆς ἀριθμῶν.

Ἐστω παραδείγματος χάριν ὁ λογαρίθμος 1,95094· τὸ δεκαδικὸν μέρος 95094 εὑρίσκεται μεταξὺ τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν 8931 καὶ 8932· διαφέρουσι δὲ οἱ λογαρίθμοι τῶν ἀριθμῶν τούτων κατὰ 5 (μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως)· ὥστε παραδεχόμενοι, ὡς καὶ πρὶν, ὅτι ἡ αὔξησις τῶν λογαρίθμων εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν αὔξησιν τῶν ἀριθμῶν, θὰ σκεφθῶμεν ὡς ἐξῆς.

Ἄν ὁ λογάριθμος τοῦ 8931, ὅστις εἶναι 3,95090, αὐξήθῃ κατὰ 5 μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως, ὁ ἀριθμὸς αὐξάνεται κατὰ μίαν μονάδα, ἂν δὲ αὐξήθῃ ὁ λογάριθμος μόνον κατὰ 4 μονάδας τῆς κατωτάτης τάξεως, ὁ ἀριθμὸς θὰ αὐξήθῃ κατὰ  $\frac{4}{5}$  μιᾶς μονάδος· ὥστε ὁ ἀριθμὸς, τοῦ ὁποίου ὁ λογάριθμος ἔχει δεκαδικὸν μέρος τὸ 95094, θὰ εἶναι 8931,8, ἢ μάλλον 89318, διότι μόνον περὶ τῆς διαδοχῆς τῶν ψηφίων φροντίζομεν, ἢ δὲ ἀξία αὐτῶν θὰ ὀρίσθῃ ἐκ τοῦ χαρακτηριστικοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ χαρακτηριστικὸν τοῦ δοθέντος λογαρίθμου εἶναι τὸ 1 ὁ ἀντιστοιχῶν ἀριθμὸς εἶναι 89,318.

Παρατηρητέον δέ, ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς προσδιορίζεται κατὰ προσέγγισιν τόσῃ μεγαλητέραν, ὅσῃ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου του εἶναι μικρότερον. Καὶ ὄντως, ἂν τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι 1, εἶναι ἀκριβῆ τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ μέχρι τοῦ τῶν ἑκατοντάκις χιλιοστῶν, ἂν δὲ εἶναι 0, τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι ἀκριβῆ μέχρι τῶν μυριοστῶν, ἂν δὲ 2, μόνον μέχρι τῶν ἑκατοστῶν, ἂν δὲ 5, ὀρίζεται ὁ ἀριθμὸς μόνον μέχρι τῶν δεκάδων· αἱ δὲ μονάδες αὐτοῦ εἶναι ἄγνωστοι.

ΣΗΜ. Ἐὰν δοθῇ λογάριθμος ὅλως ἀρνητικός, τρέπομεν αὐτὸν εἰς ἄλλον, τοῦ ὁποίου μόνον τὸ χαρακτηριστικὸν νὰ εἶναι ἀρνητικὸν (237).

### Ἐφαρμογαὶ τῶν λογαρίθμων.

Πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις, ὑψώσεις εἰς δυνάμεις καὶ ἐξαγωγή ριζῶν.

1) Νὰ εὑρεθῇ τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν

$$75,32 \quad \text{ἐπὶ} \quad 0,6508$$

Εὐρίσκομεν  $\log. 75,32 = 1,87691$

$$\log. 0,6508 = \underline{1,81345}$$

ἄθροισμα λογαρίθμων = 1,69036 =  $\log.$  γινομένου.

Ὁ πρὸς τὸν λογάριθμον 1,69036 ἀντιστοιχῶν ἀριθμὸς 49,019 εἶναι τὸ ζητούμενον γινόμενον κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς χιλιοστοῦ.

2) Νὰ εὑρεθῇ τὸ πηλίκον τοῦ 853,54 διὰ τοῦ 195,817.

$$\log. 853,54 = 2,93122$$

$$\log. 195,817 = \underline{2,29185}$$

διαφορὰ λογαρίθμων ἢ  $\log.$  πηλίκου = 0,63937

$$\text{καὶ πηλίκον} = 4,3588$$

κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς μυριοστοῦ.



3) Νὰ εὑρεθῆ ἡ τριακοστὴ δύναμις τοῦ ἀριθμοῦ 1,05, ἥτοι ὁ ἀριθμὸς  $(1,05)^{30}$ .

$$\text{λογ } 1,05 = 0,02119$$

$$\text{ἐπὶ } 30$$

$$\text{γινόμενον } 0,63570 = \text{λογ } (1,05)^{30}.$$

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀληθὴς λογάριθμος τοῦ 1,05 δύναται νὰ διαφέρῃ τοῦ ἐν τῷ πίνακι ὑπάρχοντος κατὰ ἡμίσειαν μονάδα τῆς τελευταίας τάξεως, ἔπεται, ὅτι ὁ εὑρεθεὶς λογάριθμος τοῦ  $(1,05)^{30}$  δύναται νὰ διαφέρῃ τοῦ ἀληθοῦς κατὰ 15 μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως ἐπομένως ὁ ἀληθὴς λογάριθμος τοῦ  $(1,05)^{30}$  περιλαμβάνεται μεταξύ τοῦ 0,63555 καὶ τοῦ 0,63585. Ἄρα, ὡς φαίνεται ἐκ τῶν πινάκων, ἡ ζητούμενη δύναμις περιλαμβάνεται μεταξύ τοῦ 4,320 καὶ τοῦ 4,324. ἐκ τούτου ἔπεται, ὅτι ἡ ζητούμενη δύναμις εἶναι 4,322 κατὰ προσέγγισιν 2 χιλιοστῶν· διαφέρει δηλαδὴ ὁ ἀριθμὸς οὗτος 4,322 ἀπὸ τοῦ ζητουμένου ὀλιγώτερον ἢ 2 χιλιοστά.

4) Νὰ ἐξαχθῆ ἡ 7η ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ 87594.

Ἐχομεν

$$\text{λογ } 87594 = 4,94247$$

$$\text{ἐπὶ } \frac{1}{7}$$

$$\text{γινόμενον } 0,70607.$$

καὶ ἐπομένως  $(87594)^{\frac{1}{7}} = 5,0824$  κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς μυριοστοῦ.

5) Νὰ εὑρεθῆ τοῦ 120 ἡ  $\frac{2}{3}$  δύναμις, ἥτοι ὁ ἀριθμὸς  $(120)^{\frac{2}{3}}$ .

Ἐχομεν

$$\text{λογ } 120 = 2,07918$$

$$\text{ἐπὶ } \frac{2}{3}$$

$$\text{γινόμενον } 1,38612$$

ὅθεν  $(120)^{\frac{2}{3}} = 24,329$  κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς χιλιοστοῦ.

6) Νὰ ἐξαχθῆ ἡ 5η ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ 0,854

ἥτοι νὰ εὑρεθῆ ὁ ἀριθμὸς  $(0,854)^{\frac{1}{5}}$ .

Ἐκ τῶν πινάκων εὐρίσκομεν

$$\text{λογ } 0,854 = 1,93146$$

$$\text{ἐπὶ } \frac{1}{5}$$

$$\text{γινόμενον } 1,98629 = \text{λογ } \sqrt[5]{0,854}.$$

ἔθεν  $\sqrt[5]{0,854} = 0,968925$  κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς ἑκατομμυριοστοῦ.

**Παρατήρησις** Ἴνα διαιρέσωμεν τὸν λογάριθμον  $\overline{1,93146}$  διὰ τοῦ 5, γράφομεν αὐτὸν ὡς ἐξῆς  $\overline{5} + 4.93146$  καὶ διαιροῦμεν ἕκαστον τῶν μερῶν χωριστά.

**Μονώνυμα.**

1) Νὰ εὑρεθῇ ἡ παράστασις

$$\frac{(\sqrt[3]{28})^3 \cdot \sqrt[5]{53}}{8993}, \quad \text{ἥτοι} \quad \frac{(28)^{\frac{3}{2}} \cdot (53)^{\frac{1}{5}}}{8993}.$$

Ὁ λογάριθμος αὐτῆς ἰσοῦται (234) τῷ λογαρίθμῳ τοῦ ἀριθμητοῦ ἐλαττωθέντι κατὰ τὸν λογάριθμον τοῦ παρονομαστοῦ.

Ἄλλ' ὁ ἀριθμητὴς εἶναι γινόμενον δύο παραγόντων, ἐπομένως ὁ λογάριθμος αὐτοῦ ἰσοῦται τῷ ἀθροίσματι τῶν λογαρίθμων τῶν παραγόντων (232).

Ἐπειδὴ δὲ ἑκάτερος τῶν παραγόντων εἶναι δύναμις, ὁ λογάριθμος αὐτοῦ ἰσοῦται τῷ λογαρίθμῳ τῆς βάσεως πολλαπλασιασθέντι ἐπὶ τὸν ἐκθέτην (234).

Ὡστε ὁ λογάριθμος τῆς δοθείσης παραστάσεως εἶναι

$$\frac{3}{2} \cdot \log 28 + \frac{1}{5} \log 53 - \log 8993.$$

**Διάταξις τῶν πράξεων.**

$$\log 28 = 1,44726$$

$$\frac{3}{2} \log 28 = 2,17074$$

$$\log 53 = 1,72428$$

$$\frac{1}{5} \log 53 = 0,34485$$

$$\log 8993 = 3,95390$$

ἄθροισμα	2,51559
ἀφαιρεῖται	3,95390
ὑπόλ.	2,56169

ἀντιστοιχῶν ἀριθμὸς εἶναι ὁ 0,03645, ὅστις διαφέρει τῆς δοθείσης παραστάσεως ὀλιγώτερον τοῦ ἑνὸς ἑκατοντάκις χιλιοστοῦ.

2) Ὑπολογίσαι τὴν παράστασιν

$$\frac{3 \cdot (0,045)^{\frac{2}{3}} \cdot (58)^{\frac{1}{4}}}{(0,318)^5}$$

ὁ λογάριθμος αὐτῆς εἶναι ἴσος τῷ

$$\log 3 + \frac{2}{3} \log (0,045) + \frac{1}{4} \log 58 - 5 \cdot \log (0,318).$$

**Διάταξις τῶν πράξεων.**

λογ 3 =		0,47712
λογ (0,045) = $\overline{2,65321}$	$\frac{2}{3}$ λογ (0,045) =	$\overline{1,10214}$
λογ 58 = 1,76343	$\frac{1}{4}$ λογ 58 =	0,44085
λογ (0,318) = $\overline{1,50243}$ ,	ἄθροισμα	$\overline{0,02011}$
	5 λογ (0,318) =	$\overline{3,51215}$
	ὑπόλοιπον	$\overline{2,50796}$

καὶ ἀντιστοιχῶν ἀριθμὸς 322,1.

οὗτος ἰσοῦται τῇ παραστάσει κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς δεκάτου

ΣΗΜ. Πρὸς ἀφαίρεσιν τοῦ λογαρίθμου 3,51215 νοοῦμεν προστεθείσας τρεῖς μονάδας εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιροτέον, ὅπερ δὲν βλάπτει τὴν διαφορὰν· ἡ ἀφαιρούμεν ἕκαστον τῶν μερῶν χωριστὰ καὶ ἐφαρμόζομεν τὰ περὶ τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν εἰρημένα.

Τὰ παραδείγματα ταῦτα ἀρκοῦσιν, ἵνα γίνῃ καταφανὴς ἡ ἀπὸ τῶν λογαρίθμων ὠφέλεια, διότι δι' αὐτῶν ἐκτελοῦνται εὐκολώτατα πράξεις, αἵτινες ἄλλως θὰ ἦσαν μακρόταται καὶ ἐπιπονώταται. Παρατηρητέον δ' ὅμως, ὅτι ἐν ἑκάστῳ ὑπολογισμῷ πρέπει νὰ ἐξакριβώνηται ἡ ἐπιτευχθεῖσα προσέγγισις· διότι, ὡς ἐν τῷ 3<sup>ῳ</sup> παραδείγματι ἐδείχθη, ὅταν αὐτὸς λογάριθμος πολλακίς ἐπαναλαμβάνηται ἢ ὅταν πολλοὶ λογάριθμοι λαμβάνωνται, ἐπειδὴ ἕκαστος αὐτῶν διαφέρει τοῦ ἀληθοῦς, ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὸ ἐν ἑκάστῳ ὑπάρχον σφάλμα καὶ ἐπομένως ὁ ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ αὐτῶν προκύπτων λογάριθμος τοῦ ζητουμένου ἀριθμοῦ δύναται νὰ διαφέρει τοῦ ἀληθοῦς κατὰ πολλὰς μονάδας τῆς τελευταίας δεκαδικῆς τάξεως. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει καλῆτερον εἶναι νὰ γίνηται χρῆσις τῶν ἐπταψηφίων λογαρίθμων ὡς μείζονα προσέγγισιν παρεχόντων.

Ἐπὶ παραστάσεων μὴ μονωνύμων ἐφαρμόζονται μετὰ δυσκολίας οἱ λογάριθμοι· διότι ἐν γένει εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπολογίζηται διὰ τῶν λογαρίθμων ἕκαστος τῶν προσθετέων τῆς παραστάσεως (ἐκτός ἂν εἶναι δεδομένος), ὥστε ὁ ὑπολογισμὸς τῆς ὅλης παραστάσεως ἀναλύεται εἰς περισοτέρους ὑπολογισμοὺς μονωνύμων· τοῦτο δὲ καὶ τὰς ἐργασίας πολλαπλασιάζει καὶ τὴν προσέγγισιν βλάπτει. Διὰ τοῦτο ζητοῦμεν πάντοτε νὰ μετασχηματίζωμεν τὴν διὰ τῶν λογαρίθμων ὑπολογιστέαν παράστασιν, ἂν εἶναι δυνατόν, εἰς μονώνυμον. Ἐὰν παραδείγματός χάριν πρόκειται νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ρίζα  $\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}$ , γράφομεν  $\sqrt{(\alpha + \beta) \cdot (\alpha - \beta)}$ , καὶ ἐπειδὴ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ὑποτίθενται δεδομένα, εὐρίσκομεν τοὺς παράγοντας  $\alpha + \beta$  καὶ  $\alpha - \beta$  καὶ ἔπειτα ἐφαρμόζομεν τοὺς λογαρίθμους.

### Περὶ ἀνατοκισμοῦ.

Τόκος λέγεται τὸ κέρδος, τὸ ὁποῖον ἀποφέρουσι δανεισθέντα χρήματα.  
 Ἐπιτόκιον λέγεται τὸ κέρδος, ὅπερ ἀποφέρουσιν 100 δραχ. εἰς ἓν ἔτος.  
 Τὸ δανεισθὲν ποσὸν λέγεται κεφάλαιον.

Ὁ τόκος εἶναι ἀνάλογος τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ ἐπιτοκίου.

Ὁ τόκος εἶναι ἢ ἀπλοῦς ἢ σύνθετος· καὶ ἀπλοῦς μὲν λέγεται, ὅταν τὸ κεφάλαιον μὲν τὸ αὐτὸ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ δανείου· σύνθετος δέ, ὅταν εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρονικῆς μονάδος προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον καὶ ἀποτελῇ τὸ κατὰ τὴν ἐπομένην χρονικὴν μονάδα τοκίζόμενον κεφάλαιον.

Ἡ εἰς τὸ κεφάλαιον προσθήκη τοῦ τόκου, ἧτοι ἡ κεφαλαιοποίησις τοῦ τόκου, λέγεται ἀνατοκισμὸς· τὸ δὲ ἐπὶ συνθέτῳ τόκῳ δανειζόμενον ποσὸν λέγεται, ὅτι ἀνατοκίζεται.

### Πρόβλημα.

241. *Κεφάλαιον α δραχμῶν ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος, πόσον θὰ γίνῃ μετὰ ν ἔτη, ὅταν μία δραχμὴ εἰς ἓν ἔτος φέρῃ τόκον τ;*

Ἐπειδὴ μία δραχμὴ εἰς ἓν ἔτος φέρει τόκον τ, αἱ α δραχμὴ φέρουσιν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ  $\alpha\tau$ · ὥστε τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον α εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους θὰ γίνῃ  $\alpha + \alpha\tau$ , ἢ  $\alpha(1 + \tau)$

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι ἡ μετὰ ἓν ἔτος ἀξία κεφαλαίου οἰουδήποτε εὑρίσκεται, ἐὰν πολλαπλασιασθῇ τοῦτο ἐπὶ  $(1 + \tau)$ .

Κατὰ ταῦτα, τὸ κεφάλαιον α, ὅπερ εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους ἔγινεν  $\alpha(1 + \tau)$ , εἰς τὸ τέλος τοῦ δευτέρου θὰ γίνῃ  $\alpha(1 + \tau) \cdot 1 + \tau$ , ἧτοι  $\alpha(1 + \tau)^2$  (διότι διαρκούντος τοῦ δευτέρου ἔτους θεωρεῖται τὸ  $\alpha(1 + \tau)$  ὡς κεφάλαιον), εἰς δὲ τὸ τέλος τοῦ τρίτου,  $\alpha(1 + \tau)^3$ , καὶ γενικῶς εἰς τὸ τέλος τοῦ νοστοῦ θὰ γίνῃ  $\alpha(1 + \tau)^n$ . ἂν λοιπὸν παραστήσωμεν τὴν ἀξίαν τοῦ δανείου εἰς τὸ τέλος τῶν ν ἐτῶν διὰ τοῦ Κ, θὰ ἔχωμεν τὴν ἐξίσωσιν

$$K = \alpha(1 + \tau)^n. \quad (1)$$

Φανερὸν δέ, ὅτι ἡ αὐτὴ προκύπτει ἐξίσωσις καὶ ὅταν ὁ ἀνατοκισμὸς συμβαίνει οὐχὶ κατ' ἔτος, ἀλλὰ κατ' ἴσα χρονικὰ διαστήματα οἰαδήποτε, ἀρκεῖ νὰ παρασταθῇ διὰ τοῦ τ ὁ τόκος τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς ἓν τῶν διχοστημάτων καὶ διὰ τοῦ ν τὸ πλῆθος τῶν διαστημάτων.

Ἐκ τῆς ἐξίσωσεως (1) δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν ἐν τῶν τεσσάρων ποσῶν Κ, α, τ, ν, ὅταν τὰ λοιπὰ τρία εἶναι δεδομένα γίνεται δὲ τοῦτο εὔ-

κολως διὰ τῶν λογαρίθμων, διότι λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν ἴσων εὐρίσκομεν

$$\log K = \log \alpha + n \log (1 + \tau). \quad (1')$$

Ἐπειδὴ δὲ δύναται νὰ εἶναι ἄγνωστον ἐν οἰονδήποτε ἐκ τῶν τεσσάρων  $K, \alpha, n, \tau$ , ἐπεταί, ὅτι δύναται νὰ προταθῶσι τέσσαρα διάφορα προβλήματα.

Ἐπονται παραδείγματα τοιούτων προβλημάτων.

1) Ἐδάνεισέ τις πρὸς 12 ἐτῶν 1000 δραχμὰς ἐπὶ ἀνατοκισμῶ πρὸς 8%· πόσας ἔχει νὰ λάβῃ σήμερον;

Ἐχομεν  $n=12, \alpha=10000, \tau=0,08$  ὅθεν ὁ τύπος (1') γίνεται

$$\log K = \log 10000 + 12 \cdot \log (1,08)$$

$$\log 10000 = 4$$

$$\log (1,08) = 0,03342$$

$$12 \log (1,08) = 0,40104$$

$$\log K = 4,40104$$

$$\text{καὶ } K = 25178$$

κατὰ προσέγγισιν 3 μονάδων.

2) Ἄν τις ἐδάνειζεν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν λεπτῶν ἐπὶ ἀνατοκισμῶ πρὸς 4%, πόσον θὰ ἐγίνετο τὸ δάνειον εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1900;

Ἐχομεν  $n=1900, \tau=0,04, \alpha=0,01$ .

ὅθεν ὁ τύπος (1) γίνεται

$$\log K = \log (0,01) + 1900 \log (1,04)$$

$$\log (0,01) = \overline{2}$$

$$\log (1,04) = 0,01703.$$

$$1900 \log (1,04) = 32,35700$$

$$\log K = \overline{30,35700}$$

ὁ ἀριθμὸς  $K$  τῶν δραχμῶν, αἵτινες παριστῶσι τὴν ἀξίαν τοῦ δανείου μετὰ 1900 ἔτη, γράφεται μὲ 31 ψηφία ἀκέραια 31 ὄγκοι χρυσοῦ, ὧν ἕκαστος ἴσος πρὸς τὸν ὄγκον τῆς γῆς, μῶλις θὰ ἐξήρκουν πρὸς πληρωμὴν τοῦ ποσοῦ τούτου τῶ ὄντι ὁ ὄγκος τῆς γῆς (ἐπειδὴ ἡ περιφέρεια τοῦ μεγίστου κύκλου αὐτῆς εἶναι 40 000 000 μέτρα) εἶναι κυβικὰ μέτρα

$$\frac{4}{3} (40\,000\,000)^3$$

τόσος δὲ ὄγκος χρυσοῦ θὰ εἶχε βάρος

$$\frac{(40\,000\,000)^3}{6\pi^2} \cdot 19500 \text{ χιλιόγραμμα}$$

(διότι μίξ λίτρα χρυσοῦ ἔχει βάρος 19,5 χιλιόγραμμα), καὶ ἐπειδὴ ἡ

ἀξία ἑνὸς χιλιογράμμου τοῦ χρυσοῦ εἶναι περίπου  $\frac{31000}{9}$  δραχμαί, ἡ ἀ-

ξίς ενός τοιούτου ὄγκου θὰ ᾗτο

$$\frac{(40\ 000\ 000)^3}{54 \cdot \pi^2} \cdot 19500 \cdot 31000$$

καὶ ἂν μ τοιοῦτοι ὄγκοι ἔχωσιν ἀξίαν ἴσην τῷ K, θὰ εἶναι

$$K = \frac{(40\ 000\ 000)^3}{54 \cdot \pi^2} \cdot 19500 \cdot 31000 \mu$$

ἔθεν εὐρίσκομεν

$$\log(\mu) = \log K + \log 54 + 2 \log \pi - 3 \log(40\ 000\ 000) - \log(19500) - \log(31000)$$

$$\log K = 30,35700 \qquad 3 \log(40\ 000\ 000) = 22,80618$$

$$\log 54 = 1,73239 \qquad \log 19500 = 4,29003$$

$$2 \log \pi = 0,99428 \qquad \log 31000 = 4,49136$$

$$\frac{33,08367}{31,58757}$$

$$33,08367$$

$$31,58757$$

$$\log \mu = 1,49610 \quad \text{καὶ } \mu = 31,34$$

3) Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ δανείσῃ τις ἐπ' ἀνατοκισμῶ πρὸς 6%, ἵνα λάβῃ μετὰ 15 ἔτη 50000;

Ἔχομεν  $K=50000$ ,  $\tau=0,06$ ,  $n=15$ . ἔθεν ἔπεται ἐκ τοῦ τύπου (1')

$$\log \alpha = \log 50000 - 15 \cdot \log(1,06)$$

$$\log 50000 = 4,69897$$

$$\log(1,06) = 0,02531$$

$$15 \cdot \log(1,06) = 0,37965$$

$$\log \alpha = 4,31932$$

$$\text{καὶ } \alpha = 20860$$

κατὰ προσέγγισιν 4 μονάδων.

4) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον 5897 δραχμαὶ ἀνατοκίζόμεναι ἐπὶ 6 ἔτη ἔγιναν 9805;

Ἔχομεν  $n=6$ ,  $K=9805$ ,  $\alpha=5897$ . ἔθεν

$$\log(1+\tau) = \frac{1}{6} (\log 9805 - \log 5897)$$

$$\log 9805 = 3,99145$$

$$\log 5897 = 3,77063$$

$$\text{διαφορὰ } 0,22082$$

$$\log(1+\tau) = 0,03680$$

$$\text{καὶ } 1+\tau = 1,0884$$

$$\text{ἔθεν } \tau = 0,0884$$

καὶ τὸ ἐπιτόκιον 100τ εἶναι 8,84% μὲ προσέγ. ἑνὸς ἑκατοστοῦ.

5) Μετὰ πόσα ἔτη 12589 δραχμαὶ ἀνατοκιζόμεναι πρὸς 5% γίνονται 45818;

Ὁ τύπος (1) δίδει

$$v = \frac{\log 45818 - \log 12589}{\log (1,05)}$$

Ἔχομεν

$$\log 45818 = 4,66104$$

$$\log 12589 = 4,09999$$

$$\log (1,05) = 0,02119$$

$$\text{διαφορὰ } \frac{0,56105}{0,02119}$$

$$\text{καὶ } v = \frac{0,56105}{0,02119} = \frac{56105}{2119} = 26 \text{ ἔτη καὶ τι πλεόν.}$$

ΣΗΜ. Ἐκ τῆς λύσεως ταύτης βλέπομεν ὅτι 26 ἔτη δὲν εἶναι ἱκανά, ἀλλ' 27 εἶναι περισσότερα τοῦ δέοντος. Ἴνα εὕρωμεν καὶ τὸ ἀπαιτούμενον μέρος τοῦ 27<sup>ου</sup> ἔτους, παρατηροῦμεν, ὅτι εἰς τὸ τέλος τοῦ 26<sup>ου</sup> ἔτους αἱ 12589 δραχμαὶ γίνονται  $12589(1,05)^{26}$ . ἂν δὲ τὸ κεφάλαιον τοῦτο τοκισθῇ ἐπὶ ἡμέρας, θὰ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ  $(1 + \frac{\eta\tau}{365})$  καὶ θὰ ἔχωμεν ἐπομένως τὴν ἐξίσωσιν  $12589 \cdot (1,05)^{26} (1 + \frac{\eta\tau}{365}) = 45818$ , ἐκ τῆς ὁποίας προσδιορίζομεν τὸν ἀριθμὸν  $(1 + \frac{\eta\tau}{365})$ , ἐξ αὐτοῦ δὲ εὐρίσκομεν εὐκόλως καὶ τὸν  $\eta$ . Οὕτως εὐρίσκεται  $\eta = 172$ .

Παρατηρητέον δέ, ὅτι ὁ λογάριθμος τῆς ἐν τῇ παρενθέσει ποσότητος εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως, ἐξ ἧς εὐρίσκεται ὁ  $v$ .

### Πρόβλημα.

242. Ἐὰν καταθέτη τις κατ' ἔτος εἰς Τράπεζαν τὸ ποσὸν  $a$  δραχμῶν ἐπ' ἀνατοκισμῶ, πόσα θὰ ἔχη νὰ λάβῃ μετὰ  $v$  ἔτη, τοῦ τόκου τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς ἓν ἔτος ὄντος  $\tau$ ;

Αἱ  $a$  δραχμαί, αἱ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου ἔτους κατατεθεῖσαι, ἔμειναν εἰς ἀνατοκισμὸν  $v$  ἔτη, καὶ διὰ τοῦτο ἔγιναν  $a(1+\tau)^v$ . αἱ δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ δευτέρου ἔτους κατατεθεῖσαι ἔγιναν  $a(1+\tau)^{v-1}$ , αἱ δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ τρίτου  $a(1+\tau)^{v-2}$ , καὶ καθ' ἑξῆς· τέλος αἱ  $a$  δραχμαί, αἱ κατατεθεῖσαι εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ τελευταίου ἔτους, γίνονται  $a(1+\tau)$ . Ὡστε, ἂν διὰ τοῦ  $\Sigma$  παραστήσωμεν τὸ ποσόν, ὅπερ θὰ λάβῃ εἰς τὸ τέλος τῶν  $v$  ἐτῶν, θὰ εἶναι

$$\Sigma = a(1+\tau) + a(1+\tau)^2 + a(1+\tau)^3 + \dots + a(1+\tau)^v, \text{ ἥτοι (222)}$$

$$\Sigma = \frac{a(1+\tau)^{v+1} - a(1+\tau)}{\tau} = \frac{a(1+\tau) \{ (1+\tau)^v - 1 \}}{\tau}$$

Ἴνα ὑπολογίσωμεν τὴν παράστασιν ταύτην διὰ τῶν λογαριθμῶν, ἀνάγκη πρῶτον νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν δύναμιν  $(1 + \tau)^n$  καὶ νὰ ἐλαττώσωμεν αὐτὴν κατὰ μονάδα· τὸ δὲ ὑπόλοιπον νὰ θέσωμεν ἐν τῇ παραστάσει ἀντὶ τοῦ παράγοντος  $(1 + \tau)^n - 1$  καὶ νὰ ἐφαρμόσωμεν ἐπ' αὐτῆς τοὺς λογαριθμοὺς.

ΠΙΜ. Τὰς δυνάμεις  $(1 + \tau)^n$  διὰ  $\tau = 0,03, \dots, \tau = 0,06$  καὶ διὰ  $n = 1, 2, \dots, 50$ , ἔχουσιν οἱ ὑπὸ τοῦ Dupuis ἐκδοθέντες πίνακες τοῦ Lalande ἐν σελ. 134 ὥστε δυνάμεθα ἀμέσως ἄνευ ὑπολογισμοῦ νὰ λαμβάνωμεν αὐτὰς ἐκεῖθεν.

**Παράδειγμα.** Καταθέτει τις ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς γεννήσεως τοῦ τέκνου του κατ' ἔτος 1000 δραχμὰς ὑπὲρ αὐτοῦ εἰς τὴν Τράπεζαν ἐπὶ ἀνατοκισμῶν πρὸς 6<sup>0</sup>/<sub>100</sub>· πόσα θὰ ἔχη νὰ λάβῃ τὸ τέκνον, διὰ συμπληρώσῃ τὸ 20<sup>ον</sup> ἔτος τῆς ἡλικίας του;

Ἔχομεν  $x = 1000$ ,  $\tau = 0,06$  καὶ  $n = 20$ . Ὡστε

$$\Sigma = \frac{1000(1,06) \{ (1,06)^{20} - 1 \}}{0,06}$$

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι (Dupuis, σελ. 134)  $(1,06)^{20} = 3,20713$ , ἔπεται

$$\log \Sigma = \log 1000 + \log (1,06) + \log (2,20713) - \log (0,06)$$

$$\log 1000 = 3,$$

$$\log (1,06) = 0,02531$$

$$\log (2,20713) = 0,34383$$

$$\hline \text{ἄθροισμα} \quad 3,36914$$

$$\log (0,06) = 2,77815$$

$$\text{ὑπόλοιπον} = \log \Sigma = 4,59099$$

$$\text{καὶ } \Sigma = 38993,6$$

κατὰ προσέγγισιν

μονάδος.

### Περὶ χρεωλυσίας

243. Χρεωλυσία λέγεται ἡ ἐντὸς ὠρισμένου χρόνου ἀπόσβεσις χρέους δι' ἴσων δόσεων, αἵτινες πληρώνονται κατ' ἴσα χρονικὰ διαστήματα, οἷον κατ' ἔτος ἢ καθ' ἑξαμηνίαν κτλ.

Τὸ ποσόν, ὅπερ πληρώνεται εἰς τὸ τέλος ἐκάστου χρονικοῦ διαστήματος, λέγεται χρεωλύσιον.

Ἀποσβέννεται δὲ τὸ χρέος, ὅταν τὸ ἄθροισμα πάντων τῶν χρεωλυσίων μετὰ τῶν συνθέτων τόκων αὐτῶν ἀποτελέσῃ ποσότητα ἴσην τῇ ἀξίᾳ τοῦ ἀνχτοκίζομένου κεφαλαίου.



Ἐὰν κεφάλαιόν τι  $\alpha$  δανεισθῆ ἐπὶ ἀνατοκισμῶ, μετὰ παρέλευσιν  $\nu$  χρονικῶν διαστημάτων γίνεται  $\alpha(1+\tau)^\nu$ ,  
 $\tau$  ὄντος τοῦ τόκου τῆς μιᾶς δραχμῆς ἐν ἐνὶ τῶν διαστημάτων.

Ἄν δὲ πρὸς ἐξόφλησιν πληρώνηται εἰς τὸ τέλος ἐκάστου χρονικοῦ διαστήματος ἡ ποσότης  $\chi$ , ἡ μὲν πρώτη δόσις, ἣτις δίδεται εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου διαστήματος, θὰ γίνῃ εἰς τὸ τέλος τῶν  $\nu$  διαστημάτων  $\chi(1+\tau)^{\nu-1}$ ,

ἡ δὲ δευτέρα, ὡς διδομένη εἰς τὸ τέλος τοῦ δευτέρου διαστήματος, θὰ γίνῃ εἰς τὸ τέλος τῶν  $\nu$  διαστημάτων

$$\chi(1+\tau)^{\nu-2}.$$

Ὅμοίως ἡ τρίτη δόσις θὰ γίνῃ  $\chi(1+\tau)^{\nu-3}$  κτλ., ἡ δὲ προτελευταία (ἐπειδὴ καθ' ἐν μόνον χρονικὸν διάστημα τοκίζεται) θὰ γίνῃ  $\chi(1+\tau)$ , καὶ ἡ τελευταία  $\chi$ . Ὡστε ἡ ὀλικὴ ἀξία τῶν  $\nu$  δόσεων θὰ εἶναι εἰς τὸ τέλος τῶν  $\nu$  διαστημάτων

$$\chi + \chi(1+\tau) + \chi(1+\tau)^2 + \chi(1+\tau)^3 + \dots + \chi(1+\tau)^{\nu-1},$$

ἢτοι (222) 
$$\chi \frac{(1+\tau)^\nu - 1}{\tau}.$$

Καὶ ἐπομένως, ἵνα συμβῆ ἀπόσβεσις, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι

$$\chi \frac{(1+\tau)^\nu - 1}{\tau} = \alpha(1+\tau)^\nu. \quad (1)$$

Ἐκ τῆς ἐξισώσεως ταύτης δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν μίαν τῶν τεσσάρων ποσοτήτων  $\chi$ ,  $\tau$ ,  $\nu$  ἢ  $\alpha$ , ὅταν αἱ λοιπαὶ τρεῖς εἶναι γνωσταί.

ΣΗΜ. Τὸ πρόβλημα τῆς χρεωλυσίας δυνάμεθα καὶ ἄλλως νὰ λύσωμεν, ὡς ἐξῆς.

Ἐὰν τις δανεισθῆ σήμερον  $\alpha$  δραχμάς, μετὰ ἐν ἔτος θὰ ὀφείλῃ νὰ πληρώσῃ  $\alpha(1+\tau)$ , ἢτοι τὸν τόκον αὐτὸν καὶ τὸ κεφάλαιον  $\alpha$ .

Ἐὰν λοιπὸν πληρώσῃ  $\chi$  δραχμάς, ἐλαττώνει τὸ χρέος του κατὰ  $\chi$  δραχμάς, ὅθεν εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους χρεωστῆ μόνον  $\alpha(1+\tau) - \chi$  δρ.

Ἐὰν δὲ παραστήσωμεν δι'  $\alpha_1$  τὸ χρέος τοῦτο καὶ σκεφθῶμεν ὁμοίως, εὐρίσκομεν, ὅτι εἰς τὸ τέλος τοῦ δευτέρου ἔτους θὰ χρεωστῆ μόνον

$$\alpha_1(1+\tau) - \chi \text{ δρ. ἢτοι } \alpha(1+\tau)^2 - \chi(1+\tau) - \chi, \text{ ὅπερ παριστῶ διὰ } \alpha_2.$$

Ὅμοίως εἰς τὸ τέλος τοῦ τρίτου ἔτους θὰ χρεωστῆ μόνον

$$\alpha_2(1+\tau) - \chi \text{ ἢτοι } \alpha(1+\tau)^3 - \chi(1+\tau)^2 - \chi(1+\tau) - \chi, \text{ ὅπερ παριστῶ διὰ } \alpha_3$$

καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς· εἰς τὸ τέλος τοῦ νοῦ ἔτους θὰ χρεωστῆ

$$\alpha(1+\tau)^\nu - \chi(1+\tau)^{\nu-1} - \chi(1+\tau)^{\nu-2} - \dots - \chi(1+\tau) - \chi, \text{ ἢ } \alpha_\nu,$$

καὶ ἐπειδὴ θέλει νὰ ἐξοφλήσῃ ἐντελῶς τὸ χρέος του, εἰς τὸ τέλος τοῦ νοῦ ἔτους, πρέπει νὰ εἶναι  $\alpha_\nu = 0$ , ἢτοι

$$\alpha(1+\tau)^\nu = \chi \{ 1 + (1+\tau) + (1+\tau)^2 + \dots + (1+\tau)^{\nu-1} \}$$

$$\text{ἢτοι } \chi \frac{(1+\tau)^\nu - 1}{\tau} = \alpha(1+\tau)^\nu$$

**Προβλήματα.**

1) Έδανείσθη τις 56000 δραχμάς πρὸς 7 %· θέλει δὲ νὰ ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος τοῦτο δι' ἐτησίων δόσεων εἰς 12 ἔτη πόσον εἶναι τὸ χρεωλύσιον ;

Έχομεν  $\alpha=56000$ ,  $\tau=0,07$ ,  $\nu=12$ .

Κατὰ πρῶτον ὑπολογίζομεν τὴν δύναμιν  $(1,07)^{12}$

$\log (1,07)=0,02938$

12.  $\log (1,07)=0,35256$ · ὅθεν  $(1,07)^{12}=2,2519$  (προσέγ. 3 μυριστ.).

Εκ τῆς ἐξίσωσως (1) λαμβάνομεν νῦν

$$\chi = \frac{56000 \cdot (2,2519) \cdot (0,07)}{1,2519}$$

$\log 56000 = 4,74819$

$\log 2,2519 = 0,35256$

$\log (0,07) = \bar{2},84510$

---

ἄθρ. 3,94585

$\log (1,2519) = 0,09757$

ὑπολ. =  $\log \chi = 3,84829$

καὶ  $\chi = 7051$

κατὰ προσέγγισιν τριῶν μονάδων.

2) Πόσον εἶναι τὸ χρέος, ὅπερ ἐξοφλεῖται εἰς 25 ἔτη διὰ χρεωλυσίου 8975 δραχμῶν, τοῦ ἐπιτοκίου ὄντος 6 % ;

Ένταῦθα ἔχομεν  $\chi=8975$ ,  $\tau=0,06$ .  $\nu=25$ · καὶ ἡ ἐξίσωσις (1)

γίνεται  $\alpha=8975 \frac{(1,06)^{25} - 1}{0,06 \cdot (1,06)^{25}}$

Έπειδὴ δὲ εἶναι (Dup., 134)  $(1,06)^{25}=4,29187$ , ἔπεται

$\log \alpha = \log 8975 + \log (3,29187) - \log (0,06) - \log (4,29187)$ ,

$\log 0,06 = \bar{2},77815$

$\log 8975 = 3,95303$

$\log (4,29187) = 0,63264$

$\log 3,29187 = 0,51744$

---

1,41079

---

4,47047

4,47047

1,41079

$\log \alpha = 5,05967$

καὶ  $\alpha = 114731$ , κατὰ προσέγγισιν 5 μονάδων.

3) Εἰς πόσα ἔτη ἐξοφλεῖται δάνειον 120000 δραχμῶν διὰ χρεωλυσίου 15000 δραχμῶν, τοῦ ἐπιτοκίου ὄντος 8 % ;

Ἐκ τῆς ἐξισώσεως (1) λαμβάνομεν  $\chi(1+\tau)^n - \chi = \alpha\tau(1+\tau)^n$   
 ὅθεν  $(1+\tau)^n = \frac{\chi}{\chi - \alpha\tau}$  (2)

ἐξ οὗ  $n \log(1+\tau) = \log \chi - \log(\chi - \alpha\tau)$   
 καὶ  $n = \frac{\log \chi - \log(\chi - \alpha\tau)}{\log(1+\tau)}$

Ἐνταῦθα  $\chi - \alpha\tau = 5400$   $\log \chi = 4,17609$   
 $\log(1+\tau) = 0,03342$   $\log(\chi - \alpha\tau) = 3,73239$   
 $0,44370$

$n = \frac{0,44370}{0,03342} = 13$  ἔτη καὶ τι πλεόν.

Τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο δεικνύει, ὅτι 13 δόσεις δὲν εἶναι ἱκαναὶ νὰ ἀποσβέσωσιν ἐντελῶς τὸ χρέος, ἀλλὰ πάλιν 14 εἶναι πλεόν τοῦ δέοντος· ἥτοι ἡ 14ῃ δόσις θὰ σύγκειται ἐκ δραχμῶν ὀλιγώτερον τοῦ χρωλυσίου.

Διὰ νὰ εὐρωμεν δὲ τὴν 14ῃ δόσιν, ἀρκεῖ νὰ εὐρωμεν, πόσον γίνεται τὸ δάνειον εἰς τὸ τέλος τῶν 14 ἐτῶν, ἔπειτα τί γίνονται αἱ 13 δόσεις εἰς τὸ τέλος τῶν αὐτῶν ἐτῶν καὶ ἔπειτα νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον ποσὸν ἀπὸ τοῦ πρώτου.

Οὕτως εὐρίσκομεν, ὅτι ἡ 14ῃ δόσις θὰ εἶναι 4252 δραχμαί.

Παρατηρητέον δέ, ὅτι κατὰ τὴν ἐξίσωσιν (2), ἵνα τὸ πρόβλημα ᾖ δυνατόν, ἀνάγκη νὰ ἔχωμεν  $\chi > \alpha\tau$ · τουτέστι τὸ χρωλύσιον νὰ ὑπερβικίνη τὸν ἐτήσιον τόκον τοῦ ἀρχικοῦ κεφαλαίου· ὅπερ καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ προφανές.

### Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Εἰς πόσα ἔτη κεφάλαιόν τι ἀνατοκίζομενον πρὸς 5% διπλασιάζεται; (Ἀπ. 14<sup>ἔτ.</sup>, 74<sup>ἡμ.</sup>)

2) Ἐὰν ὁ πληθυσμὸς τόπου τινὸς αὐξάνηται κατ' ἔτος κατὰ τὰ 5 χιλιοστὰ αὐτοῦ καὶ εἶναι σήμερον 2000000, πόσος θὰ γίνῃ μετὰ 100 ἔτη; (Ἀπ. 3296300)

3) Ἐκ πίθου περιέχοντος 100 λίτρας οἴνου ἀφαιρεῖται καθ' ἐκάστην μία λίτρα καὶ ἀναπληροῦται δι' ὕδατος. Ζητεῖται α') πόσος οἶνος θὰ μείνῃ μετὰ 50 ἡμέρας, καὶ β') μετὰ πόσας ἡμέρας θὰ μείνῃ τὸ ἡμισυ τοῦ οἴνου; (Ἀπ. α) 60<sup>λίτρ.</sup>, 5. β') μετὰ 68 ἡμέρας μένει περισσότερον τοῦ ἡμίσεος, μετὰ δὲ 69 ὀλιγώτερον).

4) Ἐὰν ἔχη τις νὰ λαμβάνῃ ἐπὶ 30 ἔτη 5000 δρ. κατ' ἔτος, ἀντὶ πόσου δύναται σήμερον νὰ πωλήσῃ τὸ δικαίωμά του;

5) Δανεῖζεται τις α δραχμὰς μετὰ τὴν ἐξῆς συμφωνίαν. Τὸ χρέος πρέπει νὰ ἐξοφληθῇ εἰς ν ἔτη κατ' ἔτος θὰ πληρώνηται ὁ τόκος τοῦ μένοντος χρέους καὶ β δραχμαί ἐκ τοῦ χρέους. Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ ἐτήσια δόσεις.

6) Νὰ λυθῇ τὸ αὐτὸ πρόβλημα, ὅταν ἐκάστη δόσις ἰσῶται τῇ προηγούμενῃ σὺν τῷ ἐτησίῳ τόκῳ αὐτῆς.

## \* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

#### Όρισμός τών λογαρίθμων ὡς ἐκθετῶν.

244. Λογάριθμος ἀριθμοῦ λέγεται ὁ ἐκθέτης τῆς δυνάμεως, εἰς τὴν ὁποῖαν πρέπει νὰ ὑψωθῇ ὁρισμένος τις ἀριθμὸς  $a$ , ἵνα δώσῃ αὐτόν.

Ὁ ἀριθμὸς  $a$ , ὅστις ὑψούμενος εἰς δυνάμεις παράγει τοὺς ἄλλους, λέγεται *βάσις* τῶν λογαρίθμων.

Παραδείγματος χάριν, ἂν ὁ 10 ληθῆ ὡς *βάσις*,

ὁ λογάριθμος τοῦ 100 θὰ εἶναι ὁ 2· διότι  $100=10^2$

τοῦ 1000 θὰ εἶναι ὁ 3· διότι  $1000=10^3$

καὶ τοῦ  $\sqrt{10}$  θὰ εἶναι ὁ  $\frac{1}{2}$ · διότι  $\sqrt{10}=10^{\frac{1}{2}}$

Ἐπειδὴ ὡς *βάσις*  $a$  δύναται νὰ ληθῆ οἰοσδήποτε θετικὸς ἀριθμὸς (διάφορος τῆς μονάδος), διὰ τοῦτο δύνανται νὰ σχηματισθῶσι διάφορα λογαριθμικὰ συστήματα, καὶ εἰς καὶ ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς θὰ ἔχῃ διαφόρους λογαρίθμους εἰς τὰ διάφορα ταῦτα συστήματα.

Παραδείγματος χάριν, ὁ 100 ἔχει λογάριθμον 1, εἰάν ληθῆ ὡς *βάσις* ὁ 100· διότι  $100=100^1$ , θὰ ἔχῃ δὲ λογάριθμον  $\frac{1}{2}$ , εἰάν ληθῆ ὡς *βάσις* ὁ ἀριθμὸς 10000, διότι  $100=10000^{\frac{1}{2}}$ , κτλ.

Καὶ γενικῶς, εἰάν εἶναι  $a^x=M$ , ὁ  $x$  θὰ λέγηται λογάριθμος τοῦ  $M$  κατὰ τὴν *βάσιν*  $a$ .

Οἱ ἐν χρήσει λογάριθμοι ἔχουσι *βάσιν* τὸν ἀριθμὸν 10 καὶ λέγονται διὰ τοῦτο *δεκαδικοί* λογάριθμοι ἢ *κοινοὶ* λογάριθμοι. Ἐν τῇ ἀνωτέρῳ μαθηματικῇ ἀναδεικνύεται ἄλλη τις *βάσις* ἀσύμμετρος πασῶν τῶν ἄλλων ἀρμοδιωτέρᾳ πρὸς τὰς μαθηματικὰς θεωρίας· ἀλλ' ἐν ταῖς ἐφαρμογαῖς γίνεται πάντοτε χρῆσις τῶν δεκαδικῶν λογαρίθμων.

ΣΗΜ. Ἴνα ὁ ἀνωτέρω δοθεὶς ὁρισμὸς στηριχθῆ ἐπὶ τῶν γνωστῶν, πρέπει πρῶτον νὰ ὀρισθῆ ἡ σημασία τῶν δυνάμεων, ὧν οἱ ἐκθέται εἶναι ἀσύμμετροι ἀριθμοί, καὶ νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι καὶ περὶ τῶν τοιούτων δυνάμεων ἰσχύουσιν οἱ ἤδη τεθέντες νόμοι (189) καὶ προσέτι νὰ δειχθῆ,

ἔτι πρὸς ἕκαστον θετικὸν ἀριθμὸν  $M$  ἀντιστοιχεῖ ἓκ τῆς ἐξισώσεως  $\alpha^x = M$  εἷς καὶ μόνον εἷς ἐκθέτης ἧτοι λογάριθμος. Ἐπειδὴ ὁμως ἡ περὶ τούτων πραγματεία ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς στοιχειώδους μαθηματικῆς καὶ μόνον ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ μαθηματικῇ δύναται νὰ γίνῃ τελεία, διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ἐπομένοις δεχόμεθα αὐτὰ ἄνευ ἀποδείξεων.

### Ἰδιότητες τῶν λογαρίθμων.

245. Ἐν παντὶ συστήματι λογαρίθμων ἡ μονὰς 1 ἔχει λογάριθμον τὸ 0 καὶ ἡ βᾶσις τὴν μονάδα.

Διότι εἶναι  $\alpha^0 = 1$  καὶ  $\alpha^1 = \alpha$ ,  
οἰοσδήποτε ἀριθμὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ  $\alpha$ .

246. Ὁ λογάριθμος τοῦ γινομένου δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται τῷ ἀθροίσματι τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν τούτων.

Διότι ἔστω  $\alpha$  ἡ βᾶσις καὶ  $\chi, \psi$  οἱ λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν  $M$  καὶ  $N$ , ἧτοι ἔστω  $\alpha^x = M$  καὶ  $\alpha^\psi = N$   
τότε θὰ εἶναι καὶ  $\alpha^{x+\psi} = M \cdot N$   
ἧτοι  $\log(MN) = x + \psi = \log M + \log N$ .

Ἐκ τῆς θεμελιώδους ταύτης ιδιότητος ἀποδεικνύονται αἱ λοιπαὶ ιδιότητες τῶν λογαρίθμων (ιδεὲ ἐδ. 234—237)

$$\log\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \log \alpha - \log \beta$$

$$\log(\alpha^\mu) = \mu \log \alpha$$

$$\log(\sqrt{\alpha}) = \frac{1}{2} \log \alpha.$$

Παρατηρητέον ὁμως, ὅτι αἱ ιδιότητες τοῦ χαρακτηριστικοῦ καὶ τοῦ δεκαδικοῦ μέρους τῶν λογαρίθμων (ἐδ. 237) δὲν ὑπάρχουσιν εἰς τὰ ἄλλα συστήματα, πλὴν τοῦ δεκαδικοῦ, ἐνόσω γράφονται οἱ ἀριθμοὶ κατὰ τὸ δεκαδικὸν σύστημα· διὰ τοῦτο εἰς τὰς ἐφαρμογὰς γίνεται χρῆσις μόνον τῶν δεκαδικῶν λογαρίθμων.

247. Ἐχοντες τοὺς λογαρίθμους ὁσωνδήποτε καὶ οἰωνδήποτε ἀριθμῶν κατὰ τινὰ βᾶσιν, εὐρίσκομεν τοὺς λογαρίθμους τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν κατ' ἄλλην βᾶσιν, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν αὐτοὺς ἐπὶ ὠρισμένον τινὰ ἀριθμὸν (ὅστις εἶναι ὁ λογάριθμος τῆς παλαιᾶς βάσεως πρὸς τὴν νέαν).

Διότι ἔστωσαν αἱ βᾶσεις  $\alpha$  καὶ  $\beta$ ,  $\chi$  καὶ  $\psi$  δὲ οἱ λογάριθμοι τοῦ τυχόντος ἀριθμοῦ  $M$  κατὰ τὰς βᾶσεις ταύτας· τότε εἶναι

$$\alpha^x = M \text{ καὶ } \beta^\psi = M,$$

ὅθεν καὶ

$$\alpha^x = \beta^\psi.$$

Καὶ λαμβάνοντες τοὺς λογαριθμοὺς τῶν δύο τούτων ἴσων πρῶτον μὲν κατὰ τὴν βάσιν  $\alpha$ , ἔπειτα δὲ κατὰ τὴν βάσιν  $\beta$ , εὐρίσκομεν

$$\begin{aligned} \chi &= \psi \log \beta && \text{βάσις } \alpha \\ \psi &= \chi \log \alpha && \text{βάσις } \beta. \end{aligned}$$

Ἐκ τῶν ἰσοτήτων τούτων βλέπομεν, ὅτι ἐκ τοῦ λογαριθμοῦ ( $\chi$ ) οἴου-δήποτε ἀριθμοῦ κατὰ τὴν βάσιν  $\alpha$  εὐρίσκομεν τὸν λογαριθμὸν ( $\psi$ ) τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ κατὰ τὴν βάσιν  $\beta$ , ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν  $\log \alpha$ , ἢτοι ἐπὶ τὸν λογαριθμὸν τῆς πρώτης βάσεως πρὸς τὴν δευτέραν.

Ἐκ τῶν αὐτῶν ἰσοτήτων ἔπεται προσέτι  $\log \beta \cdot \log \alpha = 1$ , ἢτοι, τὸ γινόμενον τῶν λογαριθμῶν δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν ἐκατέρου πρὸς τὸν ἄλλον ὡς βάσιν εἶναι ἴσον τῇ μονάδι.

**Παρατήρησις.** Ὅταν λαμβάνηται ὡς βάσις ὁ ἀριθμὸς 10, ὁ λογαριθμὸς τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ  $\alpha$  ὀρίζεται ἐκ τῆς ἐξισώσεως

$$10^x = \alpha.$$

Τὴν λύσιν τῆς ἐξισώσεως ταύτης κατὰ προσέγγισιν δυνάμεθα νὰ ἐπιχειρήσωμεν ὡς ἐξῆς.

Ἐστω ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς  $\alpha$  μεγαλύτερος τῆς μονάδος· ἂν τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ ἀγνώστου  $x$  παρασταθῇ διὰ τοῦ  $p$ , θὰ εἶναι

$$\begin{aligned} p &< x < p+1 \\ 10^p &< 10^x < 10^{p+1} \end{aligned}$$

ἄρα καὶ

ἢτοι

$$10^p < \alpha < 10^{p+1}, \quad \text{διότι } 10^x = \alpha.$$

ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι ὁ  $\alpha$  περιλαμβάνεται μεταξὺ τοῦ  $10^p$  καὶ τοῦ  $10^{p+1}$  καὶ θὰ ἔχη διὰ τοῦτο  $p+1$  ψηφία ἀκέραια, ἢτοι θὰ ἔχη θέμα τὸ  $p$ .

Ὅμοίως, ἂν ὁ ἀγνώστος  $x$  ἔχη  $p_1$  δέκατα (ἐν συνόλῳ), θὰ εἶναι

$$\frac{p_1}{10} < x < \frac{p_1+1}{10}$$

ἢτοι

$$p_1 < 10x < p_1+1.$$

ἄρα καὶ

$$10^{p_1} < \alpha^{10x} < 10^{p_1+1}$$

ἢτοι

$$10^{p_1} < \alpha^{10} < 10^{p_1+1}, \quad \text{διότι } 10^{10x} = (10^x)^{10} = \alpha^{10}$$

ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ  $\alpha^{10}$  ἔχει  $p_1+1$  ψηφία, ἐπομένως ὁ  $\alpha^{10}$  ἔχει θέμα  $p_1$ .

Ὅμοίως ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ  $x$  ἔχει ἑκατοστὰ (ἐν συνόλῳ) τὸ θέμα τῆς δυνάμεως  $\alpha^{100}$  καὶ οὕτω καθεξῆς.

Οὕτως εὐρίσκομεν τὸν ἐν τῷ ἔδαφ. (230) δοθέντα ὀρισμὸν τῶν δεκαδικῶν λογαριθμῶν.

**Ὅρισμός τῶν λογαρίθμων ὡς ὄρων ἀριθμητικῆς προόδου.**

248. Ἐὰν ἔχωμεν δύο προόδους τὴν μὲν γεωμετρικὴν ἀρχομένην ἀπὸ τῆς μονάδος, τὴν δὲ ἀριθμητικὴν ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ 0

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & 1+\delta & (1+\delta)^2 & \dots & (1+\delta)^n & \dots \\ 0, & \epsilon & 2\epsilon & \dots & n\epsilon & \dots \end{array}$$

οἱ ὄροι τῆς ἀριθμητικῆς προόδου λέγονται **λογάριθμοι** τῶν ἀντιστοιχούντων ὄρων τῆς γεωμετρικῆς.

Ἴνα ἐκ τοῦ ὀρίσμου τούτου ἀποδείξωμεν τὴν θεμελιώδη ιδιότητα τῶν λογαρίθμων, ἄς λάβωμεν δύο τυχόντας ὄρους τῆς γεωμετρικῆς προόδου καὶ ἄς παραστήσωμεν αὐτοὺς διὰ M καὶ N· ἔστω δὲ

$$M=(1+\delta)^\mu \qquad N=(1+\delta)^\nu$$

καὶ τὸ γινόμενον αὐτῶν MN, ἤτοι τὸ  $(1+\delta)^{\mu+\nu}$ , εἶναι καὶ αὐτὸ ὄρος τῆς γεωμετρικῆς προόδου καὶ ἔχει ἀντίστοιχον ἐν τῇ ἀριθμητικῇ προόδῳ τὸν ὄρον  $(\mu+\nu)\epsilon$ · ἐπομένως εἶναι κατὰ τὸν ὀρίσμον

$$\log(MN) = (\mu+\nu)\epsilon = \mu\epsilon + \nu\epsilon.$$

ἄλλ' ἐπίσης εἶναι  $\log M = \mu\epsilon$ ,  $\log N = \nu\epsilon$ .

ἄρα  $\log(MN) = \log M + \log N$ .

Ἐκ τῆς ἀρχικῆς δὲ ταύτης ιδιότητος ἀποδεικνύονται αἱ ἄλλαι κατὰ τὰ ἐν τοῖς ἐδαφίοις 234—237 εἰρημένα.

Ὁ ὀρίσμος οὗτος τῶν λογαρίθμων συμφωνεῖ πρὸς τὸν προηγούμενον, ὅστις θεωρεῖ τοὺς λογαρίθμους ὡς ἐκθέτας μιᾶς βάσεως· διότι ἔστω α ὁ ἀριθμός, ὅστις ὑψωθείς εἰς τὴν δύναμιν ε, παράγει τὸν  $1+\delta$ · ἤτοι ἔστω

$$\alpha^\epsilon = 1 + \delta \qquad \text{ἢ} \qquad \alpha = (1 + \delta)^{\frac{1}{\epsilon}},$$

τότε θὰ εἶναι

$$\begin{array}{l} 1 + \delta = \alpha^\epsilon \\ (1 + \delta)^2 = \alpha^{2\epsilon} \\ (1 + \delta)^3 = \alpha^{3\epsilon} \\ \dots\dots\dots \\ (1 + \delta)^n = \alpha^{n\epsilon} \end{array}$$

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι οἱ ὄροι τῆς γεωμετρικῆς προόδου εἶναι δυνάμεις τοῦ α ἔχουσαι ἐκθέτας τοὺς ἀντιστοιχοῦς ὄρους τῆς ἀριθμητικῆς προόδου, οἵτινες ἐπομένως εἶναι οἱ λογάριθμοι αὐτῶν κατὰ τὴν βάσιν α.

ΣΗΜ. Οὕτως ὥρισε τοὺς λογαρίθμους ὁ ἐπινοήσας αὐτοὺς Νέπερος (τῷ 1614)· ἀλλὰ κατὰ τὸν ὀρίσμον τοῦτον ὀρίζονται οὐχὶ πάντων τῶν ἀριθμῶν οἱ λογάριθμοι, ἀλλὰ μόνον ἐκείνων, οἵτινες εἶναι ὄροι τῆς γεωμετρικῆς προόδου.

**Ἐκθετικαὶ ἐξισώσεις.**

249. Οὕτω καλοῦνται αἱ ἐξισώσεις, αἵτινες ἔχουσι τὸν ἀγνωστον εἰς τὸν ἐκθέτην· τοιαύτη εἶναι ἡ ἐξίσωσις

$$2^x = 125.$$

Αἱ τοιαῦται ἐξισώσεις λύονται εὐκόλως διὰ τῶν λογαρίθμων· καὶ ὄντως, λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν ἴσων, εὐρίσκομεν

$$\chi \cdot \log 2 = \log 125.$$

ὅθεν

$$\chi = \frac{\log 125}{\log 2}.$$

Ἐστω προσέτι ἡ ἐξίσωσις

$$5(\chi^2 - 6\chi + 8) = 250.$$

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν ὁμοίως

$$(\chi^2 - 6\chi + 8) \cdot \log 5 = \log 250$$

ἢ

$$\chi^2 - 6\chi + 8 = \frac{\log 250}{\log 5},$$

ἡ δὲ ἐξίσωσις αὕτη εἶναι δευτέρου βαθμοῦ πρὸς τὸ  $\chi$  καὶ ἐπομένως λύεται κατὰ τὰ ἤδη γνωστά.

ΣΗΜ. Ἡ ἐκθετικὴ ἐξίσωσις  $\alpha^x = \beta$  δύναται νὰ λυθῇ καὶ ἄνευ τῶν λογαρίθμων ὡς ἐξῆς.

Ἄν θέλωμεν νὰ προσδιορίσωμεν τὸν ἀγνωστον  $\chi$  (ὅστις εἶναι ὁ λογάριθμος τοῦ  $\beta$  κατὰ τὴν βάσιν  $\alpha$ ) κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{\nu}$ , πρέπει νὰ

εὐρωμεν κλάσμα τι  $\frac{\rho}{\nu}$  τοιοῦτον, ὥστε νὰ εἶναι

$$\alpha^{\frac{\rho}{\nu}} < \beta < \alpha^{\frac{\rho+1}{\nu}},$$

διότι τότε ὁ ἀγνωστος  $\chi$  θὰ περιλαμβάνηται μεταξύ  $\frac{\rho}{\nu}$  καὶ  $\frac{\rho+1}{\nu}$ .

Ἐκ τῶν ἀνισοτήτων τούτων προκύπτουσιν αἱ ἐξῆς

$$\alpha^{\rho} < \beta^{\nu} < \alpha^{\rho+1},$$

ἐξ ὧν βλέπομεν, ὅτι πρὸς εὔρεσιν τοῦ  $\chi$  μὲ προσέγγισιν  $\frac{1}{\nu}$ , ἀρκεῖ νὰ ὑψώσωμεν τὸν  $\beta$  εἰς τὴν δύναμιν  $\nu$  καὶ ἔπειτα νὰ εὐρωμεν δύο ἐφεξῆς δυνάμεις τοῦ  $\alpha$ , ἔστω τὰς  $\alpha^{\rho}$  καὶ  $\alpha^{\rho+1}$ , περιλαμβανούσας τὴν δύναμιν

$\beta^{\nu}$ . τότε θὰ εἶναι  $\chi = \frac{\rho}{\nu}$  μὲ προσέγγισιν  $\frac{1}{\nu}$ .



\*ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΩΝΥΜΟΥ. ΠΕΡΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΟΣ.

**Μεταθέσεις.**

250. *Μεταθέσεις* πραγμάτων τινῶν λέγονται οἱ διάφοροι τρόποι, καθ' οὓς δύνανται ταῦτα νὰ τεθῶσιν εἰς μίαν σειράν τὸ ἐν κατόπιν τοῦ ἄλλου.

Δύο γράμματα α, β ἐπιδέχονται προδήλως δύο μόνον μεταθέσεις  
 αβ καὶ βα.

Ἴνα δὲ εὐρωμεν πάσας τὰς μεταθέσεις τῶν τριῶν γραμμάτων α, β, γ, ἀρκεῖ νὰ θέσωμεν τὸ νέον γράμμα γ ἐν ἐκάστη μεταθέσει αβ, βα εἰς πάσας τὰς θέσεις, ὡς ἐξῆς

αβγ	βαγ
αγβ	βγα
γαβ	γβα.

Οὕτω προκύπτουσιν 6 μεταθέσεις τῶν τριῶν γραμμάτων.

Καὶ γενικῶς, ἔχοντες τὰς μεταθέσεις τῶν  $(n-1)$  γραμμάτων, δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν πάσας τὰς μεταθέσεις τῶν  $n$  γραμμάτων, ἐὰν θέσωμεν τὸ νέον γράμμα ἐν ἐκάστη μεταθέσει εἰς πάσας τὰς θέσεις (ἔχει δὲ  $n$  θέσεις ἐκάστη). Αἱ οὕτω προκύπτουσαι μεταθέσεις διαφέρουσιν ἀπ' ἀλλήλων· διότι αἱ μὲν ἐκ τῆς αὐτῆς μεταθέσεως προερχόμεναι διαφέρουσι κατὰ τὴν θέσιν τοῦ νέου γράμματος, αἱ δὲ ἐκ διαφόρων, κατὰ τὴν θέσιν τῶν ἄλλων γραμμάτων. Δὲν ὑπάρχουσι δὲ ἄλλαι μεταθέσεις τῶν  $n$  γραμμάτων· διότι ἂς φαντασθῆ τις οἰανδήποτε μεταθέσιν αὐτῶν· ἐὰν ἐξ αὐτῆς παραλειφθῆ τὸ νέον γράμμα, θὰ μείνῃ προφανῶς μετάθεσις τις τῶν  $(n-1)$  γραμμάτων· ταύτην δὲ εἶχομεν ἐξ ἀρχῆς· καὶ ἐπειδὴ ἐθέσαμεν τὸ νέον γράμμα εἰς πάσας τὰς θέσεις αὐτῆς, ἔπεται ὅτι εὐρέθη καὶ ἡ μετάθεσις, ἣν θεωροῦμεν.

Ἐπειδὴ ἐκάστη τῶν μεταθέσεων τῶν  $n-1$  γραμμάτων παράγει  $n$  μεταθέσεις τῶν  $n$  γραμμάτων, ἔπεται, ὅτι, ἂν παρασταθῆ διὰ τοῦ  $K$  τὸ πλῆθος τῶν πρώτων, αἱ δεύτεραι θὰ εἶναι  $K \cdot n$ .

Ἐφαρμόζοντες τὴν πρότασιν ταύτην καὶ ἐνθυμούμενοι, ὅτι αἱ μεταθέσεις δύο γραμμάτων εἶναι 1.2, εὐρίσκομεν ὅτι αἱ μεταθέσεις τριῶν γραμμάτων εἶναι 1.2.3.

αί μεταθέσεις τεσσάρων 1. 2. 3. 4.

αί δὲ μεταθέσεις μ γραμμάτων 1. 2. 3. 4. . . . μ

ἦτοι ὁ ἀριθμὸς τῶν μεταθέσεων μ πραγμάτων εἶναι ἴσος τῷ γινομένῳ πάντων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ μ.

**Διατάξεις.**

251. Οἱ διάφοροι τρόποι, καθ' οὓς δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἐκ μ πραγμάτων τὰ ν (ἐνθα  $\nu \leq \mu$ ) καὶ νὰ θέσωμεν αὐτὰ εἰς μίαν σειρὰν τὸ ἐν κατόπιν τοῦ ἄλλου, λέγονται διατάξεις τῶν μ πραγμάτων ἀνὰ ν.

Ἐνὰ ἐν τὰ μ γράμματα α, β, γ. . . . μ ἐπιδέχονται προφανῶς μ μόνον διατάξεις α, β, γ. . . . μ.

Ἴνα εὗρωμεν τὰς ἀνὰ δύο διατάξεις τῶν μ γραμμάτων, ἀρκεῖ νὰ θέσωμεν κατόπιν ἐκάστου γράμματος διαδοχικῶς πάντα τὰ λοιπὰ, ὡς ἐξῆς

αβ	βα	γα	. . .	μα
αγ	βγ	γβ	. . .	μβ
αδ	βδ	γδ	. . .	μγ
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
αμ	βμ	γμ	. . .	μλ.

Οὕτως εὐρίσκομεν ἐξ ἐκάστου γράμματος (μ—1) διατάξεις, ἦτοι τὸ ὅλον μ(μ—1) διατάξεις ἀνὰ δύο. Ὅτι δὲ ἄλλη δὲν ὑπάρχει, βλέπει τις εὐκόλως.

Ἐπιθέσωμεν γενικῶς, ὅτι ἔχομεν πάσας τὰς διατάξεις τῶν μ γραμμάτων ἀνὰ (ν—1)· ἔστω τὸ πλῆθος αὐτῶν Π. Ἐκάστη τῶν διατάξεων τούτων θὰ ἔχη (ν—1) γράμματα, ἐπομένως θὰ λείπωσιν ἀπ' αὐτῆς γράμματα μ—(ν—1), ἦτοι μ—ν+1· ἂν δὲ εἰς τὸ τέλος ἐκάστης διατάξεως θέσωμεν ἕκαστον τῶν μ—ν+1 γραμμάτων, τὰ ὅποια δὲν ἔχει, θὰ προκύψωσιν ἐξ αὐτῆς μ—ν+1 διατάξεις τῶν αὐτῶν μ γραμμάτων ἀνὰ ν. Ἐπομένως θὰ δώσωσιν αἱ Π διατάξεις κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον Π· (μ—ν+1) διατάξεις ἀνὰ ν· διαφέρουσι δὲ αὗται ἀπ' ἀλλήλων· διότι αἱ μὲν ἐκ τῆς αὐτῆς διατάξεως προερχόμεναι διαφέρουσι κατὰ τὸ τελευταῖον γράμμα, αἱ δὲ ἐκ διαφόρων, κατὰ τὰ ἄλλα. Οὐδὲ ὑπάρχει πλὴν αὐτῶν ἄλλη διάταξις τῶν μ γραμμάτων ἀνὰ ν· διότι ἂς φαντασθῆ τις μίαν οἰανδήποτε· ἐάν ἐξ αὐτῆς παραλειφθῆ τὸ τελευταῖον γράμμα, προκύπτει διάταξις τις τῶν μ γραμμάτων ἀνὰ ν—1· ταύτην δὲ εἶχομεν ἐξ ἀρχῆς· καὶ ἐπειδὴ ἐθέσαμεν εἰς τὸ τέλος αὐτῆς ἕκαστον τῶν γραμμάτων, τὰ ὅποια δὲν ἔχει, εὗρομεν καὶ τὴν διάταξιν ταύτην.

Κατὰ ταῦτα τὸ πλῆθος τῶν διατάξεων τῶν  $\mu$  γραμμάτων

ἀνὰ ἓν εἶναι  $\mu$ .

ἀνὰ δύο  $\mu(\mu-1)$ .

ἀνὰ τρία  $\mu(\mu-1)(\mu-2)$ .

καὶ γενικῶς ἀνὰ  $n$  εἶναι  $\mu(\mu-1)(\mu-2)\dots(\mu-n+1)$ .

Ἐὰν τὰ  $\mu$  γράμματα λαμβάνωνται ἀνὰ  $\mu$ , αἱ διατάξεις ἀποθαίνουσι μεταθέσεις· διότι μόνον κατὰ τὴν τάξιν δύνανται νὰ διαφέρωσιν. Οὕτως εὐρίσκομεν καὶ πάλιν τὸ πλῆθος τῶν μεταθέσεων τῶν  $\mu$  γραμμάτων  $\mu(\mu-1)(\mu-2)\dots(\mu-\mu+1)$ , ἧτοι 1. 2. 3. ...  $\mu$ .

### Συνδυασμοί.

252. Συνδυασμοὶ  $\mu$  πραγμάτων ἀνὰ  $n$  λέγονται οἱ διάφοροι τρόποι, καθ' οὓς δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἐκ τῶν  $\mu$  πραγμάτων τὰ  $n$  (ἧτοι αἱ διατάξεις τῶν  $\mu$  πραγμάτων ἀνὰ  $n$ , αἱ καθ' ἓν τοῦλάχιστον πρᾶγμα διαφέρουσαι ἀπ' ἀλλήλων).

### Σχηματισμὸς τῶν συνδυασμῶν.

Ἄνὰ ἓν τὰ  $\mu$  γράμματα  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \dots, \mu$  ἐπίδχονται προφανῶς  $\mu$  συνδυασμοὺς, τοὺς ἐξῆς  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \dots, \mu$ .

Διὰ νὰ εὕρωμεν τοὺς ἀνὰ δύο συνδυασμοὺς τῶν αὐτῶν γραμμάτων, γράφομεν κατόπιν ἐκάστου ἐξ αὐτῶν ἕκαστον τῶν ἐπομένων του οὕτω προκύπτουσιν οἱ ἐξῆς συνδυασμοὶ ἀνὰ δύο

ἐκ τοῦ  $\alpha$  οἱ  $\alpha\beta \alpha\gamma \alpha\delta \alpha\epsilon, \dots, \alpha\mu$

ἐκ τοῦ  $\beta$  οἱ  $\beta\gamma \beta\delta \beta\epsilon, \dots, \beta\mu$

ἐκ τοῦ  $\gamma$  οἱ  $\gamma\delta \gamma\epsilon, \dots, \gamma\mu$

.....

ἐκ τοῦ  $\lambda$  οἱ  $\lambda\mu$ .

οὗτοι δὲ εἶναι ἅπαντες οἱ συνδυασμοὶ τῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνὰ δύο.

Πρὸς εὔρεσιν τῶν ἀνὰ τρία συνδυασμῶν, ἀρκεὶ νὰ λάβωμεν ἕκαστον τῶν ἀνὰ δύο συνδυασμῶν καὶ νὰ γράψωμεν κατόπιν τοῦ τελευταίου γράμματός του ἕκαστον τῶν ἐπομένων αὐτῶ γραμμάτων οὕτω προκύπτουσιν οἱ ἐξῆς ἀνὰ τρία συνδυασμοὶ

ἐκ τοῦ  $\alpha\beta$  οἱ  $\alpha\beta\gamma, \alpha\beta\delta, \alpha\beta\epsilon, \dots, \alpha\beta\mu$

ἐκ τοῦ  $\alpha\gamma$  οἱ  $\alpha\gamma\delta, \alpha\gamma\epsilon, \dots, \alpha\gamma\mu$

.....

Καὶ γενικῶς πρὸς εὔρεσιν τῶν ἀνὰ  $n$  συνδυασμῶν ἀρκεὶ νὰ λάβωμεν ἕκαστον τῶν ἀνὰ  $n-1$  καὶ νὰ γράψωμεν κατόπιν τοῦ τελευταίου γράμματός του ἕκαστον τῶν ἐπομένων του.

Καὶ ὄντως οἱ οὕτω προκύπτοντες συνδυασμοὶ θὰ εἶναι διάφοροι ἀπ' ἀλλήλων· διότι οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτοῦ συνδυασμοῦ (ἀνά  $n-1$ ) προκύπτοντες διαφέρουσι κατὰ τὸ τελευταῖον γράμμα, οἱ δὲ ἐκ διαφόρων, κατὰ τὰ ἄλλα· δὲν ὑπάρχει δὲ ἐκτὸς αὐτῶν ἄλλος συνδυασμὸς τῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνά  $n$ · διότι ἂς φαντασθῆ τις οἰονδήποτε συνδυασμὸν ἀνά  $n$  καὶ ἂς διτάξῃ τὰ γράμματα αὐτοῦ κατὰ τὴν τάξιν των ( $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots, \mu$ )· ἐὰν τότε παραλειφθῆ τὸ τελευταῖον γράμμα, θὰ προκύψῃ συνδυασμὸς τις τῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνά  $n-1$ · τὸν συνδυασμὸν τοῦτον εἶχομεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἐπειδὴ ἐγράψαμεν κατ' ὅπιν αὐτοῦ πάντα τὰ μετὰ τὸ τελευταῖον ψήφιον του ἐρχόμενα γράμματα, εὔρομεν καὶ τὸν συνδυασμὸν ἐκεῖνον.

### Πλῆθος τῶν συνδυασμῶν.

Ἐστω  $\Sigma$  τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν τῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνά  $n$  καὶ  $\Delta$  τὸ πλῆθος τῶν διατάξεων τῶν αὐτῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνά  $n$ , καὶ  $M$  τὸ πλῆθος τῶν μεταθέσεων τῶν  $n$  γραμμάτων.

Ἐὰν εἰς ἕκαστον τῶν  $\Sigma$  συνδυασμῶν κάμωμεν πάσας τὰς δυνατὰς μεταθέσεις τῶν  $n$  γραμμάτων αὐτοῦ, θὰ εὔρωμεν ἐξ αὐτοῦ  $M$  διατάξεις (αἵτινες θὰ περιέχωσι μὲν τὰ αὐτὰ γράμματα, θὰ διαφέρωσιν ὁμως κατὰ τὴν θέσιν αὐτῶν)· ὥστε ἐκ τῶν  $\Sigma$  συνδυασμῶν θὰ προκύψωσι τὸ ὅλον  $M \cdot \Sigma$  διατάξεις. Αἱ διατάξεις αὗται διαφέρουσι ἀπ' ἀλλήλων· διότι καὶ μὲν ἐκ τοῦ αὐτοῦ συνδυασμοῦ προκύπτουσαι διαφέρουσι κατὰ τὴν τάξιν τῶν  $n$  γραμμάτων, αἱ δὲ ἐκ διαφόρων, κατὰ τινὰ γράμματα· οὐδὲ ὑπάρχει πλὴν αὐτῶν ἄλλη διάταξις τῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνά  $n$ · διότι ἂς φαντασθῆ τις μίαν οἰονδήποτε διάταξιν· τὰ  $n$  γράμματα, τὰ ὅποια αὕτη περιέχει, κατὰ τὴν φυσικὴν αὐτῶν τάξιν λαμβανόμενα, ἀποτελοῦσιν ἕνα συνδυασμὸν τῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνά  $n$ · τοῦτον δὲ εἶχομεν ἐξ ἀρχῆς· καὶ ἐπειδὴ ἐκάμαμεν εἰς αὐτὸν πάσας τὰς δυνατὰς μεταθέσεις τῶν γραμμάτων του, εὔρομεν καὶ τὴν διάταξιν ταύτην. Ἐκ τούτων συνάγεται, ὅτι αἱ ὡς εἴρηται προκύπτουσαι  $M \cdot \Sigma$  διατάξεις εἶναι ἅπασαι αἱ διατάξεις τῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνά  $n$ · τουτέστιν εἶναι

$$\Delta = M \cdot \Sigma, \text{ ὅθεν καὶ } \Sigma = \frac{\Delta}{M}$$

καὶ ἐπειδὴ εἶναι  $\Delta = \mu(\mu-1) \dots (\mu-n+1)$   
καὶ  $M = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n$ .

ἔπεται 
$$\Sigma = \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2) \dots (\mu-n+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \quad (1)$$

ΣΗΜ. Α'. Ἐπειδὴ ὁ ἀριθμὸς τῶν συνδυασμῶν εἶναι πάντοτε ἀκέραιος,

ἔπεται ἐκ τοῦ προηγουμένου τύπου, ὅτι τὸ γινόμενον  $\nu$  διαδοχικῶν ἀριθμῶν εἶναι πάντοτε διαιρετὸν διὰ τοῦ γινομένου  $1.2.3 \dots \nu$ .

ΣΗΜ. Β'. Ὁ ἀριθμὸς τῶν συνδυασμῶν  $\mu$  πραγμάτων ἀνὰ  $\nu$  γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς 
$$\Sigma = \frac{1.2.3.4 \dots \mu}{(1.2.3 \dots \nu)(1.2.3 \dots (\mu - \nu))}$$
,

ἐὰν ἀμφότεροι οἱ ὄροι τῆς παραστάσεως (1) πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ  $1.2.3 \dots (\mu - \nu)$ . Ἐκ τῆς ἐκφράσεως δὲ ταύτης τοῦ  $\Sigma$  φαίνεται ἀμέσως, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν συνδυασμῶν  $\mu$  πραγμάτων εἶναι ὁ αὐτὸς εἴτε ἀνὰ  $\nu$  συνδυασθῶσι ταῦτα, εἴτε ἀνὰ  $\mu - \nu$ . τοῦτο δὲ καὶ ἀμέσως γίνεται φανερόν· διότι τὰ γράμματα, τὰ ὁποῖα λείπουσιν ἐξ ἐνὸς συνδυασμοῦ ἀνὰ  $\nu$ , ἀποτελοῦσι συνδυασμὸν τινὰ τῶν αὐτῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνὰ  $\mu - \nu$ .

### Ἐφαρμογαί.

1) Εὐρεῖν τὸ πλῆθος τῶν διαγωνίων εὐθυγράμμου σχήματος, τὸ ὅποτον ἔχει  $\mu$  πλευρὰς καὶ  $\mu$  κορυφάς.

Αἱ τὰς  $\mu$  κορυφὰς ἀνὰ 2 συνδέουσαι πρὸς ἀλλήλας εὐθεῖαι εἶναι τόσαι, ὅσαι εἶναι οἱ συνδυασμοὶ τῶν  $\mu$  πραγμάτων ἀνὰ 2, ἤτοι  $\frac{\mu(\mu-1)}{1.2}$ . ἀλλ' ἀπὸ τούτων ἀφαιρετέον τὰς  $\mu$  πλευρὰς τοῦ σχήματος· ὥστε ἀπομένουσι διχῶνιοι

$$\frac{\mu(\mu-1)}{1.2} - \mu \text{ ἢ } \mu \left\{ \frac{\mu-1}{2} - 1 \right\}, \text{ ἤτοι } \frac{\mu(\mu-3)}{1.2}.$$

2) Πόσα σημεῖα γίνονται, ἐὰν αἱ  $\mu$  πλευραὶ ἐπιπέδου πολυγώνου προσεκβληθῶσιν εἰς ἄπειρον; (ὑποτίθεται ὅτι δὲν εἶναι δύο παράλληλοι).

Τόσαι τομαὶ ὑπάρχουσιν, ὅσαι εἶναι οἱ συνδυασμοὶ τῶν  $\mu$  πραγμάτων ἀνὰ 2· ἤτοι  $\frac{\mu(\mu-1)}{1.2}$ . ἐκ τούτων ἀφαιρετέον τὰς  $\mu$  κορυφάς, ὥστε γίνονται τομαὶ  $\frac{\mu(\mu-3)}{1.2}$ .

3) Κατὰ πόσους διαφόρους τρόπους δύνανται νὰ σταθῶσιν 6 ἄνθρωποι εἰς κύκλον; (Ἄπ.  $1.2.3.4.5$ ).

4) Πόσοι ἀριθμοὶ διψήφιοι ὑπάρχουσιν ἔχοντες ψηφία σημαντικὰ καὶ διάφορα ἀπ' ἀλλήλων; πόσοι δὲ τριψήφιοι;

(Ἄπ διψήφιοι  $9.8$  ἢ  $72$ ; τριψήφιοι  $9.8.7$  ἤτοι  $504$ ).

5) Κατὰ πόσους τρόπους δύνανται νὰ παραταχθῶσιν 8 στρατιῶται εἰς γραμμὴν; (Ἄπ.  $1.2.3.4.5.6.7.8$  ἤτοι  $40320$ ).

### Τύπος τοῦ διωνύμου.

253. Διὰ τῆς θεωρίας τῶν συνδυασμῶν δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν πάντας τοὺς ὅρους τοῦ γινομένου ὁσωνδήποτε διωνύμων, ὡς τῶν  $\chi + \alpha$ ,  $\chi + \beta$ ,  $\chi + \gamma$ ,  $\chi + \delta$ , ...  $\chi + \kappa$ , χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν αὐτῶν.

Ἐὰν διὰ τοῦ  $\mu$  παραστήσωμεν τὸ πλῆθος τῶν διωνύμων τούτων, φανερόν εἶναι, ὅτι θὰ ὑπάρχωσιν ἐν τῷ γινομένῳ

$$(\chi + \alpha) (\chi + \beta) (\chi + \gamma) \dots (\chi + \kappa)$$

πᾶσαι αἱ δυνάμεις τοῦ  $\chi$  ἀπὸ τῆς  $\chi^\mu$  μέχρι τῆς  $\chi^0$ , καὶ ἐπομένως ἀρκεῖ νὰ προσδιορίσωμεν τὸν πολλαπλασιαστὴν ἐκάστης τῶν δυνάμεων τούτων.

Καὶ τοῦ μὲν  $\chi^\mu$  πολλαπλασιαστῆς εἶναι προδήλως ἡ μονάς· τοῦ δὲ  $\chi^{\mu-1}$  λέγω, ὅτι εἶναι πολλαπλασιαστῆς τὸ ἄθροισμα

$$\alpha + \beta + \gamma + \dots + \kappa$$

τοῦ δὲ  $\chi^{\mu-2}$ , τὸ ἄθροισμα τῶν γινομένων, ἕτινα προκύπτουσι διὰ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν  $\mu$  γραμμάτων  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  ἀνὰ δύο, ἤτοι τὸ ἄθροισμα

$$\begin{aligned} &\alpha\beta + \alpha\gamma + \dots + \alpha\kappa \\ &+ \beta\gamma + \dots + \beta\kappa \\ &+ \dots \end{aligned}$$

Καὶ γενικῶς τοῦ  $\chi^{\mu-n}$  πολλαπλασιαστῆς εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν γινομένων ὅσα προκύπτουσι διὰ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν αὐτῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνὰ  $n$ .

Διότι ἕκαστος ὅρος τοῦ γινομένου ἀνάγκη νὰ ἔχη (ὡς παράγοντα) ἕνα ἐκ τῶν προσθετέων ἐκάστου διωνύμου καὶ ἕνα μόνον· ἐπομένως ὑπάρχουσι εἰς ἕκαστον ὅρον  $\mu$  γράμματα· ἐὰν δὲ ὅρος τις ἔχη τὸ  $\chi^{\mu-n}$ , τὰ λείποντα  $n$  γράμματα θὰ εἶναι ἐκ τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \kappa$  καὶ θὰ ἀποτελῶσι συνδυασμὸν τινὰ αὐτῶν ἀνὰ  $n$ · ὥστε πᾶς ὅρος ἔχων τὸ  $\chi^{\mu-n}$  πολλαπλασιάζεται ἐπὶ συνδυασμὸν τινὰ τῶν  $\mu$  γραμμάτων ἀνὰ  $n$ · ἀλλὰ καὶ τάνάπαλιν, πᾶς συνδυασμὸς τῶν αὐτῶν γραμμάτων ἀνὰ  $n$  εὐρίσκεται ἐν τῷ γινομένῳ τῶν διωνύμων καὶ πολλαπλασιάζει τὸ  $\chi^{\mu-n}$ · διότι ἔστω ὁ συνδυασμὸς  $\alpha\gamma\epsilon \dots \theta$ · ἐὰν χωρίσωμεν τὰ διώνυμα, ἐν οἷς ὑπάρχουσι τὰ γράμματα τοῦ συνδυασμοῦ τούτου, ἀπὸ τῶν λοιπῶν

$$(\chi + \alpha) (\chi + \gamma) (\chi + \epsilon) \dots (\chi + \theta) \quad (\chi + \beta) (\chi + \delta) \dots (\chi + \eta),$$

τούτων μὲν τὸ γινόμενον θὰ ἔχη τὸν ὅρον  $\alpha\gamma\epsilon \dots \theta$ , τῶν δὲ λοιπῶν θὰ ἔχη τὸν ὅρον  $\chi^{\mu-n}$ , ὥστε τὸ γινόμενον πάντων τῶν διωνύμων θὰ ἔχη τὸν ὅρον

$$(\alpha\gamma\epsilon \dots \theta) \cdot \chi^{\mu-n},$$

ἐξ ὧν ἐπιτεταί, ὅτι ὁ πολλαπλασιαστικὸς τοῦ  $\chi^{\mu-\nu}$  εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν γινομένων, ὅσα προκύπτουσι διὰ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν γραμμῶν ἀνά  $\nu$ .

254. Ἐκ τοῦ γινομένου  $(\chi + \alpha)(\chi + \beta)(\chi + \gamma) \dots (\chi + \kappa)$  μεταβαίνομεν εἰς τὸ γινόμενον  $(\chi + \alpha)(\chi + \alpha)(\chi + \alpha) \dots (\chi + \alpha)$ , τοῦτ' ἔστιν εἰς τὴν  $\mu$  δύναμιν τοῦ διωνύμου  $(\chi + \alpha)$ , ἐὰν ὑποθέσωμεν πάντα τὰ  $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \kappa$  ἴσα ἀλλήλοις.

Ἀλλὰ τότε ἐν τῷ προηγουμένως εὑρεθέντι γινομένῳ τῶν διωνύμων  $(\chi + \alpha), (\chi + \beta) \dots (\chi + \kappa)$

τοῦ μὲν  $\chi^\mu$  συντελεστὴς μένει ἢ μονὰς 1, τοῦ δὲ  $\chi^{\mu-1}$  ὁ συντελεστὴς  $\alpha + \beta + \gamma + \dots + \kappa$  τρέπεται εἰς  $\alpha + \alpha + \alpha + \dots + \alpha$ , ἥτοι  $\mu\alpha$ . τοῦ δὲ  $\chi^{\mu-2}$  ὁ συντελεστὴς  $\alpha\beta + \alpha\gamma + \alpha\delta \dots + \alpha\kappa$  τρέπεται εἰς  $\alpha^2 + \alpha^2 + \dots + \alpha^2$ , ἥτοι τοσάκις τὸ  $\alpha^2$ , ὅσοι εἶναι οἱ συνδυασμοὶ τῶν  $\mu$  γραμμῶν ἀνά δύο, τοῦτ' ἔστι  $\frac{\mu(\mu-1)}{1 \cdot 2} \alpha^2$ .

Καὶ γενικῶς ὁ συντελεστὴς τοῦ  $\chi^{\mu-\nu}$  τρέπεται εἰς  $\alpha^\nu$  τοσάκις ληφθέν, ὅσοι εἶναι οἱ συνδυασμοὶ τῶν  $\mu$  γραμμῶν ἀνά  $\nu$ . τοῦτ' ἔστιν εἰς

$$\frac{\mu(\mu-1)(\mu-2) \dots (\mu-\nu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \nu} \alpha^\nu.$$

Ἐκ τούτων συνάγεται ἡ ἰσότης

$$(\chi + \alpha)^\mu = \chi^\mu + \mu\chi^{\mu-1} \cdot \alpha + \frac{\mu(\mu-1)}{1 \cdot 2} \chi^{\mu-2} \cdot \alpha^2 + \dots + \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2) \dots (\mu-\nu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \nu} \chi^{\mu-\nu} \alpha^\nu + \dots + \mu\chi\alpha^{\mu-1} + \alpha^\mu,$$

ἥτις λέγεται τύπος τοῦ διωνύμου ἢ καὶ τύπος τοῦ Νεύτωνος.

Κατὰ τὸν τύπον τοῦτον συντίθεται πᾶσα δύναμις τοῦ διωνύμου  $\chi + \alpha$  ἐκ τῶν δυνάμεων τῶν μερῶν αὐτοῦ  $\chi$  καὶ  $\alpha$  καὶ ἀποτελεῖται ἐξ ἕρων ἰσοβαθμίων πρὸς τὰ  $\chi$  καὶ  $\alpha$ . τὸ τὴν σύνθεσιν ταύτην παρέχον δεύτερον μέλος τῆς ἰσότητος λέγεται ἀνάπτυγμα τῆς δυνάμεως  $(\chi + \alpha)^\mu$  κατὰ τὰς δυνάμεις τοῦ  $\chi$  ἢ τοῦ  $\alpha$ .

255. Ὁ ὅρος  $\frac{\mu(\mu-1)(\mu-2) \dots (\mu-\nu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \nu} \chi^{\mu-\nu} \alpha^\nu$

λέγεται γενικὸς ὅρος τοῦ ἀναπτύγματος· διότι ἐξ αὐτοῦ εὐρίσκωμεν πάντας τοὺς ὅρους ὑποθέτοντες τὸν  $\nu$  κατὰ σειρὰν ἴσον τοῖς ἀριθμοῖς

$$1, 2, 3, \dots, \mu.$$

Παρατηρητέον δὲ, ὅτι ὁ γενικὸς οὗτος ὅρος γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς

$$(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots \mu) \frac{\chi^{\mu-\nu}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (\mu-\nu)} \cdot \frac{\alpha^\nu}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \nu}$$

ἐὰν πολλαπλασιασθῶσιν ὁ ἀριθμητῆς καὶ ὁ παρονομαστῆς αὐτοῦ ἐπὶ  $(\mu - \nu)(\mu - \nu - 1) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$  ἐκ δὲ τῆς μορφῆς ταύτης τοῦ γενικοῦ ὄρου βλέπομεν, ὅτι οἱ δύο ὄροι

$$\chi^{\nu} \cdot \alpha^{\rho} \text{ καὶ } \chi^{\rho} \alpha^{\nu}$$

οἱ τοὺς αὐτοὺς ἐκθέτας τῶν  $\chi$  καὶ  $\alpha$  ἔχοντες (ἀλλ' ἀντιστρόφως), ἔχουσι τὸν αὐτὸν συντελεστὴν ἀπέχουσι δὲ οἱ ὄροι οὗτοι ἐξ ἴσου ἀπὸ τῶν ἄκρων ἐπομένως, ἀφοῦ εὐρεθῶσιν ἐκ τοῦ τύπου οἱ ἡμίσεις τῶν συντελεστῶν τοῦ ἀναπτύγματος, οἱ λοιποὶ γράφονται κατ' ἀντίστροφον τάξιν.

Ὡς παράδειγμα ἔστω ἡ 6ῃ δύναμις τοῦ  $(\chi + \alpha)$  ἔχομεν

$$(\chi + \alpha)^6 = \chi^6 + 6\chi^5\alpha + 15\chi^4\alpha^2 + 20\chi^3\alpha^3 + 15\chi^2\alpha^4 + 6\chi\alpha^5 + \alpha^6.$$

### Περὶ πιθανότητος.

256. Ὄταν ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων περιπτώσεων πράγματός τινος ἐξ ἅπαντος θὰ συμβῇ μία καὶ μία μόνη, ἀλλ' οὐδεμίαν εἰξεύρομεν αἰτίαν, ἥτις νὰ εὐνοῇ μᾶλλον τὴν μίαν ἢ τὴν ἄλλην, τότε λέγομεν, ὅτι αἱ περιπτώσεις αὗται ἔχουσιν ἴσην πιθανότητα νὰ συμβῶσιν ἢ ὅτι εἶναι ἐξ ἴσου πιθαναί.

Ἐὰν π. χ. ρίψωμεν νόμισμά τι ἐν τῷ ἀέρι, θὰ πέσῃ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐπὶ τῆς μιᾶς τῶν δύο αὐτοῦ ὄψεων· δηλονότι ἢ ἐπὶ τοῦ προσώπου ἢ ἐπὶ τοῦ στέμματος· ἀμφότεραι δὲ αἱ περιπτώσεις αὗται εἶναι ἐξ ἴσου πιθαναί.

Ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι θὰ συμβῇ τι παρίσταται διὰ κλάσματος, ὅπερ ἔχει ἀριθμητὴν μὲν τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐνοϊκῶν περιπτώσεων, παρονομαστὴν δὲ τὸν ὅλον ἀριθμὸν πασῶν τῶν δυνατῶν περιπτώσεων· ὑποτίθεται δὲ, ὅτι πᾶσαι αἱ δυναταὶ περιπτώσεις εἶναι ἐξ ἴσου πιθαναί.

Τὸν ὀρισμὸν τοῦτον θὰ ἐφχρμόσωμεν εἰς τὰ ἐξῆς προβλήματα.

1) Εἰς τινα κάλπην εὐρίσκονται 12 σφαῖραι ἴσαι τὸ μέγεθος, ἐξ ὧν 5 εἶναι λευκαὶ καὶ 7 μέλαιναί· ποία εἶναι ἡ πιθανότης, ὅτι, ἂν κατὰ τύχην ἐξαχθῇ μία, θὰ εἶναι λευκή;

Ἐνταῦθα πᾶσαι αἱ δυναταὶ περιπτώσεις εἶναι 12 (διότι μία ἐκ τῶν 12 σφαιρῶν θὰ ἐξαχθῇ ἐξ ἅπαντος καὶ ἐκάστη δύναται νὰ ἐξαχθῇ) καὶ πᾶσαι εἶναι ἐξ ἴσου πιθαναί, αἱ δὲ εὐνοϊκαὶ (καθ' ἃς δηλονότι θὰ ἐξαχθῇ λευκὴ σφαῖρα) εἶναι 5· ἄρα κατὰ τὸν ὀρισμὸν ἡ πιθανότης, τοῦ ὅτι ἡ ἐξαχθησομένη σφαῖρα θὰ εἶναι λευκή, εἶναι  $\frac{5}{12}$ .

2) Λαχεῖτόν τι ἔχει 100 ἀριθμοὺς καὶ ἐξ αὐτῶν οἱ πέντε κατὰ τύ-



χην ἐξαχθησόμενοι κερδίζουσιν· ἐάν τις ἀγοράσῃ ἓνα ἀριθμὸν αὐτοῦ, ἔστω τὸν 18, ποίαν πιθανότητα ἔχει, ὅτι θὰ κερδήσῃ;

Ἐνταῦθα αἱ δυναταὶ περιπτώσεις εἶναι τόσαι, ὅσοι εἶναι οἱ συνδυασμοὶ τῶν 100 ἀριθμῶν ἀνὰ πέντε (διότι πέντε ἐκ τῶν 100 ἀριθμῶν θὰ ἐξαχθῶσι καὶ ἕκαστος συνδυασμὸς ἀνὰ πέντε ἔχει ἴσην πιθανότητα ὑπὲρ ἑαυτοῦ)· ἦτοι

$$\frac{100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}.$$

Αἱ δὲ εὐνοϊκαὶ περιπτώσεις εἶναι τόσαι, ὅσοι εἶναι οἱ ἀνὰ πέντε συνδυασμοὶ οἱ ἔχοντες τὸν ἀριθμὸν 18· πρὸς εὑρεσιν τοῦ πλήθους αὐτῶν παρατηροῦμεν, ὅτι, ἂν ἐκ τῶν συνδυασμῶν τούτων παραλειφθῇ ὁ ἀριθμὸς 18, θὰ μείωσιν οἱ συνδυασμοὶ τῶν 99 ἄλλων ἀριθμῶν ἀνὰ 4· ἐπομένως οἱ συνδυασμοὶ οὗτοι εἶναι

$$\frac{99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4},$$

ὥστε ἡ πιθανότης, τοῦ ὅτι θὰ κερδήσῃ ὁ ἀριθμὸς 18, εἶναι

$$\frac{99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} : \frac{100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \quad \text{ἦτοι} \quad \frac{5}{100} \quad \eta \quad \frac{1}{20}.$$

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι ἐπὶ 20 περιπτώσεων μία μόνον εἶναι εὐνοϊκὴ καὶ 19 ἐναντία.

3) Εἴς τινα κάλπην εὐρίσκονται οἱ ἀριθμοὶ 1, 2... μέχρι 100· ἐὰν ἐξαχθῇ κατὰ τύχην εἷς, ποία εἶναι ἡ πιθανότης, ὅτι οὗτος θὰ εἶναι πρῶτος ἀριθμὸς;

$$\left( \text{Ἀπ.} \frac{13}{50} \right).$$

4) Ἐχομεν δύο κύβους, ὧν ἀμφοτέρων αἱ πλευραὶ ἔχουσι τοὺς ἀριθμοὺς 1, 2, 3, 4, 5, 6 κατὰ σειράν. Ἐὰν ρίψωμεν αὐτοὺς κατὰ τύχην ἐπὶ τινος πίνακος ὀριζοντίου, ποία εἶναι ἡ πιθανότης, ὅτι οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἐδρῶν, αἵτινες θὰ ἔλθωσιν ἐπάνω, θὰ ἔχωσιν ἄθροισμα 7;

Ἄπασαι αἱ δυναταὶ περιπτώσεις εἶναι 36 (διότι ἕκαστος ἀριθμὸς τοῦ ἐνὸς κύβου δύναται νὰ συνδυασθῇ μεθ' ἑκάστου ἀριθμοῦ τοῦ δευτέρου)· ἐκ δὲ τούτων αἱ τὸ ἄθροισμα 7 περιέχουσαι εἶναι 6 (αἱ ἐξῆς 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1)· ὥστε ἡ ζητούμενη πιθανότης εἶναι  $\frac{1}{6}$ .

Ὅμοίως εὐρίσκομεν, ὅτι ἡ πιθανότης τοῦ νὰ εὑρωμεν ἄθροισμα 5 εἶναι  $\frac{1}{9}$ , ἡ δὲ πιθανότης τοῦ νὰ εὑρωμεν ἄθροισμα 4 εἶναι  $\frac{1}{12}$ .

5) Ἐὰν ρίψωμεν τρεῖς κύβους συγχρόνως, ποία εἶναι ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι εἷς ἓνα, καὶ μόνον εἷς ἓνα, θὰ ἔχωμεν τὸν ἀριθμὸν 1;

Ἀπασαι αἱ δυναταὶ περιπτώσεις εἶναι  $6^3$ · (διότι ἐκάστη ἔδρα τοῦ πρώτου κύβου Α δύναται νὰ συνδυασθῇ πρὸς ἐκάστην τοῦ δευτέρου Β καὶ ἕκαστος συνδυασμὸς τῶν δύο πρώτων δύναται νὰ συνδυασθῇ πρὸς ἐκάστην ἔδραν τοῦ τρίτου Γ). Ἐκ τούτων αἱ ἔχουσαι τὸν ἀριθμὸν 1 ἅπαξ μόνον εἶναι  $25 + 25 + 25$  (διότι ὁ ἀριθμὸς 1 τοῦ πρώτου κύβου Α δύναται νὰ συνδυασθῇ πρὸς ἐκάστην τῶν 5 ἐδρῶν τῶν δύο ἄλλων κύβων, ὅτε προκύπτουσιν 25 εὐνοϊκαὶ περιπτώσεις· ὡσαύτως ὁ ἀριθμὸς 1 τοῦ δευτέρου κύβου δύναται νὰ συνδυασθῇ πρὸς ἐκάστην τῶν 5 ἐδρῶν τῶν δύο ἄλλων κύβων, καὶ τοῦ τρίτου κύβου ὡσαύτως)· ὥστε ἡ ζητούμενη πιθανότης εἶναι  $\frac{75}{216}$ .

Ὅμοίως εὐρίσκομεν, ὅτι ἡ πιθανότης τοῦ νὰ ἔχωμεν εἰς δύο κύβους καὶ εἰς δύο μόνον τὸν ἀριθμὸν 1 εἶναι  $\frac{15}{216}$ .

Ἡ δὲ πιθανότης τοῦ νὰ ἔχωμεν τὸν ἀριθμὸν 1 ἅπαξ ἢ πολλακίς εἶναι  $\frac{91}{216}$ .

6) Ἐὰν ρίψωμεν δύο κύβους δῖς, ποία εἶναι ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι καὶ τὰς δύο φοράς θὰ εὕρωμεν τὸν συνδυασμὸν  $6 + 6$ ;

Ἡ πιθανότης τοῦ νὰ εὕρωμεν τὴν πρώτην φοράν  $6 + 6$  εἶναι  $\frac{1}{36}$ , ἀλλά, καὶ ἐὰν τοῦτο γίνῃ, πάλιν τὴν δευτέραν φοράν ἅπασαι αἱ 36 περιπτώσεις εἶναι ἐξ ἴσου πιθαναί, ἔχουσι δὲ ὅλαι ὁμοῦ τὴν πιθανότητα  $\frac{1}{36}$ . ὥστε ἡ πιθανότης ἐκάστης εἶναι  $\frac{1}{36^2}$ . Ἐπειδὴ δὲ τὸ ζητούμενον μόνον μίαν περίπτωσιν ἔχει εὐνοϊκὴν, ἔπεται ὅτι ἡ πιθανότης αὐτοῦ εἶναι  $\frac{1}{36^2}$  ἢ  $\frac{1}{1296}$ .

7) Εἷς τινα κάλπην εἶναι οἱ ἐκκτὸν ἀριθμοὶ 1, 2, 3, ... 100· ἐκ τῶν ἀριθμῶν τούτων θὰ ἐξαχθῶσι τρεῖς κατὰ τύχην καὶ ὁ εἷς μετὰ τὸν ἄλλον· πόση πιθανότης ὑπάρχει, ὅτι οἱ ἐξαχθησόμενοι ἀριθμοὶ θὰ εἶναι κατὰ σειρὰν οἱ 1, 2, 3 (ἦτοι πρῶτος ὁ 1, δεύτερος ὁ 2 καὶ τρίτος ὁ 3);

Ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι θὰ ἐξαχθῇ πρῶτος ὁ 1 εἶναι  $\frac{1}{100}$  (διότι πάντες οἱ ἀριθμοὶ ἔχουσιν ἴσην πιθανότητα). Καὶ τούτου γενομένου μένουσιν ἐν τῇ κάλπῃ 99 ἀριθμοὶ (διότι ὁ ἐξαχθεὶς δὲν ἐπιστρέφεται πλέον) καὶ ἕκα-

στος τούτων ἔχει ἴσην πιθανότητα νὰ ἐξαχθῇ· ἐπειδὴ δὲ ἡ πιθανότης ὄλων εἶναι  $\frac{1}{100}$ , ἔπεται, ὅτι ἡ πιθανότης τοῦ νὰ ἐξαχθῇ δεύτερος ὁ 2

(ἀφοῦ ἐξαχθῇ πρῶτος ὁ 1) εἶναι  $\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{99}$ . Καὶ τούτου δὲ γενομένου, μένουσιν ἐν τῇ κάλπῃ 98 ἀριθμοὶ καὶ ἕκαστος ἔχει ἴσην πιθανότητα· ὅλα δὲ ὁμοῦ αἱ πιθανότητες συναποτελοῦσι τὸν ἀριθμὸν  $\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{99}$ . Ὡστε ἡ πιθανότης τοῦ νὰ ἐξαχθῶσι κατὰ σειρὰν οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3 εἶναι  $\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{99} \cdot \frac{1}{98}$ .

Ὁμοίως εὐρίσκομεν, ὅτι ἡ πιθανότης τοῦ νὰ ἐξαχθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3 καθ' οἰανδήποτε τάξιν εἶναι  $\frac{3}{100} \cdot \frac{2}{99} \cdot \frac{1}{98}$ .

8) Τῶν αὐτῶν ὄντων ποία εἶναι ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι οἱ τρεῖς ἐξαχθόμενοι ἀριθμοὶ θὰ εἶναι ἐφεξῆς;

Ἐὰν πρέπη νὰ ἐξαχθῶσι κατὰ σειρὰν, ἦτοι πρῶτον ὁ μικρότερος, ἔπειτα ὁ μεσαῖος καὶ τρίτος ὁ μεγαλύτερος, ἡ πιθανότης εἶναι  $\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{99}$ . διότι τοῦτο γίνεται μόνον ἐὰν ἐξαχθῶσιν οἱ 1, 2, 3, ἢ οἱ 2, 3, 4, ἢ 3, 4, 5... ἢ τέλος οἱ 98, 99, 100· ἐκάστη δὲ τριάς ἔχει πιθανότητα νὰ ἐξαχθῇ

$$\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{99} \cdot \frac{1}{98}$$

Ἐὰν ὁμοῦς ἡ τάξις εἶναι ἀδιάφορος, ἡ πιθανότης εἶναι  $\frac{6}{100 \cdot 99}$ .

9) Ῥίπτομεν ἐν νόμισμα κατὰ τύχην τρεῖς φορές ποία εἶναι ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι καὶ τὰς τρεῖς φορές πεσόν τὸ νόμισμα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους θὰ δείξῃ τὸ πρόσωπον;

$$\left( \text{Ἀπ. } \frac{1}{2^3} \right).$$

10) Ῥίπτομεν δύο νομίσματα ν φορές· ποία εἶναι ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι ἀμφότερα καὶ τὰς ν φορές θὰ δεικνύωσιν ἀδιαλείπτως τὸ πρόσωπον;

$$\left( \text{Ἀπ. } \frac{1}{4^v} \right).$$

11) Ἐάν τις γράψῃ τυχαιῶς ἓνα ὀκταψήφιον ἀριθμὸν, ποία εἶναι ἡ πιθανότης ὅτι πάντα τὰ ψηφία αὐτοῦ θὰ εἶναι διάφορα ἀπ' ἀλλήλων;

$$\left( \text{Ἀπ. } \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{10^7} \right).$$

12) Ἐὰν γραμμὴ ἔχουσα μῆκος  $\alpha$  τμηθῆ ὡς ἔτυχεν, ποία εἶναι ἡ πιθανότης, ὅτι τὰ δύο τμήματα θὰ διαφέρωσιν ὀλιγώτερον τοῦ δοθέντος μῆκους  $\mu$  ; ( Ἀπ.  $\frac{\mu}{\alpha}$  ) .

13) Ἐν ρίψωμεν ἐν νόμισμα  $\nu$  φορές, ποία εἶναι ἡ πιθανότης, ὅτι θὰ παρουσιασθῆ  $\alpha$  φορές τὸ πρόσωπον ἐν συνόλῳ καὶ  $\beta$  φορές τὸ στέμμα ; (ἀδιάφορον κατὰ ποίαν τάξιν).

Ὁ ἀριθμὸς πασῶν τῶν δυνατῶν περιπτώσεων εἶναι προφανῶς  $2^\nu$  (διότι τὴν πρώτην φοράν ἔχομεν δύο περιπτώσεις, ἐκάστη δὲ τούτων τὴν δευτέραν φοράν δίδει πάλιν δύο, καὶ οὕτω καθεξῆς). Ἀλλ' ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς δύναται καὶ ἄλλως νὰ εὑρεθῆ· ἐὰν δηλαδὴ διὰ τοῦ  $\pi$  παριστῶμεν τὸ πρόσωπον καὶ διὰ τοῦ  $\sigma$  τὸ στέμμα, πρόδηλον εἶναι, ὅτι τόσαι περιπτώσεις δυναταὶ ὑπάρχουσιν, ὅσα γινόμενα δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν ἐκ  $\nu$  παραόντων, ὧν ἕκαστος εἶναι ἢ  $\pi$  ἢ  $\sigma$ . Πάντα δὲ τὰ γινόμενα ταῦτα εἶναι ὅροι τοῦ γινομένου  $(\pi + \sigma)^\nu$  πρὸ τῆς ἀναγωγῆς· ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν εὐνοϊκῶν περιπτώσεων εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ὄρων τοῦ γινομένου τούτου, οἵτινες ἔχουσιν  $\alpha$  φορές τὸ  $\pi$  (ἐπομένως  $\beta$  φορές τὸ  $\sigma$ )· ἦτοι ὁ ἀριθμὸς τῶν ὄρων  $\pi^\alpha \sigma^\beta$ . ὁ ἀριθμὸς οὗτος δεικνύεται ὑπὸ τοῦ συντελεστοῦ, ὃν ἔχει τὸ  $\pi^\alpha \sigma^\beta$  ἐν τῷ ἀναπτύγματι τοῦ διωνύμου  $(\pi + \sigma)^\nu$ , ὅστις εἶναι  $\frac{1 \cdot 2 \dots \nu}{(1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \alpha) (1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \beta)}$ .

ὅθεν ἡ ζητούμενη πιθανότης εἶναι

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \nu}{(1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \alpha) (1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \beta)} \cdot \frac{1}{2^\nu}$$

Ἐὰν λ. χ. ρίψωμεν τὸ νόμισμα 10 φορές, ἡ πιθανότης τοῦ νὰ εὔρωμεν

$\pi = 0,$	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10	
$\sigma = 10,$	9,	8,	7,	6,	5,	4,	3,	2,	1,	0	
εἶναι	$\frac{1}{2^{10}}$	$\frac{10}{2^{10}}$	$\frac{45}{2^{10}}$	$\frac{120}{2^{10}}$	$\frac{210}{2^{10}}$	$\frac{252}{2^{10}}$	$\frac{210}{2^{10}}$	$\frac{120}{2^{10}}$	$\frac{45}{2^{10}}$	$\frac{10}{2^{10}}$	$\frac{1}{2^{10}}$

2-0-0



ACHINNA

ACHINNA



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



007000160622